

# Qualitätsergebnisse

Kliniken des Main-Taunus-Kreises - Krankenhaus Bad Soden



G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

Präambel

[zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

## **Ergebnisdarstellung und Nutzung der Indikatoren-Sets in Zeiten der COVID-19-Pandemie**

Die Analyse des Leistungsgeschehens während des Lockdowns der COVID-19-Pandemie hat gezeigt, dass die Fallzahlen in den IQM Mitgliedskrankenhäusern zum Teil stark zurückgegangen sind. Davon waren nicht nur geplante Eingriffe, sondern auch Notfälle wie Herzinfarkt oder Schlaganfall betroffen. Dieser "Corona-Effekt" zeigt sich in fast allen Indikatoren, indem geringere Fallzahlen kleinere Grundgesamtheiten der Indikatoren zur Folge haben, gleichzeitig aber eine deutlich andere Zusammensetzung der Fallschwere zeigen als in der Vergleichsgruppe der Referenzwerte. Weniger, aber zum Teil schwerer betroffene Patienten oder auch ein gehäuftes Auftreten der COVID-19-Fälle in spezifischen Indikatoren wie der Pneumonie oder Intensivmedizin, lassen keinen Vergleich mit den vorliegenden Referenzwerten auf Basis der Bundesreferenzwerte von 2018 zu.

Der IQM Vorstand hat daher beschlossen, in der vorliegenden Ergebnisdarstellung die Zielwerte, die in der IQM Methodik auf Grundlage der Bundesreferenzwerte festgelegt werden, nicht auszuweisen und die Bewertungssystematik über die SMR/Erwartungswerte und Zielwerte für das Jahr 2020 auszusetzen. Gleichzeitig werden als eigene Gruppe vier deskriptive COVID-19 Kennzahlen ergänzt.

Die abgebildeten Messwerte dienen der Information und Orientierung des Behandlungsspektrums.

G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

### IQM Indikatoren

[Qualitätsbericht](#)

[QSR-Mehrjahresergebnisse](#)

### Inhaltsverzeichnis

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| Herzerkrankungen                                   | <a href="#">2020</a> | <a href="#">2019</a> |
| Erkrankungen des Nervensystems und Schlaganfall    | <a href="#">2020</a> | <a href="#">2019</a> |
| Altersmedizin                                      | <a href="#">2020</a> | <a href="#">2019</a> |
| Lungenerkrankungen                                 | <a href="#">2020</a> | <a href="#">2019</a> |
| Erkrankungen der Bauchorgane                       | <a href="#">2020</a> | <a href="#">2019</a> |
| Gefäßoperationen                                   | <a href="#">2020</a> | <a href="#">2019</a> |
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe                   | <a href="#">2020</a> | <a href="#">2019</a> |
| Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe | <a href="#">2020</a> | <a href="#">2019</a> |
| Urologie   | <a href="#">2020</a> | <a href="#">2019</a> |
| Hautkrankheiten                                    | <a href="#">2020</a> | <a href="#">2019</a> |
| Intensivmedizin                                    | <a href="#">2020</a> | <a href="#">2019</a> |
| Palliativmedizin                                   | <a href="#">2020</a> | <a href="#">2019</a> |
| Ausgewählte Aufenthaltsdauern                      | <a href="#">2020</a> | <a href="#">2019</a> |
| COVID-19 Kennzahlen                                | <a href="#">2020</a> |                      |
| Zusatzinformationen                                | <a href="#">2020</a> | <a href="#">2019</a> |

[Lesehilfe](#)

G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

Jahr:

2020

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungswert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>   |

## Herzerkrankungen

### Herzinfarkt

|  |             |                   |             |  |
|--|-------------|-------------------|-------------|--|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Herzinfarkt                     | Information | 8,1%              | 5,1%        |  |
| Alle Patienten > 19 Jahre                                    |             | 6.783 von 83.313  | 18 von 356  |  |
| Alter 20 - 44 Jahre  | Information | 3,0%              | 0,0%        |  |
|  |             | 78 von 2.605      | 0 von 6     |  |
| Alter 45 - 64 Jahre  | Information | 4,5%              | 4,2%        |  |
|  |             | 1.235 von 27.509  | 4 von 96    |  |
| Alter 65 - 84 Jahre  | Information | 8,7%              | 4,2%        |  |
|  |             | 3.783 von 43.255  | 8 von 190   |  |
| Alter > 84 Jahre   | Information | 17,0%             | 9,4%        |  |
|  |             | 1.687 von 9.944   | 6 von 64    |  |
| Anteil der Herzinfarkte mit Linksherzkatheter                | Information | 82,5%             | 90,2%       |  |
|  |             | 68.718 von 83.313 | 321 von 356 |  |
| Todesfälle bei Direktaufnahme ohne Verlegung                 | Information | 9,0%              | 5,4%        |  |
| Alle Patienten > 19 Jahre                                    |             | 6.020 von 66.674  | 18 von 331  |  |
| Todesfälle bei Zuverlegung                                   | Information | 8,5%              | 0,0%        |  |
| Alle Patienten > 19 Jahre                                    |             | 762 von 8.951     | 0 von 2     |  |
| Anteil nicht näher bezeichneter akuter Infarktformen (I21.9) | Information | 1,0%              | 0,0%        |  |
|  |             | 813 von 83.211    | 0 von 356   |  |
| Anteil Transmuraler Herzinfarkte (STEMI)                     | Information | 33,8%             | 27,0%       |  |
|  |             | 28.194 von 83.313 | 96 von 356  |  |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Transmuraler Herzinfarkt        | Information | 12,0%             | 8,3%        |  |
|  |             | 3.375 von 28.194  | 8 von 96    |  |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Nichttransmuraler Herzinfarkt   | Information | 5,6%              | 3,8%        |  |
|  |             | 3.030 von 54.204  | 10 von 260  |  |
| Todesfälle bei Nebendiagnose Herzinfarkt                     | Information | 19,8%             | 12,8%       |  |
| Alle Patienten > 19 Jahre                                    |             | 5.014 von 25.372  | 5 von 39    |  |

### Herzinsuffizienz

|   |             |                    |            |  |
|---|-------------|--------------------|------------|--|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Herzinsuffizienz | Information | 7,8%               | 8,3%       |  |
| Alle Patienten > 19 Jahre                     |             | 13.178 von 168.955 | 35 von 422 |  |
| Alter 20 - 44 Jahre                           | Information | 2,5%               | 0,0%       |  |
|   |             | 43 von 1.711       | 0 von 3    |  |
| Alter 45 - 64 Jahre                           | Information | 3,3%               | 0,0%       |  |
|   |             | 575 von 17.661     | 0 von 22   |  |
| Alter 65 - 84 Jahre                           | Information | 6,7%               | 6,8%       |  |
|   |             | 6.533 von 97.253   | 17 von 249 |  |

G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

Jahr:

2020

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

| IQM Indikatoren  | IQM Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> | IQM Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik Erwartungswert<br><a href="#">SMR</a> |
|--|--|---|---|--|
| Alter > 84 Jahre   | Information                            | 11,5%<br>6.027 von 52.330                         | 12,2%<br>18 von 148                         |  |
| Linksherzinsuffizienz, Anteil mit Beschwerden bereits im Ruhezustand (NYHA IV)   | Information                            | 47,8%<br>53.702 von 112.281                       | 33,7%<br>100 von 297                        |  |
| <b>Linksherzkatheter</b>   |  |   |   |  |
| Anzahl aller Linksherzkatheter zur Koronardiagnostik<br>Alle Patienten > 19 Jahre  | Mengeninformation                      | 819,4 (648)<br>301.547                            | 1.124                                       |  |
| Todesfälle mit Linksherzkatheter bei Herzinfarkt, bezogen auf Patienten mit Herzinfarkt und Linksherzkatheter<br>Alle Patienten > 19 Jahre   | Information                            | 6,3%<br>4.207 von 67.111                          | 4,0%<br>13 von 321                          |  |
| Patienten mit diagnostischem Linksherzkatheter bei allen Erkrankungen (oder Z.n. Reanimation), ohne Hauptdiagnose Herzinfarkt und ohne Herz-OP, Anteil Todesfälle<br>Alle Patienten > 19 Jahre | Information                            | 1,5%<br>2.143 von 140.405                         | 1,3%<br>6 von 474                           |  |
| davon Patienten mit diagnostischem Linksherzkatheter ohne Hauptdiagnose Herzinfarkt und ohne andere Operationen, Anteil Todesfälle<br>Alle Patienten > 19 Jahre                                | Information                            | 1,2%<br>1.586 von 128.013                         | 1,4%<br>6 von 425                           |  |
| Patienten mit therapeutischem Linksherzkatheter ohne Hauptdiagnose Herzinfarkt und ohne Herz-OP, Anteil Todesfälle<br>Alle Patienten > 19 Jahre  | Information                            | 1,9%<br>1.463 von 78.940                          | 2,5%<br>8 von 324                           |  |
| davon Patienten mit therapeutischem Linksherzkatheter ohne Hauptdiagnose Herzinfarkt und ohne andere Operationen, Anteil Todesfälle<br>Alle Patienten > 19 Jahre                               | Information                            | 1,4%<br>1.026 von 74.216                          | 1,7%<br>5 von 299                           |  |
| Anteil der Behandlungen mit therapeutischem Linksherzkatheter ohne Hauptdiagnose Herzinfarkt und ohne Herz-OP<br>Alle Patienten > 19 Jahre   | Information                            | 36,0%<br>78.940 von 219.345                       | 40,6%<br>324 von 798                        |  |
| <b>Herzrhythmusstörungen</b>   |  |   |   |  |
| Patienten mit Herzrhythmusstörungen als Hauptdiagnose  | Mengeninformation                      | 407,4 (254)<br>176.812                            | 472   |  |

G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

Jahr:

2020

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

| IQM Indikatoren  | IQM<br>Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> | IQM<br>Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert<br><a href="#">SMR</a> |
|--|---|--|--|--|
| <b>Schrittmacher/Defibrillator Implantation</b>          |   |  |  |  |
| Implantation eines<br>Herzschrittmachers/Defibrillatoren | Mengeninformation                         | 149,3 (101)<br>53.735                                | 189  |  |
| davon Einsatz oder Wechsel von Defibrillatoren           | Mengeninformation                         | 56,5 (39)<br>15.534                                  | 42   |  |
| <b>Operationen am Herzen</b>                             |   |  |  |  |
| Patienten mit Herzoperationen                            | Mengeninformation                         | 260,5 (12)<br>52.887                                 | 6  |  |
| davon andere Operationen am Herzen                       | Mengeninformation                         | 53,9 (4)<br>10.287                                   | 6  |  |

G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

Jahr:

2020

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungswert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>   |

## Erkrankungen des Nervensystems und Schlaganfall

### Bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhaut

|   |                   |                       |                 |  |
|---|-------------------|-----------------------|-----------------|--|
| Bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhäute als Hauptdiagnose | Mengeninformation | 34,0 (6)<br>10.651    | 2               |  |
| Todesfälle bei Operationen am Gehirn bei bösartiger Neubildung          | Information       | 2,6%<br>103 von 3.951 | 0,0%<br>0 von 2 |  |

### Todesfälle bei Hauptdiagnose Schlaganfall

|   |             |                            |                 |  |
|---|-------------|----------------------------|-----------------|--|
| Todesfälle bei allen Formen des Schlaganfalls | Information | 9,9%<br>11.800 von 118.969 | 0,0%<br>0 von 7 |  |
| Alle Patienten > 19 Jahre                     |             |                            |                 |  |
| Alter 45 - 64 Jahre                           | Information | 5,0%<br>1.289 von 25.908   | 0,0%<br>0 von 1 |  |
| Alter 65 - 84 Jahre                           | Information | 9,5%<br>6.283 von 66.392   | 0,0%<br>0 von 4 |  |
| Alter > 84 Jahre                              | Information | 17,9%<br>4.100 von 22.894  | 0,0%<br>0 von 2 |  |

### Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirninfarkt

|  |             |                             |                 |  |
|--|-------------|-----------------------------|-----------------|--|
| Todesfälle bei Hirninfarkt   | Information | 7,2%<br>7.215 von 100.760   | 0,0%<br>0 von 3 |  |
| Alle Patienten > 19 Jahre  |             |                             |                 |  |
| Anteil der Hirninfarkte mit medikamentöser Auflösung des Blutgerinnsels (Thrombolyse)    | Information | 15,9%<br>16.034 von 100.760 | 0,0%<br>0 von 3 |  |
| Anteil der Hirninfarkte mit Entfernung des Blutgerinnsels durch Katheter (Thrombektomie) | Information | 9,2%<br>9.301 von 100.760   | 0,0%<br>0 von 3 |  |
| Anteil der Hirninfarkte mit Lungenentzündung   | Information | 10,2%<br>10.233 von 100.760 | 0,0%<br>0 von 3 |  |
| Alle Patienten > 19 Jahre  |             |                             |                 |  |
| Todesfälle bei Hirninfarkt ohne zuverlegte Patienten                                     | Information | 6,8%<br>6.296 von 92.836    | 0,0%<br>0 von 3 |  |
| Alle Patienten > 19 Jahre  |             |                             |                 |  |

### Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirnblutung

|  |             |                           |                 |  |
|--|-------------|---------------------------|-----------------|--|
| Todesfälle bei Hirnblutung (intrazerebral)   | Information | 27,9%<br>3.792 von 13.568 | 0,0%<br>0 von 4 |  |
| Alle Patienten > 19 Jahre                    |             |                           |                 |  |
| Anteil nicht näher bezeichneter Schlaganfall | Information | 0,3%<br>345 von 118.969   | 0,0%<br>0 von 7 |  |
| Alle Patienten > 19 Jahre                    |             |                           |                 |  |

### TIA (vorübergehende neurologische Ausfallerscheinungen)

|                    |             |                        |                 |  |
|--------------------|-------------|------------------------|-----------------|--|
| Todesfälle bei TIA | Information | 0,4%<br>136 von 38.244 | 0,0%<br>0 von 2 |  |
|--------------------|-------------|------------------------|-----------------|--|

G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

Jahr:

2020

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

| IQM Indikatoren  | IQM<br>Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> | IQM<br>Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert<br><a href="#">SMR</a> |
|--|---|--|--|--|
| TIA-Patienten - Anteil mit Behandlung in der Stroke Unit           | Information                               | 68,0%<br>26.023 von 38.244                           | 50,0%<br>1 von 2                               |  |
| <b>Epilepsie</b>   |   |  |  |  |
| Patienten mit Hauptdiagnose Epilepsie<br>Alle Patienten > 19 Jahre | Mengeninformation                         | 108,5 (28)<br>44.803                                 | 1  |  |

G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

Jahr:

2020

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> | IQM<br>Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert<br><a href="#">SMR</a> |
|-----------------|---|--|--|--|
|-----------------|---|--|--|--|

## Altersmedizin

### Geriatrische Frührehabilitation

|   |                   |                              |                      |  |
|---|-------------------|------------------------------|----------------------|--|
| Patienten mit geriatrischer Frührehabilitation    | Mengeninformation | 410,3 (327)<br>106.258       | 188                  |  |
| Geriatrische Frührehabilitation mit Barthel-Index | Information       | 97,1%<br>103.167 von 106.258 | 98,9%<br>186 von 188 |  |

### Mangelernährung bei älteren Patienten

|   |             |                              |                      |  |
|---|-------------|------------------------------|----------------------|--|
| Patienten mit erheblicher Mangelernährung, >= 65 Jahre und ohne Tumorerkrankung | Information | 1,0%<br>24.867 von 2.506.302 | 0,5%<br>33 von 6.217 |  |
| Patienten mit Sondenernährung/<br>Infusionsernährung                            | Information | 1,9%<br>473 von 24.867       | 0,0%<br>0 von 33     |  |



G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

Jahr:

2020

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der**
**[Präambel](#)**

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungswert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>   |

## Lungenerkrankungen

### Lungenentzündung (Pneumonie)

|  |             |                             |                     |  |
|--|-------------|-----------------------------|---------------------|--|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung<br>alle Altersgruppen                                    | Information | 15,2%<br>22.477 von 147.421 | 15,6%<br>42 von 270 |  |
| Alter < 20 Jahre   | Information | 0,3%<br>36 von 10.614       | 0,0%<br>0 von 1     |  |
| Alter 20 - 44 Jahre  | Information | 1,8%<br>156 von 8.669       | 0,0%<br>0 von 20    |  |
| Alter 45 - 64 Jahre  | Information | 6,2%<br>1.736 von 27.866    | 1,8%<br>1 von 57    |  |
| Alter 65 - 84 Jahre  | Information | 17,5%<br>12.111 von 69.376  | 16,0%<br>21 von 131 |  |
| Alter > 84 Jahre   | Information | 27,3%<br>8.438 von 30.896   | 32,8%<br>20 von 61  |  |
| Todesfälle bei Lungenentzündung ohne<br>Zuverlegung, Tumor, Mukoviszidose<br>Alle Patienten > 19 Jahre | Information | 13,9%<br>13.092 von 94.493  | 11,7%<br>21 von 180 |  |
| Alter 20 - 44 Jahre  | Information | 0,9%<br>65 von 7.218        | 0,0%<br>0 von 19    |  |
| Alter 45 - 64 Jahre  | Information | 3,9%<br>803 von 20.634      | 2,2%<br>1 von 45    |  |
| Alter 65 - 84 Jahre  | Information | 14,7%<br>6.686 von 45.417   | 12,5%<br>10 von 80  |  |
| Alter > 84 Jahre   | Information | 26,1%<br>5.538 von 21.224   | 27,8%<br>10 von 36  |  |
| Alter 1-19 Jahre   | Information | 0,4%<br>28 von 7.981        | 0,0%<br>0 von 1     |  |
| Todesfälle bei Lungenentzündung durch Aspiration<br>von Nahrungsmitteln oder Mageninhalt               | Information | 27,7%<br>3.323 von 11.993   | 34,8%<br>8 von 23   |  |

### COPD (Chronisch obstruktive Lungenerkrankung)

|  |             |                          |                  |  |
|--|-------------|--------------------------|------------------|--|
| Todesfälle bei COPD<br>Alle Patienten > 19 Jahre | Information | 4,6%<br>2.852 von 61.868 | 3,7%<br>3 von 81 |  |
| Todesfälle bei COPD mit FEV1 < 35%               | Information | 5,5%<br>1.180 von 21.637 | 0,0%<br>0 von 21 |  |
| Todesfälle bei COPD mit FEV1 >= 35% und < 50%    | Information | 2,2%<br>255 von 11.587   | 0,0%<br>0 von 5  |  |

G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

Jahr:

2020

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

| IQM Indikatoren   | IQM<br>Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> | IQM<br>Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert<br><a href="#">SMR</a> |
|---|---|--|--|--|
| Todesfälle bei COPD mit FEV1 >= 50% und < 70%   | Information                               | 1,0%<br>76 von 7.447                                 | 0,0%<br>0 von 5                                |  |
| Todesfälle bei COPD mit FEV1 n.n.bez.   | Information                               | 7,0%<br>1.291 von 18.462                             | 6,0%<br>3 von 50                               |  |
| Anteil COPD Fälle mit FEV1 n.n.bez. (Ziel < 5%)   | Information                               | 29,8%<br>18.462 von 61.868                           | 61,7%<br>50 von 81                             |  |
| <b>Lungenkrebs</b>  |   |  |  |  |
| Patienten mit Hauptdiagnose Lungenkrebs   | Mengeninformation                         | 186,9 (46)<br>78.132                                 | 15   |  |
| <b>Operationen an der Lunge</b>   |   |  |  |  |
| Todesfälle bei größeren operativen Entfernungen von Lunge/Bronchien                           | Information                               | 2,9%<br>406 von 13.865                               | 0,0%<br>0 von 13                               |  |
| Todesfälle bei operativer Teilentfernung eines Lungenflügels bei Lungenkrebs                  | Information                               | 2,4%<br>141 von 5.965                                | 0,0%<br>0 von 5                                |  |
| Anteil der operativen Entfernungen eines Lungenflügels bei Lungenkrebspatienten               | Information                               | 5,4%<br>340 von 6.305                                | 0,0%<br>0 von 5                                |  |
| Anteil der bronchioangioplastischen Entfernungen eines Lungenflügels bei Lungenkrebspatienten | Information                               | 8,6%<br>514 von 5.965                                | 0,0%<br>0 von 5                                |  |

G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

Jahr:

2020

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> | IQM<br>Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert<br><a href="#">SMR</a> |
|-----------------|---|--|--|--|
|-----------------|---|--|--|--|

## Erkrankungen der Bauchorgane

### Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen

|  |             |                            |                      |  |
|--|-------------|----------------------------|----------------------|--|
| Anteil laparoskopische Operationen                                 | Information | 94,4%<br>49.276 von 52.214 | 95,5%<br>316 von 331 |  |
| Anteil Umsteiger auf offene Operationen                            | Information | 3,2%<br>1.687 von 52.214   | 3,3%<br>11 von 331   |  |
| Anteil Todesfälle bei Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen | Information | 0,5%<br>283 von 52.214     | 0,0%<br>0 von 331    |  |

### Operation von Leisten-, Schenkel- und Nabelbrüchen (Hernien)

|   |             |                            |                      |  |
|---|-------------|----------------------------|----------------------|--|
| Todesfälle bei Bruchoperationen ohne anteilige Darmentfernung         | Information | 0,1%<br>84 von 61.663      | 0,0%<br>0 von 212    |  |
| Todesfälle bei Bruchoperationen mit anteiliger Darmentfernung         | Information | 2,3%<br>171 von 7.377      | 13,6%<br>3 von 22    |  |
| Anteil Leistenbruchoperationen mit Netz<br>Alle Patienten >= 20 Jahre | Information | 97,6%<br>41.788 von 42.804 | 98,7%<br>150 von 152 |  |

### Eingriffe an der Schilddrüse

|  |                   |                        |                 |  |
|--|-------------------|------------------------|-----------------|--|
| Operative Entfernung der Schilddrüse                                 | Mengeninformation | 49,3 (19)<br>16.768    | 2               |  |
| davon operative Entfernung der Schilddrüse bei gutartiger Erkrankung | Mengeninformation | 41,5 (18)<br>13.373    | 2               |  |
| Anteil der Beatmungsfälle (>24 Std.) nach Schilddrüseneingriff       | Information       | 0,7%<br>114 von 15.740 | 0,0%<br>0 von 2 |  |

### Große Operationen am Dick- und Enddarm (Kolon und Rektum)

|   |                   |                          |                    |  |
|---|-------------------|--------------------------|--------------------|--|
| Patienten mit Hauptdiagnose Dick-/Enddarmkrebs          | Mengeninformation | 126,0 (78)<br>52.660     | 135                |  |
| Patienten mit Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn        | Mengeninformation | 91,6 (58)<br>41.573      | 110                |  |
| Todesfälle bei operativer Entfernung des Dick-/Enddarms | Information       | 8,2%<br>3.291 von 40.184 | 7,5%<br>15 von 201 |  |

G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

Jahr:

2020

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

| IQM Indikatoren  | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungswert |
|--|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
|  | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>   |
| Todesfälle bei operativer Dickdarmentfernung bei Krebs, ohne komplizierende Diagnose                         | Information            | 3,6%<br>366 von 10.030   | 2,0%<br>1 von 49         |                       |
| Todesfälle bei operativer Dickdarmentfernung bei Krebs, mit komplizierender Diagnose                         | Information            | 12,8%<br>387 von 3.028   | 9,1%<br>1 von 11         |                       |
| Todesfälle bei operativer Enddarmentfernung bei Krebs  | Information            | 2,7%<br>131 von 4.871    | 7,4%<br>2 von 27         |                       |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Divertikel, ohne Abzess/Perforation                | Information            | 1,0%<br>20 von 2.039     | 0,0%<br>0 von 7          |                       |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Divertikel, mit Abzess/Perforation                 | Information            | 5,9%<br>309 von 5.248    | 8,0%<br>2 von 25         |                       |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Darmischämie                                       | Information            | 45,6%<br>1.105 von 2.423 | 36,4%<br>4 von 11        |                       |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Colitis oder Crohn                                 | Information            | 3,3%<br>68 von 2.031     | 0,0%<br>0 von 8          |                       |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei anderen Diagnosen                                  | Information            | 8,6%<br>905 von 10.514   | 7,9%<br>5 von 63         |                       |
| Anteil operative Leberentfernung bei Entfernung des Dick-/Enddarms bei Dick- und Enddarmkrebs                | Information            | 5,1%<br>917 von 17.929   | 5,7%<br>5 von 87         |                       |
| <b>Erkrankungen des Magens</b>   |                        |                          |                          |                       |
| Patienten mit Hauptdiagnose Magenkrebs (mit und ohne Magenoperation)   | Mengeninformation      | 45,1 (22)<br>17.768      | 20                       |                       |
| Todesfälle bei Geschwüren an Magen, Zwölffingerdarm oder Dünndarm als Hauptdiagnose (mit und ohne Operation) | Information            | 5,1%<br>1.077 von 21.130 | 17,1%<br>12 von 70       |                       |
| Magenentfernungen  | Mengeninformation      | 24,5 (10)<br>8.078       | 12                       |                       |

G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

Jahr:

2020

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

| IQM Indikatoren   | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungswert |
|---|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
|   | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>   |
| Todesfälle bei operativer Magenentfernung bei Magenkrebs (exkl. Speiseröhre)          | Information            | 5,2%<br>118 von 2.255    | 0,0%<br>0 von 4          |                       |
| Todesfälle bei operativer Magenentfernung kombiniert mit Speiseröhreneingriff         | Information            | 12,4%<br>44 von 354      | 100,0%<br>1 von 1        |                       |
| Todesfälle bei partieller und totaler operativer Magenentfernung bei anderer Diagnose | Information            | 5,2%<br>283 von 5.469    | 28,6%<br>2 von 7         |                       |
| <b>Eingriffe an der Speiseröhre (Ösophagus)</b>                                       |                        |                          |                          |                       |
| Todesfälle bei komplexen Eingriffen an der Speiseröhre                                | Information            | 9,0%<br>168 von 1.857    | 50,0%<br>1 von 2         |                       |
| <b>Eingriffe an der Bauchspeicheldrüse (Pankreas)</b>                                 |                        |                          |                          |                       |
| Todesfälle bei Eingriffen an der Bauchspeicheldrüse ohne Transplantation              | Information            | 8,5%<br>452 von 5.318    | 14,7%<br>5 von 34        |                       |
| Alle Patienten > 19 Jahre   |                        |                          |                          |                       |
| Todesfälle bei operativer Bauchspeicheldrüsenentfernung bei Bauchspeicheldrüsenkrebs  | Information            | 6,6%<br>210 von 3.189    | 0,0%<br>0 von 17         |                       |
| Anatomische Leberentfernung, Anteil Todesfälle  | Information            | 6,5%<br>214 von 3.268    | 0,0%<br>0 von 4          |                       |
| Alle Patienten > 19 Jahre   |                        |                          |                          |                       |

G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

Jahr:

2020

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> | IQM<br>Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert<br><a href="#">SMR</a> |
|-----------------|---|--|--|--|
|-----------------|---|--|--|--|

## Gefäßoperationen

### Operationen der Halsschlagader (Carotis)

|   |             |                      |                 |  |
|---|-------------|----------------------|-----------------|--|
| Todesfälle bei Operation der Halsschlagader, nur extrakranielle Operationen | Information | 1,0%<br>95 von 9.500 | 0,0%<br>0 von 1 |  |
|---|-------------|----------------------|-----------------|--|

### Eingriffe an der Hauptschlagader

|  |                   |                        |                  |  |
|--|-------------------|------------------------|------------------|--|
| Operationen an der Hauptschlagader (Aorta)                         | Mengeninformation | 48,7 (25)<br>10.174    | 3                |  |
| Operationen Ersatz der Bauchschlagader                             | Mengeninformation | 27,0 (20)<br>5.446     | 3                |  |
| Todesfälle bei rupturiertem Aortenaneurysma                        | Information       | 40,9%<br>904 von 2.210 | 50,0%<br>2 von 4 |  |
| davon Todesfälle bei Operation eines rupturierten Aortenaneurysmas | Information       | 32,6%<br>370 von 1.134 | 33,3%<br>1 von 3 |  |

### Operationen der Becken-/Bein-Arterien

|   |                   |                          |                   |  |
|---|-------------------|--------------------------|-------------------|--|
| Todesfälle bei Operationen der Becken-/Beinarterien                   | Information       | 6,2%<br>1.809 von 29.316 | 10,0%<br>3 von 30 |  |
| davon Todesfälle bei Ruheschmerz                                      | Information       | 1,9%<br>42 von 2.162     | 0,0%<br>0 von 1   |  |
| davon Todesfälle bei Ulzeration/Gangrän                               | Information       | 4,3%<br>155 von 3.637    | 0,0%<br>0 von 1   |  |
| davon Todesfälle bei arterieller Embolie/Thrombose                    | Information       | 10,5%<br>718 von 6.854   | 20,0%<br>2 von 10 |  |
| davon Todesfälle bei Komplikationen durch Prothesen/Implantate        | Information       | 4,6%<br>176 von 3.816    | 0,0%<br>0 von 4   |  |
| davon Todesfälle bei Aneurysma/Dissektion                             | Information       | 3,3%<br>54 von 1.619     | 0,0%<br>0 von 3   |  |
| davon Becken-/Beinarterienoperationen bei anderen komplexen Diagnosen | Mengeninformation | 16,3 (13)<br>4.065       | 11                |  |

### PTA (Perkutan transluminale Gefäßinterventionen)

|  |             |                          |                    |  |
|--|-------------|--------------------------|--------------------|--|
| Patienten mit Wiedereröffnung eines verschlossenen Gefäßes mittels Ballonkatheter, Anteil Todesfälle | Information | 3,1%<br>1.809 von 59.168 | 14,5%<br>10 von 69 |  |
|--|-------------|--------------------------|--------------------|--|

G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

Jahr:

2020

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

| IQM Indikatoren   | IQM<br>Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> | IQM<br>Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert<br><a href="#">SMR</a> |
|---|---|--|--|--|
| PTA Abdomen/Beinarterien mit arterieller Operation im gleichen stationären Aufenthalt | Mengeninformation                         | 40,9 (31)<br>9.990                                   | 7  |  |
| <b>Arteriovenöser Shunt</b>   |   |  |  |  |
| Anlegen eines arteriovenösen Shuntes  | Mengeninformation                         | 32,0 (20)<br>6.986                                   | 2  |  |

G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

Jahr:

2020

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der**

**[Präambel](#)**

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungswert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>   |

## Frauenheilkunde und Geburtshilfe

### Geburtshilfe

|   |             |                             |                        |  |
|---|-------------|-----------------------------|------------------------|--|
| Mütterliche Todesfälle bei der Geburt   | Information | 0,004%<br>12 von 287.164    | 0,000%<br>0 von 1.207  |  |
| Anteil vaginale Geburten mit Dammriss 3. und 4. Grades                                      | Information | 1,8%<br>3.603 von 196.268   | 1,6%<br>13 von 829     |  |
| Anteil vaginale Geburten mit Dammschnitt  | Information | 12,6%<br>24.644 von 196.268 | 11,8%<br>98 von 829    |  |
| Kaiserschnitttrate, Anteil an allen Geburten  | Information | 31,7%<br>90.896 von 287.164 | 31,3%<br>378 von 1.207 |  |
| Anteil sanfter Kaiserschnitt (nach Misgav-Ladach), Anteil an allen Kaiserschnittoperationen | Information | 74,7%<br>67.934 von 90.896  | 93,4%<br>353 von 378   |  |
| Anteil Kaiserschnitte bei risikoarmer Geburt  | Information | 26,1%<br>65.216 von 249.935 | 29,0%<br>335 von 1.154 |  |
| davon Anteil Kaiserschnitte bei risikoarmer Geburt<br>Alle Patientinnen < 35 Jahre          | Information | 24,2%<br>45.373 von 187.618 | 27,9%<br>223 von 798   |  |
| davon Anteil Kaiserschnitte bei risikoarmer Geburt<br>Alle Patientinnen >= 35 Jahre         | Information | 31,8%<br>19.843 von 62.317  | 31,5%<br>112 von 356   |  |

### Neugeborene

|   |                   |                         |       |  |
|---|-------------------|-------------------------|-------|--|
| Neugeborene mit Gewicht von 1.500 bis 2.499 Gramm | Mengeninformation | 73,1 (26)<br>17.840     | 10    |  |
| Neugeborene mit Gewicht > 2500 Gramm              | Mengeninformation | 1101,7 (837)<br>283.144 | 1.180 |  |

### Frauenheilkunde

|   |             |                            |                    |  |
|---|-------------|----------------------------|--------------------|--|
| Todesfälle bei operativer Entfernung der Gebärmutter bei gutartigen Erkrankungen<br>Alle Patienten > 14 Jahre | Information | 0,06 %<br>12 von 20.024    | 1,23 %<br>1 von 81 |  |
| Anteil der Patientinnen mit vaginaler/laparoskopischer Gebärmutterentfernung, ohne plastische Operation       | Information | 87,7%<br>17.420 von 19.863 | 91,4%<br>64 von 70 |  |



G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

Jahr:

2020

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

| IQM Indikatoren  | IQM<br>Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> | IQM<br>Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert<br><a href="#">SMR</a> |
|--|---|--|--|--|
| Anteil der Patientinnen mit vaginaler Gebärmutterentfernung, ohne plastische Operation   | Information                               | 34,2%<br>6.787 von 19.863                            | 28,6%<br>20 von 70                             |  |
| Anteil der Patientinnen mit vaginaler Entfernung durch Zerkleinerung der Gebärmutter   | Information                               | 7,8%<br>527 von 6.787                                | 10,0%<br>2 von 20                              |  |
| Anteil der Patientinnen mit laparoskopischer Gebärmutterentfernung, ohne plastische Operation  | Information                               | 53,5%<br>10.633 von 19.863                           | 62,9%<br>44 von 70                             |  |
| Anteil der Patientinnen mit laparoskopischer Entfernung durch Zerkleinerung der Gebärmutter  | Information                               | 34,1%<br>3.621 von 10.633                            | 59,1%<br>26 von 44                             |  |
| Anteil der Patientinnen mit Gebärmutterentfernung und Eierstockentfernung bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose<br>Alle Patientinnen < 50 Jahre  | Information                               | 7,2%<br>505 von 6.994                                | 15,8%<br>3 von 19                              |  |
| Anteil der Patientinnen mit Gebärmutterentfernung und Eierstockentfernung bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose<br>Alle Patientinnen >= 50 Jahre | Information                               | 29,6%<br>2.239 von 7.568                             | 48,6%<br>17 von 35                             |  |
| <b>Bösartige Neubildungen der Brust und der weiblichen Geschlechtsorgane</b>   |   |  |  |  |
| Patientinnen mit Krebserkrankung der Brust oder der Geschlechtsorgane als Hauptdiagnose  | Mengeninformation                         | 193,8 (71)<br>80.226                                 | 230  |  |
| Patientinnen mit Eierstockkrebs als Hauptdiagnose  | Mengeninformation                         | 30,3 (15)<br>10.782                                  | 14   |  |
| Todesfälle nach Eierstockentfernung bei Eierstockkrebs   | Information                               | 2,2%<br>61 von 2.835                                 | 9,1%<br>1 von 11                               |  |
| Patientinnen mit Gebärmutterkrebs als Hauptdiagnose  | Mengeninformation                         | 48,6 (24)<br>16.718                                  | 33   |  |
| Todesfälle nach Gebärmutterentfernung bei Gebärmutterkrebs   | Information                               | 0,7%<br>42 von 5.985                                 | 3,8%<br>1 von 26                               |  |

G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

Jahr:

2020

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

| IQM Indikatoren  | IQM Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> | IQM Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik Erwartungswert<br><a href="#">SMR</a> |
|--|--|---|---|--|
| Patienten mit Brustkrebs als Hauptdiagnose                       | Mengeninformation                      | 120,2 (38)<br>47.958                              | 180   |  |
| <b>Eingriffe an der Brust</b>                                    |  |   |   |  |
| Eingriffe an der Brust   | Mengeninformation                      | 138,5 (88)<br>40.174                              | 239   |  |
| Operationen der Brust bei Brustkrebs                             | Mengeninformation                      | 120,2 (97)<br>30.043                              | 114   |  |
| Anteil brusterhaltender Operationen bei Brustkrebs               | Information                            | 72,1%<br>21.658 von 30.043                        | 70,2%<br>80 von 114                         |  |
| <b>Eingriffe am Beckenboden bei der Frau</b>                     |  |   |   |  |
| Beckenbodenoperationen mit und ohne plastische Operation, gesamt | Mengeninformation                      | 52,0 (40)<br>16.009                               | 48  |  |
| davon bei Scheidenvorfall  | Mengeninformation                      | 40,9 (34)<br>12.022                               | 40  |  |
| davon bei Inkontinenz (ohne Scheidenvorfall)                     | Mengeninformation                      | 11,5 (7)<br>2.983                                 | 4   |  |
| davon bei anderen Diagnosen                                      | Mengeninformation                      | 5,3 (2)<br>1.004                                  | 4   |  |

G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

Jahr:

2020

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> | IQM<br>Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert<br><a href="#">SMR</a> |
|-----------------|---|--|--|--|
|-----------------|---|--|--|--|

## Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe

### Bösartige Neubildungen des Bewegungsapparates

|  |                   |                        |    |  |
|--|-------------------|------------------------|----|--|
| Patienten mit bösartiger Neubildung an Knochen, Gelenknorpel, peripheren Nerven, Retroperitoneum, Bindegewebe, Weichteilen | Mengeninformation | 44,5 (6)<br><br>15.802 | 12 |  |
|--|-------------------|------------------------|----|--|

### Gelenkersatz (Endoprothetik)

|   |             |                              |                        |  |
|---|-------------|------------------------------|------------------------|--|
| Todesfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung  | Information | 0,14 %<br><br>72 von 50.374  | 0,00 %<br><br>0 von 68 |  |
| Todesfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei hüftgelenksnahen Frakturen   | Information | 5,3%<br><br>1.054 von 19.902 | 3,9%<br><br>3 von 77   |  |
| Todesfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei anderen Diagnosen  | Information | 5,4%<br><br>344 von 6.423    | 6,7%<br><br>1 von 15   |  |
| Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung | Information | 2,8%<br><br>1.414 von 50.374 | 5,9%<br><br>4 von 68   |  |
| Todesfälle bei Wechsel Hüftgelenkersatz ohne Fraktur oder Infektion   | Information | 1,3%<br><br>68 von 5.154     | 9,1%<br><br>1 von 11   |  |
| Todesfälle bei Wechsel Hüftgelenkersatz wegen Fraktur oder Infektion  | Information | 4,3%<br><br>156 von 3.668    | 0,0%<br><br>0 von 4    |  |
| Todesfälle bei Kniegelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung  | Information | 0,05 %<br><br>23 von 46.532  | 0,00 %<br><br>0 von 23 |  |
| Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei Kniegelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung | Information | 1,9%<br><br>870 von 46.532   | 0,0%<br><br>0 von 23   |  |
| Todesfälle bei Wechsel Kniegelenkersatz oder -teilersatz  | Information | 0,30 %<br><br>14 von 4.725   | 0,00 %<br><br>0 von 1  |  |

G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

Jahr:

2020

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

| IQM Indikatoren  | IQM<br>Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> | IQM<br>Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert<br><a href="#">SMR</a> |
|--|---|--|--|--|
| Todesfälle bei Wechsel Kniegelenkersatz wegen Fraktur oder Infektion   | Information                               | 2,2%<br>42 von 1.915                                 | 0,0%<br>0 von 1                                |  |
| Todesfälle bei Hüft- oder Kniegelenkersatz bei Tumorerkrankung   | Information                               | 7,3%<br>180 von 2.469                                | 0,0%<br>0 von 4                                |  |
| <b>Hüftgelenknahe Frakturen</b>  |   |  |  |  |
| Todesfälle bei Schenkelhalsfraktur   | Information                               | 5,3%<br>1.622 von 30.809                             | 2,9%<br>3 von 103                              |  |
| Alle Patienten > 19 Jahre  |   |  |  |  |
| Alter 20 - 59 Jahre  | Information                               | 0,6%<br>15 von 2.400                                 | 0,0%<br>0 von 11                               |  |
| Alter 60 - 69 Jahre  | Information                               | 1,8%<br>62 von 3.381                                 | 0,0%<br>0 von 11                               |  |
| Alter 70 - 79 Jahre  | Information                               | 3,0%<br>208 von 6.835                                | 0,0%<br>0 von 21                               |  |
| Alter 80 - 84 Jahre  | Information                               | 4,8%<br>346 von 7.165                                | 7,7%<br>2 von 26                               |  |
| Alter 85 - 89 Jahre  | Information                               | 6,9%<br>417 von 6.005                                | 5,0%<br>1 von 20                               |  |
| Alter > 89 Jahre   | Information                               | 11,4%<br>574 von 5.023                               | 0,0%<br>0 von 14                               |  |
| Todesfälle bei Pertrochantärer Fraktur   | Information                               | 5,3%<br>1.503 von 28.270                             | 12,2%<br>9 von 74                              |  |
| Alle Patienten > 19 Jahre  |   |  |  |  |
| <b>Operationen der Wirbelsäule</b>   |   |  |  |  |
| Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark (ohne lokale Schmerztherapien)                              | Mengeninformation                         | 288,2 (170)<br>113.835                               | 414  |  |
| Wirbelsäulenoperation, Anteil Operationen am Rückenmark/Spinalkanal  | Mengeninformation                         | 79,4 (37)<br>25.022                                  | 49   |  |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder Wirbelkörper-Ersatz bei Tumor (inkl. komplexe Rekonstruktionen) | Information                               | 7,5%<br>287 von 3.815                                | 16,7%<br>2 von 12                              |  |

G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

Jahr:

2020

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

| IQM Indikatoren  | IQM<br>Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> | IQM<br>Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert<br><a href="#">SMR</a> |
|--|---|--|--|--|
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder Wirbelkörper-Ersatz bei Trauma (inkl. komplexe Rekonstruktionen, Rückenmarkoperation) | Information                               | 3,5%<br>512 von 14.669                               | 2,4%<br>1 von 42                               |  |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Operation bei Entzündung der Bandscheibe oder des Rückenmarks  | Information                               | 6,7%<br>183 von 2.712                                | 16,7%<br>1 von 6                               |  |
| Todesfälle bei komplexen Rekonstruktionen der Wirbelsäule (ohne Tumor oder Trauma)   | Information                               | 0,7%<br>12 von 1.820                                 | 0,0%<br>0 von 2                                |  |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder 1 Wirbelkörper-Ersatz (ohne Tumor, Trauma oder kompl. Rekonstruktionen)               | Information                               | 0,1%<br>15 von 13.094                                | 0,0%<br>0 von 96                               |  |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder 2 Wirbelkörper-Ersatz (ohne Tumor, Trauma oder kompl. Rekonstruktionen)               | Information                               | 0,2%<br>15 von 6.631                                 | 0,0%<br>0 von 54                               |  |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder 3 oder mehr Wirbelkörper-Ersatz (ohne Tumor, Trauma oder kompl. Rekonstruktionen)     | Information                               | 0,8%<br>32 von 4.122                                 | 0,0%<br>0 von 28                               |  |
| Todesfälle bei alleiniger 'Entlastung' (Dekompression) der Wirbelsäule   | Information                               | 0,1%<br>11 von 19.950                                | 0,0%<br>0 von 44                               |  |
| Todesfälle bei 'einfachen' Bandscheibenentfernungen  | Information                               | 0,06 %<br>10 von 18.096                              | 0,00 %<br>0 von 57                             |  |
| Todesfälle bei Vertebro-/Kyphoplastie (ohne Tumor, kompl. Rekonstruktion, Versteifung, WK-Ersatz oder Bandscheibeneingriffe)       | Information                               | 0,6%<br>40 von 7.143                                 | 2,9%<br>1 von 35                               |  |
| Todesfälle bei anderen Operationen an der Wirbelsäule oder am Rückenmark   | Information                               | 1,9%<br>412 von 21.783                               | 13,2%<br>5 von 38                              |  |

G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

Jahr:

2020

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

| IQM Indikatoren  | IQM<br>Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> | IQM<br>Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert<br><a href="#">SMR</a> |
|--|---|--|--|--|
| Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei 'einfachen' Bandscheibentfernungen                           | Information                               | 0,5%<br>83 von 18.096                                | 0,0%<br>0 von 57                               |  |
| <b>Nicht operative Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen</b>   |   |  |  |  |
| Lokale Schmerztherapie an der Wirbelsäule (ohne andere Wirbelsäulenoperation)                                      | Mengeninformation                         | 86,3 (40)<br>32.095                                  | 22   |  |
| Patienten mit Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen als Hauptdiagnose ohne Operation oder lokale Schmerztherapie | Mengeninformation                         | 133,4 (112)<br>59.230                                | 72   |  |
| <b>Mehrfachverletzungen - Polytraumen</b>  |   |  |  |  |
| Mehrfachverletzungen (Polytraumen) im Sinne der DRG-Definition   | Mengeninformation                         | 24,4 (10)<br>9.356                                   | 9  |  |

G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

Jahr:

2020

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> | IQM<br>Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert<br><a href="#">SMR</a> |
|-----------------|---|--|--|--|
|-----------------|---|--|--|--|

## Urologie

### Operationen der Niere

|   |             |                          |                    |  |
|---|-------------|--------------------------|--------------------|--|
| Todesfälle bei Totalentfernung der Niere bei bösartiger Neubildung                          | Information | 1,2%<br>48 von 3.910     | 0,0%<br>0 von 12   |  |
| Anteil laparoskopischer Operationen bei Totalentfernung der Niere bei bösartiger Neubildung | Information | 39,5%<br>1.545 von 3.910 | 0,0%<br>0 von 12   |  |
| Todesfälle bei Teilentfernung der Niere bei bösartiger Neubildung                           | Information | 0,27 %<br>9 von 3.385    | 0,00 %<br>0 von 15 |  |
| Anteil laparoskopischer Operationen bei Teilentfernung der Niere bei bösartiger Neubildung  | Information | 46,0%<br>1.558 von 3.385 | 0,0%<br>0 von 15   |  |
| Anteil der Teilentfernungen der Niere bei bösartiger Neubildung                             | Information | 46,4%<br>3.385 von 7.295 | 55,6%<br>15 von 27 |  |
| Todesfälle bei Totalentfernung der Niere bei anderer Diagnose                               | Information | 4,7%<br>99 von 2.108     | 0,0%<br>0 von 4    |  |
| Todesfälle bei Teilentfernung der Niere bei anderer Diagnose                                | Information | 0,4%<br>5 von 1.122      | 0,0%<br>0 von 2    |  |

### Harnblase

|   |                   |                           |                     |  |
|---|-------------------|---------------------------|---------------------|--|
| Patienten mit Blasenkrebs als Hauptdiagnose   | Mengeninformation | 128,8 (37)<br>44.946      | 162                 |  |
| Operationen an der Harnblase durch die Harnröhre  | Mengeninformation | 199,2 (198)<br>46.416     | 201                 |  |
| davon Entfernung des Tumorgewebes durch die Harnröhre                                       | Mengeninformation | 160,4 (154)<br>32.078     | 145                 |  |
| Anteil Entfernung des Tumorgewebes durch die Harnröhre mit Einbringen von Chemotherapeutika | Information       | 18,5%<br>5.926 von 32.078 | 32,4%<br>47 von 145 |  |
| Todesfälle bei Entfernung der Harnblase   | Information       | 4,6%<br>149 von 3.212     | 9,1%<br>1 von 11    |  |

G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

Jahr:

2020

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

| IQM Indikatoren  | IQM<br>Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> | IQM<br>Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert<br><a href="#">SMR</a> |
|--|---|--|--|--|
| Todesfälle bei vollständiger Entnahme aller Organe des kleinen Beckens bei Mann oder Frau                      | Information                               | 4,9%<br>32 von 651                                   | 0,0%<br>0 von 3                                |  |
| <b>Prostata</b>  |   |  |  |  |
| Todesfälle bei Operationen der Prostata durch die Harnröhre  | Information                               | 0,25 %<br>51 von 20.431                              | 0,93 %<br>1 von 107                            |  |
| Todesfälle bei Operationen der Prostata durch die Harnröhre bei bösartigen Erkrankungen                        | Information                               | 0,7%<br>49 von 6.730                                 | 2,6%<br>1 von 38                               |  |
| Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei Patienten mit Operation der Prostata durch die Harnröhre | Information                               | 4,3%<br>1.158 von 27.161                             | 0,0%<br>0 von 145                              |  |
| Patienten mit Prostatakrebs als Hauptdiagnose  | Mengeninformation                         | 89,7 (20)<br>34.344                                  | 58   |  |
| Todesfälle bei radikaler Prostataentfernung  | Information                               | 0,19 %<br>21 von 10.986                              | 0,00 %<br>0 von 26                             |  |
| <b>Nierensteine</b>  |   |  |  |  |
| Patienten mit Nierensteinen als Hauptdiagnose  | Mengeninformation                         | 193,4 (42)<br>77.156                                 | 343  |  |
| Anteil der Patienten mit Behandlung zur Steinentfernung  | Information                               | 53,1%<br>40.949 von 77.156                           | 50,1%<br>172 von 343                           |  |



G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

Jahr:

2020

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> | IQM<br>Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert<br><a href="#">SMR</a> |
|-----------------|---|--|--|--|
|-----------------|---|--|--|--|

## Hautkrankheiten

### Hautkrankheiten

|  |                   |                    |   |  |
|--|-------------------|--------------------|---|--|
| Patienten mit Melanom als Hauptdiagnose              | Mengeninformation | 45,1 (4)<br>12.905 | 5 |  |
| Patienten mit Dermatitis und Ekzem als Hauptdiagnose | Mengeninformation | 33,0 (5)<br>13.192 | 5 |  |

G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

Jahr:

2020

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

| IQM Indikatoren   | IQM<br>Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> | IQM<br>Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert<br><a href="#">SMR</a> |
|---|---|--|--|--|
| <b>Intensivmedizin</b>  |   |  |  |  |
| <b>Intensivmedizin</b>  |   |  |  |  |
| Todesfälle bei Beatmung > 24 Stunden ohne Neugeborene                     | Information                               | 35,3%<br>37.448 von 106.090                          | 50,0%<br>63 von 126                            |  |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) als Hauptdiagnose                  | Information                               | 26,3%<br>8.698 von 33.123                            | 40,0%<br>6 von 15                              |  |
| davon Todesfälle bei Sepsis mit Organversagen/Schock (als Hauptdiagnose)  | Information                               | 33,3%<br>7.403 von 22.237                            | 50,0%<br>4 von 8                               |  |
| davon Todesfälle bei Sepsis ohne Organversagen/Schock (als Hauptdiagnose) | Information                               | 11,9%<br>1.295 von 10.886                            | 28,6%<br>2 von 7                               |  |
| Todesfälle bei Sepsis (als Nebendiagnose)                                 | Information                               | 29,3%<br>28.536 von 97.323                           | 47,1%<br>66 von 140                            |  |
| davon Todesfälle bei Sepsis mit Organversagen/Schock (als Nebendiagnose)  | Information                               | 42,6%<br>23.061 von 54.127                           | 64,1%<br>50 von 78                             |  |
| <b>Angeborene Gerinnungsstörung</b>                                       |   |  |  |  |
| Patienten mit angeborenen Gerinnungsstörungen                             | Mengeninformation                         | 31,6 (15)<br>13.842                                  | 26   |  |
| davon operierte Patienten (mit angeborenen Gerinnungsstörungen)           | Mengeninformation                         | 21,3 (9)<br>8.750                                    | 22   |  |
| <b>Obduktionen</b>  |   |  |  |  |
| Obduktionsrate  | Information                               | 1,1%<br>1.887 von 175.455                            | 0,6%<br>2 von 355                              |  |

G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

Jahr:

2020

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                         | IQM<br>Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> | IQM<br>Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert<br><a href="#">SMR</a> |
|---|---|--|--|--|
| <b>Palliativmedizin</b>                 |   |  |  |  |
| Palliativmedizinische Komplexbehandlung | Mengeninformation                         | 178,9 (134)<br>44.003                                | 10   |  |

G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

Jahr:

2020

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der**

**[Präambel](#)**

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungswert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>   |

## Ausgewählte Aufenthaltsdauern

|  |             |                                  |                           |  |
|--|-------------|----------------------------------|---------------------------|--|
| Verweildauer in Tagen aller Patienten ohne Psychiatrie und Frührehabilitation  | Information | 5,69<br>36.224.648 von 6.370.532 | 5,20<br>76.813 von 14.761 |  |
| Verweildauer in Tagen bei Patienten mit Gallenblasenentfernungen bei Gallensteinen ohne Tumorfälle                   | Information | 4,93<br>257.185 von 52.214       | 4,40<br>1.457 von 331     |  |
| Verweildauer in Tagen bei Patienten mit Bruchoperationen ohne Darmentfernung   | Information | 2,29<br>141.368 von 61.663       | 2,28<br>483 von 212       |  |
| Verweildauer in Tagen bei Patienten mit extrakranieller Gefäßoperation ohne Frührehabilitation                       | Information | 8,27<br>78.154 von 9.455         | 4,00<br>4 von 1           |  |
| Verweildauer in Tagen bei Patienten mit Gebärmutterentfernung bei gutartigen Erkrankungen                            | Information | 4,53<br>92.549 von 20.429        | 6,51<br>553 von 85        |  |
| Verweildauer in Tagen bei Patienten mit Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) ohne Fraktur ohne Frührehabilitation     | Information | 8,15<br>404.376 von 49.594       | 9,26<br>602 von 65        |  |
| Verweildauer in Tagen bei Patienten mit Kniegelenkersatz (Erstimplantation) ohne Frührehabilitation                  | Information | 7,98<br>368.188 von 46.125       | 8,26<br>190 von 23        |  |
| Verweildauer in Tagen bei Patienten mit Operation der Prostata durch die Harnröhre                                   | Information | 5,30<br>143.722 von 27.137       | 4,01<br>582 von 145       |  |
| Verweildauer in Tagen bei Patienten mit Hauptdiagnose Herzinfarkt ohne Frührehabilitation, Alle Patienten > 19 Jahre | Information | 6,75<br>555.567 von 82.259       | 5,69<br>2.026 von 356     |  |
| Verweildauer in Tagen bei Patienten mit Hirninfarkt ohne Frührehabilitation, Alle Patienten > 19 Jahre               | Information | 8,25<br>765.892 von 92.882       | 9,33<br>28 von 3          |  |

G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

Jahr:

2020

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> | IQM<br>Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert<br><a href="#">SMR</a> |
|-----------------|---|--|--|--|
|-----------------|---|--|--|--|

**COVID-19 Kennzahlen (Virusnachweis = positiver Labornachweis / ICD Kode U07.1)**

|   |             |                                |                          |  |
|---|-------------|--------------------------------|--------------------------|--|
| COVID-19 - Anteil von Patienten mit Virusnachweis                               | Information | 1,14 %<br>73.687 von 6.484.035 | 0,90 %<br>134 von 14.949 |  |
| COVID-19 - Patienten mit Virusnachweis und schweren akuten Atemwegserkrankungen | Information | 68,23 %<br>50.280 von 73.687   | 73,13 %<br>98 von 134    |  |
| COVID-19 - Patienten mit Virusnachweis und ausgewählten Vorerkrankungen         | Information | 73,14 %<br>53.896 von 73.687   | 60,45 %<br>81 von 134    |  |
| COVID-19 - Mortalität bei Virusnachweis   | Information | 18,44 %<br>13.588 von 73.687   | 9,70 %<br>13 von 134     |  |

G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

Jahr:

2020

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert<br><br><a href="#">Quelle</a> | IQM<br>Durchschnittswert<br><br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Ist-Wert<br><br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert<br><br><a href="#">SMR</a> |
|-----------------|---|--|--|--|
|-----------------|---|--|--|--|

## Zusatzinformationen

|   |             |                         |                  |  |
|---|-------------|-------------------------|------------------|--|
| Anteil der Patienten in den G-IQI/CH-IQI Indikatoren                              | Information | 55,5%                   | 60,1%            |  |
| ohne Psychiatrie  |             | 3.598.118 von 6.483.872 | 8.991 von 14.949 |  |
| Anteil der dargestellten Todesfälle in den G-IQI/CH-IQI Sterblichkeitsindikatoren | Information | 61,3%                   | 63,9%            |  |
| ohne Psychiatrie  |             | 107.510 von 175.455     | 227 von 355      |  |
| Anteil der Todesfälle in allen G-IQI/CH-IQI Krankheitsgruppen                     | Information | 78,3%                   | 71,8%            |  |
| ohne Psychiatrie  |             | 137.338 von 175.455     | 255 von 355      |  |

G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

Jahr:

2019

IQM Indikatoren

| IQM<br>Zielwert<br><br><a href="#">Quelle</a> | IQM<br>Durchschnittswert<br><br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Ist-Wert<br><br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert<br><br><a href="#">SMR</a> |
|---|--|--|--|
|---|--|--|--|

## Herzerkrankungen

### Herzinfarkt

|  |                  |                   |              |              |
|--|------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Herzinfarkt                     | < Erwartungswert | <b>7,9%</b>       | <b>4,4%</b>  | <b>9,3%</b>  |
| Alle Patienten > 19 Jahre                                    | 1                | 7.050 von 89.717  | 19 von 431   | 0,47         |
| Alter 20 - 44 Jahre  | < Erwartungswert | <b>3,1%</b>       | <b>0,0%</b>  | <b>2,6%</b>  |
|  | 1                | 86 von 2.751      | 0 von 9      |              |
| Alter 45 - 64 Jahre  | < Erwartungswert | <b>4,4%</b>       | <b>0,0%</b>  | <b>4,3%</b>  |
|  | 1                | 1.278 von 29.268  | 0 von 94     |              |
| Alter 65 - 84 Jahre  | < Erwartungswert | <b>8,3%</b>       | <b>4,7%</b>  | <b>9,2%</b>  |
|  | 1                | 3.919 von 47.196  | 12 von 253   |              |
| Alter > 84 Jahre   | < Erwartungswert | <b>16,8%</b>      | <b>9,3%</b>  | <b>16,8%</b> |
|  | 1                | 1.767 von 10.502  | 7 von 75     |              |
| Anteil der Herzinfarkte mit Linksherzkatheter                | Information      | <b>80,7%</b>      | <b>90,0%</b> |              |
|  |                  | 72.443 von 89.717 | 388 von 431  |              |
| Todesfälle bei Direktaufnahme ohne Verlegung                 | Beobachtungswert | <b>8,8%</b>       | <b>4,7%</b>  |              |
| Alle Patienten > 19 Jahre                                    |                  | 6.142 von 69.894  | 19 von 401   |              |
| Todesfälle bei Zuverlegung                                   | Beobachtungswert | <b>8,5%</b>       | <b>0,0%</b>  |              |
| Alle Patienten > 19 Jahre                                    |                  | 908 von 10.664    | 0 von 6      |              |
| Anteil nicht näher bezeichneter akuter Infarktformen (I21.9) | Beobachtungswert | <b>1,1%</b>       | <b>0,2%</b>  |              |
|  |                  | 1.016 von 89.603  | 1 von 431    |              |
| Anteil Transmuraler Herzinfarkte (STEMI)                     | Information      | <b>32,7%</b>      | <b>24,4%</b> |              |
|  |                  | 29.336 von 89.717 | 105 von 431  |              |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Transmuraler Herzinfarkt        | < Erwartungswert | <b>11,5%</b>      | <b>10,5%</b> | <b>13,8%</b> |
|  | 1                | 3.385 von 29.336  | 11 von 105   |              |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Nichttransmuraler Herzinfarkt   | Beobachtungswert | <b>5,4%</b>       | <b>2,2%</b>  |              |
|  |                  | 3.216 von 59.251  | 7 von 325    |              |
| Todesfälle bei Nebendiagnose Herzinfarkt                     | Beobachtungswert | <b>18,5%</b>      | <b>20,8%</b> |              |
| Alle Patienten > 19 Jahre                                    |                  | 4.996 von 26.993  | 15 von 72    |              |

### Herzinsuffizienz

|   |                  |                    |             |             |
|---|------------------|--------------------|-------------|-------------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Herzinsuffizienz | < Erwartungswert | <b>7,3%</b>        | <b>8,6%</b> | <b>8,7%</b> |
| Alle Patienten > 19 Jahre                     | 1                | 13.881 von 189.944 | 41 von 476  | 0,99        |
| Alter 20 - 44 Jahre                           | < Erwartungswert | <b>2,5%</b>        | <b>0,0%</b> | <b>2,4%</b> |
|   | 1                | 46 von 1.821       | 0 von 6     |             |
| Alter 45 - 64 Jahre                           | < Erwartungswert | <b>3,1%</b>        | <b>5,9%</b> | <b>3,0%</b> |
|   | 1                | 621 von 19.854     | 2 von 34    |             |

G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

Jahr:

2019

| IQM Indikatoren  | IQM Zielwert          | IQM Durchschnittswert       | Klinik Ist-Wert      | Klinik Erwartungswert |
|--|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
|  | Quelle                | Fallzahl                    | Fallzahl             | SMR                   |
| Alter 65 - 84 Jahre  | < Erwartungswert<br>1 | 6,1%<br>6.722 von 110.830   | 7,5%<br>20 von 266   | 6,9%                  |
| Alter > 84 Jahre   | < Erwartungswert<br>1 | 11,3%<br>6.492 von 57.439   | 11,2%<br>19 von 170  | 12,9%                 |
| Linksherzinsuffizienz, Anteil mit Beschwerden bereits im Ruhezustand (NYHA IV) | Information           | 46,4%<br>58.194 von 125.416 | 31,2%<br>108 von 346 |                       |

### Linksherzkatheter

|   |                       |                           |                    |              |
|---|-----------------------|---------------------------|--------------------|--------------|
| Anzahl aller Linksherzkatheter zur Koronardiagnostik  | Mengeninformation     | 899,2 (714)               | 1.187              |              |
| Alle Patienten > 19 Jahre   |                       | 337.189                   |                    |              |
| Todesfälle mit Linksherzkatheter bei Herzinfarkt, bezogen auf Patienten mit Herzinfarkt und Linksherzkatheter   | < Erwartungswert<br>1 | 5,9%<br>4.140 von 70.755  | 3,9%<br>15 von 388 | 7,0%<br>0,55 |
| Alle Patienten > 19 Jahre   |                       |                           |                    |              |
| Patienten mit diagnostischem Linksherzkatheter bei allen Erkrankungen (oder Z.n. Reanimation), ohne Hauptdiagnose Herzinfarkt und ohne Herz-OP, Anteil Todesfälle | < 1,23%<br>1          | 1,4%<br>2.299 von 161.397 | 2,2%<br>11 von 499 |              |
| Alle Patienten > 19 Jahre   |                       |                           |                    |              |
| davon Patienten mit diagnostischem Linksherzkatheter ohne Hauptdiagnose Herzinfarkt und ohne andere Operationen, Anteil Todesfälle                                | Beobachtungswert      | 1,2%<br>1.708 von 148.303 | 2,0%<br>9 von 440  |              |
| Alle Patienten > 19 Jahre   |                       |                           |                    |              |
| Patienten mit therapeutischem Linksherzkatheter ohne Hauptdiagnose Herzinfarkt und ohne Herz-OP, Anteil Todesfälle  | Beobachtungswert      | 1,7%<br>1.540 von 89.688  | 3,7%<br>11 von 297 |              |
| Alle Patienten > 19 Jahre   |                       |                           |                    |              |
| davon Patienten mit therapeutischem Linksherzkatheter ohne Hauptdiagnose Herzinfarkt und ohne andere Operationen, Anteil Todesfälle                               | Beobachtungswert      | 1,3%<br>1.114 von 84.688  | 2,9%<br>8 von 278  |              |
| Alle Patienten > 19 Jahre   |                       |                           |                    |              |



G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

Jahr:

2019

| IQM Indikatoren  | IQM<br>Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> | IQM<br>Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert<br><a href="#">SMR</a> |
|--|---|--|--|--|
| Anteil der Behandlungen mit therapeutischem<br>Linksherzkatheter ohne Hauptdiagnose Herzinfarkt<br>und ohne Herz-OP<br>Alle Patienten > 19 Jahre | Information                               | 35,7%<br>89.688 von 251.085                          | 37,3%<br>297 von 796                           |  |
| <b>Herzrhythmusstörungen</b>   |   |  |  |  |
| Patienten mit Herzrhythmusstörungen als<br>Hauptdiagnose   | Mengeninformation                         | 457,5 (290)<br>197.644                               | 521  |  |
| <b>Schrittmacher/Defibrillator Implantation</b>  |   |  |  |  |
| Implantation eines<br>Herzschrittmachers/Defibrillatoren   | Mengeninformation                         | 153,5 (104)<br>56.502                                | 206  |  |
| davon Einsatz oder Wechsel von Defibrillatoren   | Mengeninformation                         | 56,4 (39)<br>15.850                                  | 47   |  |
| <b>Operationen am Herzen</b>   |   |  |  |  |
| Patienten mit Herzoperationen  | Mengeninformation                         | 279,8 (8)<br>57.634                                  | 4  |  |
| davon andere Operationen am Herzen   | Mengeninformation                         | 57,9 (4)<br>11.240                                   | 4  |  |

G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

Jahr:

2019

IQM Indikatoren

| IQM Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> | IQM Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik Erwartungswert<br><a href="#">SMR</a> |
|--|---|---|--|
|--|---|---|--|

## Erkrankungen des Nervensystems und Schlaganfall

### Bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhaut

|   |                   |                       |                 |  |
|---|-------------------|-----------------------|-----------------|--|
| Bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhäute als Hauptdiagnose | Mengeninformation | 35,1 (6)<br>11.270    | 4               |  |
| Todesfälle bei Operationen am Gehirn bei bösartiger Neubildung          | Beobachtungswert  | 2,8%<br>107 von 3.780 | 0,0%<br>0 von 2 |  |

### Todesfälle bei Hauptdiagnose Schlaganfall

|   |                  |                            |                  |             |
|---|------------------|----------------------------|------------------|-------------|
| Todesfälle bei allen Formen des Schlaganfalls | < Erwartungswert | 9,7%<br>12.044 von 124.532 | 0,0%<br>0 von 10 | 9,7%<br>0,0 |
| Alle Patienten > 19 Jahre                     | 1                |                            |                  |             |
| Alter 45 - 64 Jahre                           | < Erwartungswert | 4,8%<br>1.266 von 26.647   | 0,0%<br>0 von 1  | 4,3%        |
| Alter 65 - 84 Jahre                           | < Erwartungswert | 9,0%<br>6.303 von 70.416   | 0,0%<br>0 von 7  | 8,3%        |
| Alter > 84 Jahre                              | < Erwartungswert | 18,4%<br>4.317 von 23.442  | 0,0%<br>0 von 2  | 17,0%       |

### Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirninfarkt

|  |                  |                             |                 |             |
|--|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|
| Todesfälle bei Hirninfarkt   | < Erwartungswert | 7,1%<br>7.434 von 105.410   | 0,0%<br>0 von 7 | 8,3%<br>0,0 |
| Alle Patienten > 19 Jahre  | 1                |                             |                 |             |
| Anteil der Hirninfarkte mit medikamentöser Auflösung des Blutgerinnsels (Thrombolyse)    | Information      | 15,9%<br>16.721 von 105.410 | 0,0%<br>0 von 7 |             |
| Anteil der Hirninfarkte mit Entfernung des Blutgerinnsels durch Katheter (Thrombektomie) | Information      | 8,5%<br>8.983 von 105.410   | 0,0%<br>0 von 7 |             |
| Anteil der Hirninfarkte mit Lungenentzündung   | Beobachtungswert | 9,8%<br>10.353 von 105.410  | 0,0%<br>0 von 7 |             |
| Alle Patienten > 19 Jahre  |                  |                             |                 |             |
| Todesfälle bei Hirninfarkt ohne zuverlegte Patienten                                     | Beobachtungswert | 6,7%<br>6.488 von 96.673    | 0,0%<br>0 von 7 |             |
| Alle Patienten > 19 Jahre  |                  |                             |                 |             |

### Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirnblutung

|  |                  |                           |                  |  |
|--|------------------|---------------------------|------------------|--|
| Todesfälle bei Hirnblutung (intrazerebral)   | Beobachtungswert | 26,9%<br>3.800 von 14.128 | 0,0%<br>0 von 2  |  |
| Alle Patienten > 19 Jahre                    |                  |                           |                  |  |
| Todesfälle bei Hirnblutung (subarachnoidal)  | Beobachtungswert | 16,8%<br>755 von 4.482    | 0,0%<br>0 von 1  |  |
| Alle Patienten > 19 Jahre                    |                  |                           |                  |  |
| Anteil nicht näher bezeichneter Schlaganfall | < 1,0%           | 0,4%<br>512 von 124.532   | 0,0%<br>0 von 10 |  |
| Alle Patienten > 19 Jahre                    | 1                |                           |                  |  |

G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

Jahr:

2019

IQM Indikatoren

| IQM Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> | IQM Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik Erwartungswert<br><a href="#">SMR</a> |
|--|---|---|--|
|--|---|---|--|

### TIA (vorübergehende neurologische Ausfallerscheinungen)

|  |                  |                            |                 |  |
|--|------------------|----------------------------|-----------------|--|
| Todesfälle bei TIA                                       | Beobachtungswert | 0,3%<br>143 von 42.858     | 0,0%<br>0 von 1 |  |
| TIA-Patienten - Anteil mit Behandlung in der Stroke Unit | Information      | 67,8%<br>29.060 von 42.858 | 0,0%<br>0 von 1 |  |

### Epilepsie

|  |                   |                      |   |  |
|--|-------------------|----------------------|---|--|
| Patienten mit Hauptdiagnose Epilepsie<br>Alle Patienten > 19 Jahre | Mengeninformation | 121,5 (34)<br>50.059 | 1 |  |
|--|-------------------|----------------------|---|--|

G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

Jahr:

2019

IQM Indikatoren

| IQM Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> | IQM Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik Erwartungswert<br><a href="#">SMR</a> |
|--|---|---|--|
|--|---|---|--|

## Altersmedizin

### Geriatrische Frührehabilitation

|   | Mengeninformation | 510,7 (425)<br>128.191       | 373                  |  |
|---|-------------------|------------------------------|----------------------|--|
| Patienten mit geriatrischer Frührehabilitation    |                   |                              |                      |  |
| Geriatrische Frührehabilitation mit Barthel-Index | Information       | 97,0%<br>124.344 von 128.191 | 99,7%<br>372 von 373 |  |

### Mangelernährung bei älteren Patienten

|   | Information | 1,0%<br>29.266 von 2.891.977 | 0,6%<br>42 von 7.274 |  |
|---|-------------|------------------------------|----------------------|--|
| Patienten mit erheblicher Mangelernährung, >= 65 Jahre und ohne Tumorerkrankung |             |                              |                      |  |
| Patienten mit Sondenernährung/<br>Infusionsernährung                            | Information | 1,9%<br>551 von 29.266       | 0,0%<br>0 von 42     |  |

G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

Jahr:

2019

IQM Indikatoren

| IQM<br>Zielwert<br><br><a href="#">Quelle</a> | IQM<br>Durchschnittswert<br><br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Ist-Wert<br><br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert<br><br><a href="#">SMR</a> |
|---|--|--|--|
|---|--|--|--|

## Lungenerkrankungen

### Lungenentzündung (Pneumonie)

|  |                       |                             |                     |               |
|--|-----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung<br>alle Altersgruppen                                    | < Erwartungswert<br>1 | 10,6%<br>14.564 von 138.022 | 12,3%<br>36 von 292 | 14,3%         |
| Alter 20 - 44 Jahre  | < Erwartungswert<br>1 | 1,7%<br>110 von 6.497       | 7,7%<br>1 von 13    | 1,6%          |
| Alter 45 - 64 Jahre  | < Erwartungswert<br>1 | 5,7%<br>1.152 von 20.222    | 7,5%<br>3 von 40    | 5,7%          |
| Alter 65 - 84 Jahre  | < Erwartungswert<br>1 | 11,7%<br>7.547 von 64.447   | 11,0%<br>17 von 154 | 13,2%         |
| Alter > 84 Jahre   | < Erwartungswert<br>1 | 19,3%<br>5.709 von 29.508   | 17,6%<br>15 von 85  | 22,3%         |
| Todesfälle bei Lungenentzündung ohne<br>Zuverlegung, Tumor, Mukoviszidose<br>Alle Patienten > 19 Jahre | < Erwartungswert<br>1 | 8,7%<br>6.823 von 78.818    | 8,4%<br>15 von 178  | 11,8%<br>0,71 |
| Alter 20 - 44 Jahre  | < Erwartungswert<br>1 | 0,7%<br>39 von 5.222        | 0,0%<br>0 von 7     | 0,9%          |
| Alter 45 - 64 Jahre  | < Erwartungswert<br>1 | 2,9%<br>394 von 13.601      | 4,0%<br>1 von 25    | 2,9%          |
| Alter 65 - 84 Jahre  | < Erwartungswert<br>1 | 8,1%<br>3.244 von 40.173    | 4,7%<br>4 von 85    | 10,0%         |
| Alter > 84 Jahre   | < Erwartungswert<br>1 | 15,9%<br>3.146 von 19.822   | 16,4%<br>10 von 61  | 19,4%         |
| Todesfälle bei Lungenentzündung durch Aspiration<br>von Nahrungsmitteln oder Mageninhalt               | Beobachtungswert      | 27,0%<br>3.445 von 12.779   | 20,6%<br>7 von 34   |               |

### COPD (Chronisch obstruktive Lungenerkrankung)

|  |                       |                          |                   |              |
|--|-----------------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| Todesfälle bei COPD<br>Alle Patienten > 19 Jahre | < Erwartungswert<br>1 | 4,0%<br>3.464 von 86.713 | 6,1%<br>6 von 98  | 5,3%<br>1,15 |
| Todesfälle bei COPD mit FEV1 < 35%               | Information           | 4,7%<br>1.442 von 30.919 | 17,6%<br>3 von 17 |              |
| Todesfälle bei COPD mit FEV1 >= 35% und < 50%    | Information           | 1,7%<br>273 von 16.475   | 0,0%<br>0 von 3   |              |
| Todesfälle bei COPD mit FEV1 >= 50% und < 70%    | Information           | 1,0%<br>104 von 10.553   | 0,0%<br>0 von 2   |              |

G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

Jahr:

2019

| IQM Indikatoren   | IQM Zielwert      | IQM Durchschnittswert      | Klinik Ist-Wert    | Klinik Erwartungswert |
|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
|   | Quelle            | Fallzahl                   | Fallzahl           | SMR                   |
| Todesfälle bei COPD mit FEV1 >= 70%   | Information       | 1,0%<br>38 von 3.954       | 0,0%<br>0 von 1    |                       |
| Todesfälle bei COPD mit FEV1 n.n.bez.   | Information       | 6,5%<br>1.607 von 24.812   | 4,0%<br>3 von 75   |                       |
| Anteil COPD Fälle mit FEV1 n.n.bez. (Ziel < 5%)   | Information       | 28,6%<br>24.812 von 86.713 | 76,5%<br>75 von 98 |                       |
| <b>Lungenkrebs</b>  |                   |                            |                    |                       |
| Patienten mit Hauptdiagnose Lungenkrebs   | Mengeninformation | 200,5 (50)<br>84.212       | 25                 |                       |
| <b>Operationen an der Lunge</b>   |                   |                            |                    |                       |
| Todesfälle bei größeren operativen Entfernungen von Lunge/Bronchien                           | Beobachtungswert  | 3,1%<br>434 von 14.194     | 0,0%<br>0 von 14   |                       |
| Todesfälle bei operativer Teilentfernung eines Lungenflügels bei Lungenkrebs                  | < 2,7%<br>1       | 2,7%<br>171 von 6.236      | 0,0%<br>0 von 8    |                       |
| Anteil der operativen Entfernungen eines Lungenflügels bei Lungenkrebspatienten               | < 20%<br>1 / 3    | 5,2%<br>343 von 6.579      | 0,0%<br>0 von 8    |                       |
| Anteil der bronchioangioplastischen Entfernungen eines Lungenflügels bei Lungenkrebspatienten | Beobachtungswert  | 8,9%<br>555 von 6.236      | 12,5%<br>1 von 8   |                       |

G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

Jahr:

2019

IQM Indikatoren

| IQM<br>Zielwert<br><br><a href="#">Quelle</a> | IQM<br>Durchschnittswert<br><br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Ist-Wert<br><br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert<br><br><a href="#">SMR</a> |
|---|--|--|--|
|---|--|--|--|

## Erkrankungen der Bauchorgane

### Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen

|  |                  |                                   |                             |  |
|--|------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| Anteil laparoskopische Operationen                                 | > 94,1%<br>1     | <b>94,3%</b><br>53.189 von 56.405 | <b>94,5%</b><br>275 von 291 |  |
| Anteil Umsteiger auf offene Operationen                            | Beobachtungswert | <b>3,3%</b><br>1.871 von 56.405   | <b>4,1%</b><br>12 von 291   |  |
| Anteil Todesfälle bei Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen | < 0,47%<br>1     | <b>0,5%</b><br>293 von 56.405     | <b>0,7%</b><br>2 von 291    |  |

### Operation von Leisten-, Schenkel- und Nabelbrüchen (Hernien)

|  |                  |                                   |                             |  |
|--|------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| Todesfälle bei Bruchoperationen ohne anteilige Darmentfernung        | < 0,09%<br>1     | <b>0,1%</b><br>77 von 75.473      | <b>0,0%</b><br>0 von 237    |  |
| Todesfälle bei Bruchoperationen mit anteiliger Darmentfernung        | Beobachtungswert | <b>1,8%</b><br>155 von 8.682      | <b>2,8%</b><br>1 von 36     |  |
| Anteil Leistenbruchoperationen mit Netz<br>Alle Patienten < 20 Jahre | Information      | <b>11,1%</b><br>403 von 3.646     | <b>100,0%</b><br>1 von 1    |  |
| Anteil Leistenbruchoperationen mit Netz<br>Alle Patienten > 19 Jahre | Information      | <b>97,6%</b><br>50.754 von 52.025 | <b>97,1%</b><br>167 von 172 |  |

### Große Operationen am Dick- und Enddarm (Kolon und Rektum)

|  |                   |                                 |                           |  |
|--|-------------------|---------------------------------|---------------------------|--|
| Patienten mit Hauptdiagnose Dick-/Enddarmkrebs                                       | Mengeninformation | <b>142,7 (92)</b><br>58.938     | <b>147</b>                |  |
| Patienten mit Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn                                     | Mengeninformation | <b>104,5 (66)</b><br>47.635     | <b>99</b>                 |  |
| Todesfälle bei operativer Entfernung des Dick-/Enddarms                              | Beobachtungswert  | <b>7,7%</b><br>3.395 von 44.169 | <b>9,4%</b><br>21 von 223 |  |
| Todesfälle bei operativer Dickdarmentfernung bei Krebs, ohne komplizierende Diagnose | < 4,2%<br>1       | <b>3,8%</b><br>432 von 11.293   | <b>6,0%</b><br>3 von 50   |  |
| Todesfälle bei operativer Dickdarmentfernung bei Krebs, mit komplizierender Diagnose | Beobachtungswert  | <b>12,1%</b><br>386 von 3.183   | <b>23,8%</b><br>5 von 21  |  |
| Todesfälle bei operativer Enddarmentfernung bei Krebs                                | < 3,6%<br>1       | <b>3,1%</b><br>169 von 5.534    | <b>0,0%</b><br>0 von 24   |  |

G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

Jahr:

2019

**IQM Indikatoren**

|   | IQM<br>Zielwert<br><u>Quelle</u> | IQM<br>Durchschnittswert<br><u>Fallzahl</u> | Klinik<br>Ist-Wert<br><u>Fallzahl</u> | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert<br><u>SMR</u> |
|---|----------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Divertikel, ohne Abzess/Perforation | < 0,9%<br>1                      | 0,6%<br>15 von 2.347                        | 10,0%<br>1 von 10                     |   |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Divertikel, mit Abzess/Perforation  | Beobachtungswert                 | 5,1%<br>288 von 5.692                       | 9,5%<br>4 von 42                      |   |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Darmischämie                        | Information                      | 45,3%<br>1.082 von 2.388                    | 40,0%<br>4 von 10                     |   |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Colitis oder Crohn                  | Beobachtungswert                 | 2,7%<br>59 von 2.208                        | 0,0%<br>0 von 4                       |   |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei anderen Diagnosen                   | Information                      | 8,4%<br>964 von 11.524                      | 6,5%<br>4 von 62                      |   |
| Anteil operative Leberentfernung bei Entfernung des Dick-/Enddarms bei Dick- und Enddarmkrebs | Information                      | 4,9%<br>985 von 20.010                      | 6,3%<br>6 von 95                      |   |

**Erkrankungen des Magens**

|  |                   |                          |                   |  |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------|--|
| Patienten mit Hauptdiagnose Magenkrebs (mit und ohne Magenoperation)   | Mengeninformation | 47,1 (24)<br>19.069      | 32                |  |
| Todesfälle bei Geschwüren an Magen, Zwölffingerdarm oder Dünndarm als Hauptdiagnose (mit und ohne Operation) | Beobachtungswert  | 4,3%<br>1.024 von 23.840 | 2,8%<br>3 von 106 |  |
| Magenentfernungen  | Mengeninformation | 25,3 (12)<br>8.574       | 16                |  |
| Todesfälle bei operativer Magenentfernung bei Magenkrebs (exkl. Speiseröhre)                                 | Beobachtungswert  | 5,5%<br>139 von 2.517    | 9,1%<br>1 von 11  |  |
| Todesfälle bei partieller und totaler operativer Magenentfernung bei anderer Diagnose                        | Beobachtungswert  | 5,5%<br>314 von 5.665    | 20,0%<br>1 von 5  |  |

**Eingriffe an der Bauchspeicheldrüse (Pankreas)**

|   |                  |                       |                   |  |
|---|------------------|-----------------------|-------------------|--|
| Todesfälle bei Eingriffen an der Bauchspeicheldrüse ohne Transplantation<br>Alle Patienten > 19 Jahre | Beobachtungswert | 9,2%<br>509 von 5.525 | 23,8%<br>5 von 21 |  |
|---|------------------|-----------------------|-------------------|--|



G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

Jahr:

2019

IQM Indikatoren

| IQM Indikatoren  | IQM<br>Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> | IQM<br>Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert<br><a href="#">SMR</a> |
|--|---|--|--|--|
| Todesfälle bei operativer<br>Bauchspeicheldrüsenentfernung bei<br>Bauchspeicheldrüsenkrebs | Beobachtungswert                          | 7,5%<br><br>241 von 3.193                            | 30,0%<br><br>3 von 10                          |  |
| Anatomische Leberentfernung, Anteil Todesfälle<br>Alle Patienten > 19 Jahre                | Beobachtungswert                          | 6,2%<br><br>207 von 3.321                            | 0,0%<br><br>0 von 9                            |  |

G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

Jahr:

2019

IQM Indikatoren

| IQM Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> | IQM Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik Erwartungswert<br><a href="#">SMR</a> |
|--|---|---|--|
|--|---|---|--|

## Gefäßoperationen

### Operationen der Halsschlagader (Carotis)

|   |             |                       |                 |  |
|---|-------------|-----------------------|-----------------|--|
| Todesfälle bei Operation der Halsschlagader, nur extrakranielle Operationen | < 0,9%<br>1 | 0,8%<br>89 von 10.525 | 0,0%<br>0 von 4 |  |
|---|-------------|-----------------------|-----------------|--|

### Eingriffe an der Hauptschlagader

|  |                   |                        |                   |  |
|--|-------------------|------------------------|-------------------|--|
| Operationen an der Hauptschlagader (Aorta)                         | Mengeninformation | 53,6 (30)<br>11.103    | 1                 |  |
| Operationen Ersatz der Bauchschlagader                             | Mengeninformation | 30,3 (24)<br>5.939     | 1                 |  |
| Todesfälle bei rupturiertem Aortenaneurysma                        | Information       | 42,5%<br>954 von 2.246 | 100,0%<br>1 von 1 |  |
| davon Todesfälle bei Operation eines rupturierten Aortenaneurysmas | Information       | 34,4%<br>407 von 1.182 | 100,0%<br>1 von 1 |  |

### Operationen der Becken-/Bein-Arterien

|   |                   |                          |                  |  |
|---|-------------------|--------------------------|------------------|--|
| Todesfälle bei Operationen der Becken-/Beinarterien                   | Beobachtungswert  | 5,8%<br>1.848 von 31.931 | 8,3%<br>3 von 36 |  |
| davon Todesfälle bei Schaufensterkrankheit (Claudicatio)              | < 0,40%<br>1      | 0,3%<br>24 von 6.976     | 0,0%<br>0 von 3  |  |
| davon Todesfälle bei Ruheschmerz                                      | < 2,1%<br>1       | 2,2%<br>49 von 2.207     | 0,0%<br>0 von 3  |  |
| davon Todesfälle bei Ulzeration/Gangrän                               | < 4,9%<br>1       | 4,2%<br>159 von 3.745    | 0,0%<br>0 von 5  |  |
| davon Todesfälle bei arterieller Embolie/Thrombose                    | Beobachtungswert  | 10,1%<br>757 von 7.491   | 11,1%<br>1 von 9 |  |
| davon Todesfälle bei Komplikationen durch Prothesen/Implantate        | Beobachtungswert  | 3,8%<br>154 von 4.003    | 0,0%<br>0 von 6  |  |
| davon Todesfälle bei Aneurysma/Dissektion                             | Beobachtungswert  | 3,2%<br>61 von 1.906     | 0,0%<br>0 von 2  |  |
| davon Becken-/Beinarterienoperationen bei anderen komplexen Diagnosen | Mengeninformation | 15,3 (12)<br>3.989       | 8                |  |

G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

Jahr:

2019

IQM Indikatoren

| IQM Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> | IQM Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik Erwartungswert<br><a href="#">SMR</a> |
|--|---|---|--|
|--|---|---|--|

PTA (Perkutan transluminale Gefäßinterventionen)

|  |                   |                          |                   |  |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------|--|
| Patienten mit Wiedereröffnung eines verschlossenen Gefäßes mittels Ballonkatheter, Anteil Todesfälle | Beobachtungswert  | 2,7%<br>1.753 von 64.248 | 10,3%<br>6 von 58 |  |
| PTA Abdomen/Beinarterien mit arterieller OP im gleichen stationären Aufenthalt                       | Mengeninformation | 41,8 (34)<br>10.187      | 11                |  |

G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

Jahr:

2019

IQM Indikatoren

| IQM Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> | IQM Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik Erwartungswert<br><a href="#">SMR</a> |
|--|---|---|--|
|--|---|---|--|

## Frauenheilkunde und Geburtshilfe

### Geburtshilfe

|   |               |                             |                        |  |
|---|---------------|-----------------------------|------------------------|--|
| Mütterliche Todesfälle bei der Geburt   | < 0,003%<br>1 | 0,004%<br>13 von 291.611    | 0,000%<br>0 von 1.210  |  |
| Anteil vaginale Geburten mit Dammriss 3. und 4. Grades                                      | < 2,0%<br>1   | 1,8%<br>3.579 von 201.758   | 1,8%<br>15 von 846     |  |
| Anteil vaginale Geburten mit Dammschnitt  | Information   | 12,9%<br>26.094 von 201.758 | 12,8%<br>108 von 846   |  |
| Kaiserschnitttrate, Anteil an allen Geburten  | Information   | 30,8%<br>89.853 von 291.611 | 30,1%<br>364 von 1.210 |  |
| Anteil sanfter Kaiserschnitt (nach Misgav-Ladach), Anteil an allen Kaiserschnittoperationen | Information   | 74,9%<br>67.265 von 89.853  | 98,6%<br>359 von 364   |  |
| Anteil Kaiserschnitte bei risikoarmer Geburt  | Information   | 25,2%<br>63.541 von 252.561 | 27,6%<br>319 von 1.154 |  |
| davon Anteil Kaiserschnitte bei risikoarmer Geburt<br>Alle Patientinnen < 35 Jahre          | Information   | 23,3%<br>44.538 von 191.203 | 27,5%<br>215 von 782   |  |
| davon Anteil Kaiserschnitte bei risikoarmer Geburt<br>Alle Patientinnen >= 35 Jahre         | Information   | 31,0%<br>19.003 von 61.358  | 28,0%<br>104 von 372   |  |

### Neugeborene

|   |                   |                         |       |  |
|---|-------------------|-------------------------|-------|--|
| Neugeborene mit Gewicht von 1.250 bis 1.499 Gramm | Mengeninformation | 12,9 (11)<br>1.538      | 1     |  |
| Neugeborene mit Gewicht von 1.500 bis 2.499 Gramm | Mengeninformation | 77,7 (30)<br>19.263     | 11    |  |
| Neugeborene mit Gewicht > 2500 Gramm              | Mengeninformation | 1143,7 (882)<br>290.493 | 1.186 |  |

### Frauenheilkunde

|   |              |                        |                     |  |
|---|--------------|------------------------|---------------------|--|
| Todesfälle bei operativer Entfernung der Gebärmutter bei gutartigen Erkrankungen<br>Alle Patienten > 14 Jahre | < 0,03%<br>1 | 0,02 %<br>6 von 24.964 | 0,00 %<br>0 von 110 |  |
|---|--------------|------------------------|---------------------|--|

G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

Jahr:

2019

**IQM Indikatoren**

|  | IQM<br>Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> | IQM<br>Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert<br><a href="#">SMR</a> |
|--|---|--|--|--|
| Anteil der Patientinnen mit vaginaler/laparoskopischer Gebärmutterentfernung, ohne plastische Operation  | > 87,5%<br>1                              | 87,8%<br>21.712 von 24.726                           | 89,2%<br>91 von 102                            |  |
| Anteil der Patientinnen mit vaginaler Gebärmutterentfernung, ohne plastische Operation   | Information                               | 37,2%<br>9.192 von 24.726                            | 41,2%<br>42 von 102                            |  |
| Anteil der Patientinnen mit vaginaler Entfernung durch Zerkleinerung der Gebärmutter   | Information                               | 7,0%<br>644 von 9.192                                | 2,4%<br>1 von 42                               |  |
| Anteil der Patientinnen mit laparoskopischer Gebärmutterentfernung, ohne plastische Operation  | Information                               | 50,6%<br>12.520 von 24.726                           | 48,0%<br>49 von 102                            |  |
| Anteil der Patientinnen mit laparoskopischer Entfernung durch Zerkleinerung der Gebärmutter  | Information                               | 33,3%<br>4.164 von 12.520                            | 38,8%<br>19 von 49                             |  |
| Anteil der Patientinnen mit Gebärmutterentfernung und Eierstockentfernung bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose<br>Alle Patientinnen < 50 Jahre  | Information                               | 6,9%<br>615 von 8.868                                | 17,9%<br>5 von 28                              |  |
| Anteil der Patientinnen mit Gebärmutterentfernung und Eierstockentfernung bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose<br>Alle Patientinnen >= 50 Jahre | Information                               | 28,8%<br>2.792 von 9.695                             | 71,4%<br>35 von 49                             |  |

**Bösartige Neubildungen der Brust und der weiblichen Geschlechtsorgane**

|   |                   |                      |                  |  |
|---|-------------------|----------------------|------------------|--|
| Patientinnen mit Krebserkrankung der Brust oder der Geschlechtsorgane als Hauptdiagnose | Mengeninformation | 205,5 (69)<br>85.278 | 243              |  |
| Patientinnen mit Eierstockkrebs als Hauptdiagnose                                       | Mengeninformation | 32,3 (14)<br>11.363  | 24               |  |
| Todesfälle nach Eierstockentfernung bei Eierstockkrebs                                  | Beobachtungswert  | 2,1%<br>59 von 2.860 | 0,0%<br>0 von 13 |  |

G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

Jahr:

2019

| IQM Indikatoren  | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert      | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungswert |
|--|------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|
|  | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a>   | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>   |
| Patientinnen mit Gebärmutterkrebs als Hauptdiagnose              | Mengeninformation      | 48,7 (27)<br>17.096        | 39                       |                       |
| Todesfälle nach Gebärmutterentfernung bei Gebärmutterkrebs       | Beobachtungswert       | 0,8%<br>46 von 6.111       | 0,0%<br>0 von 32         |                       |
| Patienten mit Brustkrebs als Hauptdiagnose                       | Mengeninformation      | 127,6 (36)<br>51.819       | 170                      |                       |
| <b>Eingriffe an der Brust</b>                                    |                        |                            |                          |                       |
| Eingriffe an der Brust   | Mengeninformation      | 144,0 (85)<br>43.185       | 252                      |                       |
| Operationen der Brust bei Brustkrebs                             | Mengeninformation      | 124,6 (98)<br>31.530       | 111                      |                       |
| Anteil brusterhaltender Operationen bei Brustkrebs               | Information            | 72,4%<br>22.835 von 31.530 | 74,8%<br>83 von 111      |                       |
| <b>Eingriffe am Beckenboden bei der Frau</b>                     |                        |                            |                          |                       |
| Beckenbodenoperationen mit und ohne plastische Operation, gesamt | Mengeninformation      | 69,0 (54)<br>21.525        | 76                       |                       |
| davon bei Scheidenvorfall  | Mengeninformation      | 52,3 (43)<br>15.802        | 69                       |                       |
| davon bei Inkontinenz (ohne Scheidenvorfall)                     | Mengeninformation      | 16,0 (10)<br>4.375         | 7                        |                       |

G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

Jahr:

2019

IQM Indikatoren

| IQM<br>Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> | IQM<br>Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert<br><a href="#">SMR</a> |
|---|--|--|--|
|---|--|--|--|

## Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe

### Bösartige Neubildungen des Bewegungsapparates

|   |                   |                        |    |  |
|---|-------------------|------------------------|----|--|
| Patienten mit bösartiger Neubildung an Knochen, Gelenkknorpel, peripheren Nerven, Retroperitoneum, Bindegewebe, Weichteilen | Mengeninformation | 43,3 (6)<br><br>15.901 | 13 |  |
|---|-------------------|------------------------|----|--|

### Gelenkersatz (Endoprothetik)

|   |                  |                              |                        |  |
|---|------------------|------------------------------|------------------------|--|
| Todesfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung  | < 0,14%<br><br>1 | 0,14 %<br><br>80 von 55.199  | 0,00 %<br><br>0 von 67 |  |
| Todesfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei hüftgelenksnahen Frakturen   | Beobachtungswert | 5,4%<br><br>1.065 von 19.667 | 5,2%<br><br>4 von 77   |  |
| Todesfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei anderen Diagnosen  | Beobachtungswert | 5,5%<br><br>368 von 6.701    | 7,1%<br><br>1 von 14   |  |
| Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung | Beobachtungswert | 2,6%<br><br>1.449 von 55.199 | 3,0%<br><br>2 von 67   |  |
| Todesfälle bei Wechsel Hüftgelenkersatz ohne Fraktur oder Infektion   | < 1,02%<br><br>1 | 0,9%<br><br>53 von 5.897     | 0,0%<br><br>0 von 22   |  |
| davon Todesfälle bei Wechsel Hüftgelenkersatz mit Sonderprothesen   | Information      | 0,7%<br><br>8 von 1.199      | 0,0%<br><br>0 von 3    |  |
| Todesfälle bei Wechsel Hüftgelenkersatz wegen Fraktur oder Infektion  | Beobachtungswert | 3,9%<br><br>142 von 3.681    | 0,0%<br><br>0 von 4    |  |
| Todesfälle bei Kniegelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung  | < 0,07%<br><br>1 | 0,05 %<br><br>27 von 52.880  | 0,00 %<br><br>0 von 45 |  |
| Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei Kniegelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung | Beobachtungswert | 1,9%<br><br>1.011 von 52.880 | 0,0%<br><br>0 von 45   |  |

G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

Jahr:

2019

| IQM Indikatoren  | IQM Zielwert      | IQM Durchschnittswert | Klinik Ist-Wert | Klinik Erwartungswert |
|--|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
|  | Quelle            | Fallzahl              | Fallzahl        | SMR                   |
| Todesfälle bei Wechsel Kniegelenkersatz oder -teilersatz   | < 0,23%           | 0,37 %                | 0,00 %          |                       |
|  | 1                 | 19 von 5.192          | 0 von 3         |                       |
| davon Todesfälle bei Wechsel Kniegelenkersatz mit Sonderprothesen  | Information       | 0,5%                  | 0,0%            |                       |
|  |                   | 9 von 1.717           | 0 von 1         |                       |
| Todesfälle bei Hüft- oder Kniegelenkersatz bei Tumorerkrankung   | Beobachtungswert  | 6,4%                  | 0,0%            |                       |
|  |                   | 161 von 2.514         | 0 von 2         |                       |
| <b>Hüftgelenknahe Frakturen</b>  |                   |                       |                 |                       |
| Todesfälle bei Schenkelhalsfraktur   | < Erwartungswert  | 5,1%                  | 4,3%            | 4,9%                  |
| Alle Patienten > 19 Jahre  | 1                 | 1.581 von 30.947      | 4 von 93        | 0,87                  |
| Alter 20 - 59 Jahre  | < Erwartungswert  | 0,6%                  | 0,0%            | 0,5%                  |
|  | 1                 | 14 von 2.492          | 0 von 10        |                       |
| Alter 60 - 69 Jahre  | < Erwartungswert  | 1,5%                  | 0,0%            | 1,4%                  |
|  | 1                 | 50 von 3.352          | 0 von 14        |                       |
| Alter 70 - 79 Jahre  | < Erwartungswert  | 2,9%                  | 0,0%            | 3,0%                  |
|  | 1                 | 216 von 7.371         | 0 von 20        |                       |
| Alter 80 - 84 Jahre  | < Erwartungswert  | 5,0%                  | 11,1%           | 4,6%                  |
|  | 1                 | 355 von 7.170         | 2 von 18        |                       |
| Alter 85 - 89 Jahre  | < Erwartungswert  | 6,9%                  | 5,6%            | 8,3%                  |
|  | 1                 | 396 von 5.769         | 1 von 18        |                       |
| Alter > 89 Jahre   | < Erwartungswert  | 11,5%                 | 7,7%            | 11,0%                 |
|  | 1                 | 550 von 4.793         | 1 von 13        |                       |
| Todesfälle bei Petrochantärer Fraktur  | < Erwartungswert  | 5,2%                  | 8,8%            | 6,2%                  |
| Alle Patienten > 19 Jahre  | 1                 | 1.450 von 28.131      | 9 von 102       | 1,42                  |
| <b>Operationen der Wirbelsäule</b>   |                   |                       |                 |                       |
| Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark (ohne lokale Schmerztherapien)                              | Mengeninformation | 311,7 (176)           | 422             |                       |
|  |                   | 124.685               |                 |                       |
| Wirbelsäulenoperation, Anteil Operationen am Rückenmark/Spinalkanal  | Mengeninformation | 82,8 (34)             | 27              |                       |
|  |                   | 27.506                |                 |                       |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder Wirbelkörper-Ersatz bei Tumor (inkl. komplexe Rekonstruktionen) | Beobachtungswert  | 7,6%                  | 15,4%           |                       |
|  |                   | 272 von 3.597         | 2 von 13        |                       |



G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

Jahr:

2019

IQM Indikatoren

|  | IQM<br>Zielwert<br><u>Quelle</u> | IQM<br>Durchschnittswert<br><u>Fallzahl</u> | Klinik<br>Ist-Wert<br><u>Fallzahl</u> | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert<br><u>SMR</u> |
|--|----------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder Wirbelkörper-Ersatz bei Trauma (inkl. komplexe Rekonstruktionen, Rückenmarkoperation) | Beobachtungswert                 | 3,3%  | 0,0%                                  |   |
|  |                                  | 493 von 14.931                              | 0 von 37                              |   |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Operation bei Entzündung der Bandscheibe oder des Rückenmarks  | Beobachtungswert                 | 6,8%  | 14,3%                                 |   |
|  |                                  | 178 von 2.618                               | 1 von 7                               |   |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder 1 Wirbelkörper-Ersatz (ohne Tumor, Trauma oder kompl. Rekonstruktionen)               | Beobachtungswert                 | 0,1%  | 0,0%                                  |   |
|  |                                  | 14 von 13.822                               | 0 von 81                              |   |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder 2 Wirbelkörper-Ersatz (ohne Tumor, Trauma oder kompl. Rekonstruktionen)               | Beobachtungswert                 | 0,3%  | 0,0%                                  |   |
|  |                                  | 22 von 7.044                                | 0 von 52                              |   |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder 3 oder mehr Wirbelkörper-Ersatz (ohne Tumor, Trauma oder kompl. Rekonstruktionen)     | Beobachtungswert                 | 0,8%  | 0,0%                                  |   |
|  |                                  | 36 von 4.508                                | 0 von 46                              |   |
| Todesfälle bei alleiniger 'Entlastung' (Dekompression) der Wirbelsäule   | Beobachtungswert                 | 0,1%  | 0,0%                                  |   |
|  |                                  | 16 von 22.208                               | 0 von 42                              |   |
| Todesfälle bei 'einfachen' Bandscheibenentfernungen  | < 0,02%                          | 0,03 %                                      | 0,00 %                                |   |
|  | 1                                | 6 von 21.021                                | 0 von 55                              |   |
| Todesfälle bei Vertebro-/Kyphoplastie (ohne Tumor, kompl. Rekonstruktion, Versteifung, WK-Ersatz oder Bandscheibeneingriffe)       | Beobachtungswert                 | 0,5%  | 0,0%                                  |   |
|  |                                  | 44 von 8.379                                | 0 von 41                              |   |
| Todesfälle bei anderen Operationen an der Wirbelsäule oder am Rückenmark   | Beobachtungswert                 | 1,6%  | 14,6%                                 |   |
|  |                                  | 394 von 24.408                              | 7 von 48                              |   |
| Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei 'einfachen' Bandscheibenentfernungen   | Beobachtungswert                 | 0,5%  | 1,8%                                  |   |
|  |                                  | 99 von 21.021                               | 1 von 55                              |   |

G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

Jahr:

2019

IQM Indikatoren

| IQM Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> | IQM Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik Erwartungswert<br><a href="#">SMR</a> |
|--|---|---|--|
|--|---|---|--|

### Nicht operative Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen

|  |                   |                       |     |  |
|--|-------------------|-----------------------|-----|--|
| Lokale Schmerztherapie an der Wirbelsäule (ohne andere Wirbelsäulenoperation)                                      | Mengeninformation | 120,2 (49)<br>46.415  | 10  |  |
| Patienten mit Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen als Hauptdiagnose ohne Operation oder lokale Schmerztherapie | Mengeninformation | 186,5 (152)<br>83.378 | 107 |  |

### Mehrfachverletzungen - Polytraumen

|  |                   |                   |   |  |
|--|-------------------|-------------------|---|--|
| Mehrfachverletzungen (Polytraumen) im Sinne der DRG-Definition | Mengeninformation | 23,8 (9)<br>9.171 | 8 |  |
|--|-------------------|-------------------|---|--|

G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

Jahr:

2019

IQM Indikatoren

| IQM Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> | IQM Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik Erwartungswert<br><a href="#">SMR</a> |
|--|---|---|--|
|--|---|---|--|

## Urologie

### Operationen der Niere

|   |                  |                          |                    |  |
|---|------------------|--------------------------|--------------------|--|
| Todesfälle bei Totalentfernung der Niere bei bösartiger Neubildung                          | < 1,9%<br>1      | 2,0%<br>83 von 4.209     | 0,0%<br>0 von 8    |  |
| Anteil laparoskopischer Operationen bei Totalentfernung der Niere bei bösartiger Neubildung | Information      | 37,1%<br>1.560 von 4.209 | 0,0%<br>0 von 8    |  |
| Todesfälle bei Teilentfernung der Niere bei bösartiger Neubildung                           | < 0,5%<br>1      | 0,55 %<br>19 von 3.485   | 0,00 %<br>0 von 13 |  |
| Anteil laparoskopischer Operationen bei Teilentfernung der Niere bei bösartiger Neubildung  | Information      | 40,8%<br>1.421 von 3.485 | 0,0%<br>0 von 13   |  |
| Anteil der Teilentfernungen der Niere bei bösartiger Neubildung                             | Information      | 45,3%<br>3.485 von 7.694 | 61,9%<br>13 von 21 |  |
| Todesfälle bei Totalentfernung der Niere bei anderer Diagnose                               | Beobachtungswert | 4,3%<br>99 von 2.299     | 20,0%<br>1 von 5   |  |
| Todesfälle bei Teilentfernung der Niere bei anderer Diagnose                                | Beobachtungswert | 0,4%<br>5 von 1.123      | 0,0%<br>0 von 2    |  |

### Harnblase

|   |                   |                           |                     |  |
|---|-------------------|---------------------------|---------------------|--|
| Patienten mit Blasenkrebs als Hauptdiagnose   | Mengeninformation | 129,2 (30)<br>46.522      | 168                 |  |
| Operationen an der Harnblase durch die Harnröhre  | Mengeninformation | 210,0 (206)<br>48.310     | 227                 |  |
| davon Entfernung des Tumorgewebes durch die Harnröhre                                       | Mengeninformation | 159,8 (160)<br>33.228     | 153                 |  |
| Anteil Entfernung des Tumorgewebes durch die Harnröhre mit Einbringen von Chemotherapeutika | Beobachtungswert  | 18,4%<br>6.123 von 33.228 | 20,9%<br>32 von 153 |  |
| Todesfälle bei Entfernung der Harnblase   | < 4,9%<br>1       | 4,9%<br>162 von 3.332     | 28,6%<br>2 von 7    |  |

G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

Jahr:

2019

| IQM Indikatoren  | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert      | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungswert |
|--|------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|
|  | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a>   | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>   |
| Todesfälle bei vollständiger Entnahme aller Organe des kleinen Beckens bei Mann oder Frau                      | Beobachtungswert       | 5,7%<br>39 von 684         | 100,0%<br>1 von 1        |                       |
| <b>Prostata</b>  |                        |                            |                          |                       |
| Todesfälle bei Operationen der Prostata durch die Harnröhre  | < 0,17%<br>1           | 0,17 %<br>42 von 24.489    | 0,00 %<br>0 von 124      |                       |
| Todesfälle bei Operationen der Prostata durch die Harnröhre bei bösartigen Erkrankungen                        | Beobachtungswert       | 0,7%<br>53 von 7.754       | 1,9%<br>1 von 54         |                       |
| Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei Patienten mit Operation der Prostata durch die Harnröhre | Beobachtungswert       | 4,1%<br>1.319 von 32.243   | 1,1%<br>2 von 178        |                       |
| Patienten mit Prostatakrebs als Hauptdiagnose  | Mengeninformation      | 95,2 (20)<br>37.410        | 103                      |                       |
| Todesfälle bei radikaler Prostataentfernung  | < 0,11%<br>1           | 0,13 %<br>15 von 11.778    | 2,78 %<br>1 von 36       |                       |
| <b>Nierensteine</b>  |                        |                            |                          |                       |
| Patienten mit Nierensteinen als Hauptdiagnose  | Mengeninformation      | 208,2 (46)<br>84.516       | 341                      |                       |
| Anteil der Patienten mit Behandlung zur Steinentfernung  | Information            | 52,9%<br>44.667 von 84.516 | 41,6%<br>142 von 341     |                       |

G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

Jahr:

2019

IQM Indikatoren

| IQM Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> | IQM Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik Erwartungswert<br><a href="#">SMR</a> |
|--|---|---|--|
|--|---|---|--|

## Hautkrankheiten

### Hautkrankheiten

|  |                   |                    |   |  |
|--|-------------------|--------------------|---|--|
| Patienten mit Melanom als Hauptdiagnose              | Mengeninformation | 47,3 (4)<br>14.130 | 9 |  |
| Patienten mit Dermatitis und Ekzem als Hauptdiagnose | Mengeninformation | 44,8 (8)<br>18.545 | 2 |  |

G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

Jahr:

2019

IQM Indikatoren

| IQM<br>Zielwert<br><br><a href="#">Quelle</a> | IQM<br>Durchschnittswert<br><br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Ist-Wert<br><br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert<br><br><a href="#">SMR</a> |
|---|--|--|--|
|---|--|--|--|

## Intensivmedizin

### Intensivmedizin

|   |                   |  |                                |                          |
|---|-------------------|--|--------------------------------|--------------------------|
| Todesfälle bei Beatmung > 24 Stunden ohne Neugeborene                     | < 33,3%<br><br>1  | <b>33,8%</b><br><br>36.347 von 107.608 | <b>48,2%</b><br><br>54 von 112 |                          |
| ECMO - Lungenunterstützung  | Mengeninformation | <b>19,1 (5)</b><br><br>2.291           | 1                              |                          |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) als Hauptdiagnose                  | < Erwartungswert  | <b>15,8%</b><br><br>9.900 von 62.776   | <b>17,4%</b><br><br>16 von 92  | <b>16,7%</b><br><br>1,04 |
| davon Todesfälle bei Sepsis mit Organversagen/Schock (als Hauptdiagnose)  | < Erwartungswert  | <b>28,1%</b><br><br>8.166 von 29.016   | <b>40,5%</b><br><br>15 von 37  | <b>29,6%</b>             |
| davon Todesfälle bei Sepsis ohne Organversagen/Schock (als Hauptdiagnose) | < Erwartungswert  | <b>5,1%</b><br><br>1.734 von 33.760    | <b>1,8%</b><br><br>1 von 55    | <b>6,3%</b>              |
| Todesfälle bei Sepsis (als Nebendiagnose)                                 | Beobachtungswert  | <b>31,5%</b><br><br>24.214 von 76.891  | <b>50,4%</b><br><br>62 von 123 |                          |
| davon Todesfälle bei Sepsis mit Organversagen/Schock (als Nebendiagnose)  | Beobachtungswert  | <b>44,6%</b><br><br>20.323 von 45.525  | <b>71,2%</b><br><br>52 von 73  |                          |

### Angeborene Gerinnungsstörung

|   |                   |                                |    |  |
|---|-------------------|--------------------------------|----|--|
| Patienten mit angeborenen Gerinnungsstörungen                   | Mengeninformation | <b>34,4 (15)</b><br><br>15.226 | 37 |  |
| davon operierte Patienten (mit angeborenen Gerinnungsstörungen) | Mengeninformation | <b>22,8 (10)</b><br><br>9.451  | 28 |  |

### Obduktionen

|                |             |                                      |                              |  |
|----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------|--|
| Obduktionsrate | Information | <b>1,1%</b><br><br>1.881 von 174.719 | <b>0,3%</b><br><br>1 von 399 |  |
|----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------|--|

G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

Jahr:

2019

IQM Indikatoren

| IQM Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> | IQM Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik Erwartungswert<br><a href="#">SMR</a> |
|--|---|---|--|
|--|---|---|--|

### Palliativmedizin

|   |                   |                       |    |  |
|---|-------------------|-----------------------|----|--|
| Palliativmedizinische Komplexbehandlung | Mengeninformation | 177,6 (131)<br>45.284 | 10 |  |
|---|-------------------|-----------------------|----|--|

G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

Jahr:

2019

IQM Indikatoren

| IQM Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> | IQM Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik Erwartungswert<br><a href="#">SMR</a> |
|--|---|---|--|
|--|---|---|--|

## Ausgewählte Aufenthaltsdauern

|  |             |                                  |                           |  |
|--|-------------|----------------------------------|---------------------------|--|
| Verweildauer in Tagen aller Patienten<br>ohne Psychiatrie und Frührehabilitation   | Information | 5,65<br>41.583.454 von 7.356.614 | 5,20<br>87.605 von 16.842 |  |
| Verweildauer in Tagen bei Patienten mit<br>Gallenblasenentfernungen bei Gallensteinen<br>ohne Tumorfälle                   | Information | 4,93<br>278.008 von 56.405       | 5,08<br>1.477 von 291     |  |
| Verweildauer in Tagen bei Patienten mit Bruch-OP<br>ohne Darmentfernung  | Information | 2,36<br>178.079 von 75.473       | 2,47<br>585 von 237       |  |
| Verweildauer in Tagen bei Patienten mit<br>extrakranieller Gefäß-OP<br>ohne Frührehabilitation                             | Information | 8,37<br>87.531 von 10.457        | 5,50<br>22 von 4          |  |
| Verweildauer in Tagen bei Patienten mit<br>Gebärmutterentfernung bei gutartigen<br>Erkrankungen                            | Information | 4,73<br>120.002 von 25.397       | 3,75<br>428 von 114       |  |
| Verweildauer in Tagen bei Patienten mit<br>Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) ohne Fraktur<br>ohne Frührehabilitation     | Information | 8,79<br>477.155 von 54.276       | 8,97<br>574 von 64        |  |
| Verweildauer in Tagen bei Patienten mit<br>Kniegelenkersatz (Erstimplantation)<br>ohne Frührehabilitation                  | Information | 8,61<br>451.177 von 52.419       | 8,64<br>363 von 42        |  |
| Verweildauer in Tagen bei Patienten mit OP der<br>Prostata durch die Harnröhre   | Information | 5,55<br>178.854 von 32.208       | 3,48<br>620 von 178       |  |
| Verweildauer in Tagen bei Patienten mit<br>Hauptdiagnose Herzinfarkt<br>ohne Frührehabilitation, Alle Patienten > 19 Jahre | Information | 7,09<br>626.979 von 88.402       | 6,60<br>2.824 von 428     |  |
| Verweildauer in Tagen bei Patienten mit<br>Hirninfrakt<br>ohne Frührehabilitation, Alle Patienten > 19 Jahre               | Information | 8,54<br>824.175 von 96.484       | 3,57<br>25 von 7          |  |



G-IQI / CH-IQI 5.2 Stand: 15.04.2021

Jahr:

2019

IQM Indikatoren

| IQM Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> | IQM Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik Erwartungswert<br><a href="#">SMR</a> |
|--|---|---|--|
|--|---|---|--|

## Zusatzinformationen

|   |             |   |                                  |  |
|---|-------------|---|----------------------------------|--|
| Anteil der Patienten in den G-IQI/CH-IQI Indikatoren<br>ohne Psychiatrie                              | Information | <b>52,8%</b><br>3.956.534 von 7.493.219 | <b>56,0%</b><br>9.633 von 17.215 |  |
| Anteil der dargestellten Todesfälle in den G-IQI/CH-IQI Sterblichkeitsindikatoren<br>ohne Psychiatrie | Information | <b>58,8%</b><br>102.723 von 174.719     | <b>58,9%</b><br>235 von 399      |  |
| Anteil der Todesfälle in allen G-IQI/CH-IQI Krankheitsgruppen<br>ohne Psychiatrie                     | Information | <b>76,9%</b><br>134.369 von 174.719     | <b>64,4%</b><br>257 von 399      |  |



## Leseanleitung zu den IQM Indikatoren

### Lesebeispiel

Beim nachfolgenden Indikator „Todesfälle bei Hauptdiagnose Herzinfarkt (Alle Patienten > 19 Jahre)“ liegt der Wert der durchschnittlichen Krankenhaussterblichkeit in der Bundesrepublik bei 8,6 % (Quelle: Statistisches Bundesamt). Daraus ergibt sich rechnerisch für das Beispielkrankenhaus, aufgrund des Alters und Geschlechts der Patientinnen und Patienten des ausgewerteten Jahres, eine zu erwartende Krankenhaussterblichkeit von 8,4 % **4** als Erwartungswert. Ziel der IQM Mitgliedskrankenhäuser ist es, im Ergebnis unter diesem Erwartungswert zu liegen **1**. Der für das Beispielkrankenhaus tatsächlich gemessene Ist-Wert betrug in diesem Jahr 5,7 % **3** und lag damit unter dem Klinik Erwartungswert für den Qualitätsindikator „Todesfälle bei Hauptdiagnose Herzinfarkt“. Der Durchschnittswert aller IQM Mitgliedskrankenhäuser liegt bei diesem Indikator bei 7,9 % **2**. Erwartungswerte sind nur dann in der Ergebnisübersicht angegeben, wenn sie aus dem Material des Statistischen Bundesamtes zu errechnen waren.

| G-IQJ / CH-IQJ 5.2 Stand: 15.04.2021     |                       | Jahr: 2019               |                        |                       |
|--|-----------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| IQM Indikatoren                          | IQM Zielwert          | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert        | Klinik Erwartungswert |
|  | Quelle                | Fallzahl                 | Fallzahl               | SMR                   |
| <b>Herzerkrankungen</b>                  |                       |                          |                        |                       |
| <b>Herzinfarkt</b>                       |                       |                          |                        |                       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Herzinfarkt | <b>1</b>              | <b>2</b>                 | <b>3</b>               | <b>4</b>              |
| Alle Patienten > 19 Jahre                | = Erwartungswert<br>1 | 7,9%<br>6.909 von 87.973 | 5,7%<br>787 von 13.891 | 8,4%<br>0,67          |

Durch die COVID-19-Pandemie bedingt, erfolgt die Darstellung der Ergebnisse für das Jahr 2020 in leicht geänderter Weise:

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                          | IQM Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> | IQM Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik Erwartungswert<br><a href="#">SMB</a> |
|--|--|---|---|--|
| <b>Herzerkrankungen</b>                  |  |   |   |  |
| <b>Herzinfarkt</b>                       |  |   |   |  |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Herzinfarkt | Information                            | 8,1%  | 9,7%  |  |
| Alle Patienten > 19 Jahre                | 1                                      | 6.783 von 83.313                                  | 138 von 1.418                               |  |

Es werden keine Zielwerte oder Erwartungswerte angegeben, da die Orientierung an diesen Werten ausgesetzt ist. Bitte beachten Sie dazu auch die Hinweise in der Präambel.

## Die Indikatoren

Die von IQM verwendeten German/Swiss Inpatient Quality Indicators (G-IQI/CH-IQI) sind so ausgewählt, dass sie sowohl häufige und wichtige Krankheitsbilder, als auch wichtige Verfahren abbilden. Alle Indikatoren werden aus den Routinedaten des Krankenhauses ohne zusätzliche Dokumentation abgeleitet, wodurch kein weiterer Dokumentationsaufwand entsteht.

### Was wird gemessen?

Hierbei unterscheiden wir **absolute Mengeninformatio**nen von **relativen Mengeninformatio**nen, bei denen z.B. ein Anteil bestimmter Operationsverfahren ausgewiesen wird.

Wesentlicher Messwert ist die **Sterblichkeit** bei verschiedenen Krankheitsbildern, auch wenn wir uns bewusst sind, dass Sterblichkeit im Krankenhaus auch bei bester Medizin nicht vermeidbar ist. Deswegen vergleichen wir die Sterblichkeiten, wo verfügbar, mit bundesdurchschnittlichen Werten. Diese werden entweder aus Daten des **Statistischen Bundesamtes** oder aus Daten **des Forschungsdatenzentrums der statistischen Ämter des Bundes und der Länder** berechnet. Mit den Daten des Statistischen Bundesamtes wird eine **Risikogewichtung** für das **Alter** und das **Geschlecht** der behandelten Patienten ermöglicht. Kliniken mit einem hohen Anteil sehr alter Patienten weisen in der Regel eine andere Sterblichkeit auf als Kliniken mit vergleichsweise jungen Patienten.

Als wesentliche Orientierungshilfe zur Einordnung der Ergebnisse dient der **Erwartungswert**, weil er besagt, welche Sterblichkeit bei einer Patientengruppe gleicher Alters- und Geschlechtsverteilung im Bundesdurchschnitt zu erwarten wäre. Insofern ergeben sich für unterschiedliche Kliniken individuelle Erwartungswerte, da Unterschiede in der Alters- und Geschlechtszusammensetzung der behandelten Patienten bestehen. Ziel der IQM Krankenhäuser ist es, „bessere“ als die erwarteten Werte aufzuweisen.

Die Beziehung zwischen erwarteter Sterblichkeit und dem tatsächlichen Wert der Klinik nennt man wissenschaftlich „**standardized mortality rate**“ oder kurz „**SMR**“. Liegt diese Quote unter 1, dann ist die tatsächliche Sterblichkeit in der Klinik geringer als die zu erwartende, liegt sie über 1, ist die Sterblichkeit höher als eigentlich erwartet. Ein solcher Wert ist lediglich bei den Indikatoren errechenbar, bei denen die zu erwartende Sterblichkeit aus den Daten des Statistischen Bundesamtes ermittelt werden kann.

Liegen keine alters- und geschlechtsgewichteten Werte für einen Indikator vor, kann auch kein Erwartungswert errechnet werden. Wir sind uns ebenso bewusst, dass die Sterblichkeit bei manchen Indikatoren ein ausgesprochen seltenes Ereignis ist, und nicht als alleiniger Nachweis der medizinischen Qualität gelten darf. Die im „low risk“ Bereich gemessene Sterblichkeit ermöglicht in nachfolgenden Analysen dieser seltenen Ereignisse, wichtige Verbesserungspotentiale zu heben.

## Glossar

### IQM Zielwert - Quellen:

Die Quellen, aus denen sich die Referenz- bzw. Zielwerte ableiten, sind bei jedem Indikator durch die Zahl unter dem IQM Zielwert angegeben. Bitte beachten Sie, dass, durch die COVID-19-Pandemie bedingt, nur die Ergebnisse aus dem Jahr 2019 mit Ziel- bzw. Referenzwerten abgebildet werden. Weitere Informationen dazu finden Sie auch in der Präambel.

Die Referenzwerte bzw. Zielwerte leiten sich aus den folgenden Quellen ab:

1. Forschungsdatenzentren der statistischen Ämter des Bundes und der Länder, DRG-Statistik 2018. Eigene Berechnungen. Diese Daten bilden auch die Grundlage für die Berechnung der nach Alter und Geschlecht standardisierten klinikindividuellen Erwartungswerte (sofern angegeben).

1 / 3. Zielwert entnommen aus: Kaiser D (2007) Mindestmengen aus thoraxchirurgischer Sicht. Chirurg, 78 (11): 1012-1017

### IQM Durchschnittswert - Fallzahl:

Darstellung der Durchschnittsergebnisse über alle Patienten, die im Beobachtungszeitraum in IQM-Mitgliedskrankenhäusern (D) versorgt wurden. Die IQM Mengeninformation (Gesamt) wird als Durchschnittswert und in Klammern als Median angegeben.

### Klinik Erwartungswert:

Der Erwartungswert beinhaltet die erwartete Sterblichkeit der Patienten aufgrund ihrer Alters- und Geschlechtsverteilung und ist nur bei den Indikatoren angegeben, bei denen Vergleichszahlen des Bundesdurchschnitts die Berechnung erlauben. Bitte beachten Sie auch hier die Hinweise in der Präambel, dass Erwartungswerte nur für Ergebnisse aus dem Jahr 2019 angegeben werden.

### SMR:

Die SMR (standardized mortality ratio) ist der Quotient aus beobachteter Sterblichkeit (Durchschnittswert) und dem Erwartungswert und wird ebenfalls nur für Ergebnisse aus dem Jahr 2019 abgebildet (Details siehe Präambel).

### Hinweis zum Indikator „Obduktionsrate“:

Die Anzahl der ausgewiesenen Obduktionen ist möglicherweise nicht vollständig, da eine vollständige Kodierung nach Entlassung nicht von allen eingesetzten Klinik-Dokumentationssystemen unterstützt wird.