Résultats de qualité

HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023

Préambule

retour à la table des matières

Présentation des résultats et utilisation des sets d'indicateurs.

Nous aimerions vous donner ici des informations qui vous permettront de vous orienter et d'analyser plus facilement les résultats présentés ci-dessous.

Effets de la pandémie COVID-19

Les analyses régulières de l'évolution des prestations des hôpitaux membres de l'IQM pendant la pandémie COVID-19 ont montré que le nombre de cas s'est en partie nettement modifié au cours de la pandémie. L'utilisation des valeurs de référence comme aide à l'orientation en est également affectée, car celles-ci proviennent d'une année de données plus ancienne et contiennent donc des populations de patients qui ne sont éventuellement pas directement comparables. Pour cette raison, le comité directeur de l'IQM 2020 avait décidé, pour les deux dernières années, de ne pas indiquer de valeurs cibles pour les résultats de l'IQM dans la publication des résultats.

Au cours de l'année 2022 écoulée, des analyses plus approfondies ont donc été menées en se concentrant sur les indicateurs de valeur cible. Celles-ci ont montré que, bien que la population de cas change dans les indicateurs, le taux observé reste majoritairement stable. Ce n'est que dans les indicateurs G-IQI 14.2 (DP de pneumonie sans tumeur ni mucoviscidose,admissions directes, mortalité, âge>19,) et G-IQI 56.1 (Cas de respiration artificielle > 24 h (à l'exclusion des nouveaunés), mortalité) que „l'effet COVID" est clairement visible, même dans le taux. Le comité directeur de l'IQM a donc décidé de réintroduire la présentation des valeurs cibles et des valeurs attendues et de changer le statut de "valeur cible" pour les deux indicateurs de mortalité en cas de pneumonie et de mortalité en cas de ventilation > 24 heures, pour passer respectivement à des indicateurs alternatifs sans cas COVID-19.

Chiffres clés de la mortalité par accident vasculaire cérébral

Les indicateurs de mortalité en cas d'accident vasculaire cérébral et d'infarctus cérébral ne sont plus associés à des valeurs cibles. La raison en est que, selon les estimations des experts des sociétés spécialisées en neurologie et de l'Arbeitsgemeinschaft Deutschsprachiger Schlaganfallregister (ADSR), la qualité du traitement ne peut pas être représentée de manière adéquate dans les chiffres clés actuels en raison de différents facteurs d'influence tels que le délai jusqu'à l'admission, la gravité de l'infarctus cérébral, les maladies concomitantes, les chances de succès du traitement ou les directives anticipées du patient, etc. Cependant, étant donné qu'aucune publication alternative de la mortalité due à l' accident vasculaire cérébral n'est effectuée par d'autres institutions, la présentation - sans valeurs cibles - doit être maintenue et de nouveaux indicateurs appropriés pour le traitement des accidents vasculaires cérébraux doivent être développés en parallèle.

Présentation d'un petit nombre de cas

Pour la première fois, la présentation des résultats tient compte d'un nombre de cas nominal minimum. Ainsi, les résultats d'un ratio ne sont présentés en détail que si au moins 4 cas ou plus sont survenus dans le dénominateur. Si cette limite n'est pas atteinte, l'indication "<4" est alors présentée.

Les résultats se rapportant à des événements très rares sont présentés avec jusqu'à 4 chiffres après la virgule, afin de pouvoir afficher un résultat compris entre 0 et 1 pour les populations élevées.

Résultats de qualité

HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

DE FR EN

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023

IQM Indicateurs de qualité

Rapport de qualité

QSR-Résultats pluriannuels

Table des matières

Maladies cardiaques	2022	2021
Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral	2022	2021
Médecine gériatrique	2022	2021
Maladies pulmonaires	2022	2021
Maladies des organes abdominaux	2022	2021
Opérations de vaisseaux	2022	2021
Gynécologie et obstétrique	2022	2021
Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif	2022	2021
Maladies des voies urinaires et des organes génitaux masculins	2022	2021
Affections de la peau	2022	2021
Soins intensifs	2022	2021
Médicine hautement spécialisée	2022	2021
Médecine palliative	2022	2021
Interventions assistées par robot	2022	2021
COVID-19 Chiffres clés	2022	2021

Guide de lecture

Résultats de qualité
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2022

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
Maladies cardiaques				
Infarctus du myocarde				
DP infarctus du myocarde, mortalité âge > 19	< Valeur attendue 1	7,9% 6.267 de 79.312	5,3% 25 de 476	7,5% 0,70
Proportion de crises cardiaques avec cathéter de vaisseaux coronaires dans tous les cas	Information 1	84,5% 67.058 de 79.312	91,4% 435 de 476	
DP infarctus du myocarde, admissions directes pas transféré, mortalité âge > 19	Valeur d'observation 1	7,8% 5.600 de 71.443	5,3% 25 de 470	
Infarctus du myocarde transmural (STEMI), pourcentage	Information 1	33,8% 26.761 de 79.222	45,1% 214 de 475	
Infarctus du myocarde transmural, mortalité	< Valeur attendue 1	11,8% 3.162 de 26.761	8,9% 19 de 214	11,0%
Infarctus non transmural/NSTEMI, mortalité	< Valeur attendue 1	5,4% 2.808 de 51.693	2,4% 6 de 255	5,3%
Infarctus seulement comme DS, mortalité âge > 19	Valeur d'observation 1	19,8% 4.501 de 22.767	17,7% 41 de 231	
Insuffisance cardiaque				
DP insuffisance cardiaque, mortalité âge > 19	< Valeur attendue 1	8,5% 14.971 de 175.214	9,6% 120 de 1.256	9,7% 0,99
NYHA IV en cas de DP insuffisance ventriculaire gauche, pourcentage	Information 1	49,6% 57.589 de 116.188	56,3% 211 de 375	
Cathétérisme cardiaque				
Cas avec cathétérisme des vaisseaux coronaires âge > 19	Information de quantité 2	809,9 (666) 294.817	1.138	
Cathétérisme des vaisseaux coronaires en cas de DP infarctus du myocarde sans OP du cœur, mortalité (Mortalité prévu en fonction des cas de traitement avec cathéters coronaires et infarctus du myocarde) âge > 19	< Valeur attendue 1	6,3% 4.154 de 65.631	4,7% 19 de 406	5,6% 0,83
Cathétérisme diagnostique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde sans OP du cœur, mortalité âge > 19	<1,4% 1	1,7% 2.301 de 136.270	2,8% 12 de 434	

Résultats de qualité
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2022

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
Cathétérisme thérapeutique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde sans OP du cœur, mortalité âge > 19	Valeur d'observation 1	1,9% 1.492 de 78.965	1,7% 2 de 119	
Cathétérisme thérapeutique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde sans OP du cœur, pourcentage âge > 19	Information 1	36,7% 78.965 de 215.235	21,1% 119 de 564	
Cas avec cathétérisme cardiaque chez l'enfant et l'adolescent âge < 20	Information de quantité 2	24,7 (2) 3.034	44	
Troubles du rythme cardiaque				
DP troubles du rythme cardiaque	Information de quantité 2	432,4 (284) 183.778	486	
Implantation de pacemaker/défibrillateur				
Implantation de pacemaker/défibrillateur	Information de quantité 2	145,3 (102) 52.587	205	
Implantation et changement de défibrillateur	Information de quantité 2	51,5 (34) 14.330	44	
Thérapie ablative				
Ablation par cathéter	Information de quantité 2	241,6 (172) 48.797	205	
Ablation de l'oreillette en cas de fibrillation auriculaire / de flutter auriculaire, mortalité	Information 1	0,095% 29 de 30.520	0,0% 0 de 103	
Ablation chirugicale	Information de quantité 2	50,1 (32) 1.602	30	
Opérations du cœur				
Total des OP du cœur	Information de quantité 2	250,9 (10) 52.696	493	
OP des valves cardiaques	Information de quantité 2	287,4 (36) 35.640	279	
OP des vaisseaux coronaires	Information de quantité 2	466,2 (436) 17.714	124	
Autres OP du cœur	Information de quantité 2	54,6 (3) 9.834	211	
OP combinée du cœur	Information de quantité 2	253,1 (188) 9.366	116	
OP du cœur chez l'enfant et l'adolescent âge < 20	Information de quantité 2	39,1 (1) 1.721	167	

Résultats de qualité
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2022

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
Remplacement de la valve aortique ouverte, tous les cas	Information de quantité 2	234,9 (187) 8.455	54	
Remplacement isolé de valve aortique à cœur ouvert sans autre OP du cœur, mortalité	<2,3% 1	2,5% 82 de 3.296	0,0% 0 de 21	
Remplacement de la valve aortique ouverte avec remplacement de la valve mitrale, proportion de décès âge > 19	Valeur d'observation 1	15,2% 44 de 290	n.a. <4	
Remplacement de la valve aortique ouverte avec une autre chirurgie cardiaque, mortalité âge > 19	Valeur d'observation 1	7,7% 369 de 4.819	10,0% 3 de 30	
Implantation miniinvasive de valve aortique, mortalité	Valeur d'observation 1	1,9% 260 de 13.776	4,2% 3 de 71	
Implantation miniinvasive de valve aortique par voie endovasculaire, mortalité	Valeur d'observation 1	1,7% 233 de 13.370	4,2% 3 de 71	
Interventions endovasculaire/transapicale de la valve mitrale, mortalité	Valeur d'observation 1	2,8% 125 de 4.492	7,1% 1 de 14	
OP des vaisseaux coronaires uniquement, en cas de DP infarctus du myocarde, mortalité (Mortalité prévu en fonction des cas de traitement avec infarctus du myocarde et une chirurgie coronarienne), standardized mortality ratio (SMR)	< Valeur attendue 1	4,5% 176 de 3.904	0,0% 0 de 25	5,7% 0,00
OP des vaisseaux coronaires uniquement, en cas de DP infarctus du myocarde sans systèmes de soutien cardiaque, mortalité âge > 19	Valeur d'observation 1	3,0% 112 de 3.759	0,0% 0 de 20	
OP des vaisseaux coronaires uniquement, sans DP infarctus du myocarde, mortalité âge > 19	<2,0% 1	1,9% 178 de 9.143	1,4% 1 de 71	
OP des vaisseaux coronaires avec d'autres opérations cardiaques, mortalité âge > 19	Valeur d'observation 1	8,8% 406 de 4.635	11,5% 3 de 26	
OP des carotides en cas de remplacement isolé de valve aortique à cœur ouvert sans autre OP du cœur, pourcentage	Information 1	0,06% 2 de 3.296	0,0% 0 de 21	

Résultats de qualité
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2022

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
OP des carotides en cas d'OP des vaisseaux coronaires uniquement, sans DP infarctus du myocarde, pourcentage âge > 19	Information 1	0,48% 44 de 9.143	0,0% 0 de 71	

Résultats de qualité
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2022

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral				
Tumeurs malignes de l'encéphale ou des méninges cérébrales				
DP tumeurs malignes de l'encéphale ou des méninges cérébrales	Information de quantité 2	32,2 (7) 9.534	115	
OP du cerveau en cas de tumeurs malignes, mortalité	Valeur d'observation 1	3,3% 119 de 3.563	2,4% 1 de 42	
Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)				
DP d'accident vasculaire cérébral, toutes les formes, mortalité âge > 19	Valeur d'observation 1	10,6% 11.887 de 112.387	8,9% 78 de 873	
Accident vasculaire cérébrale différencié selon la forme de l'affection				
Infarctus cérébral (CIM10 I63), mortalité âge > 19	Valeur d'observation 1	7,9% 7.632 de 96.515	6,3% 46 de 726	
Infarctus cérébral (CIM10 I63) avec thrombolyse systémique, pourcentage	Information 1	15,8% 15.275 de 96.515	20,9% 152 de 726	
Infarctus cérébral (CIM10 I63) avec thrombolyse systémique, mortalité	Valeur d'observation 1	7,7% 1.181 de 15.275	10,5% 16 de 152	
Proportion d'infarctus cérébraux avec thrombectomie intracrânienne	Information 1	9,8% 9.469 de 96.515	11,6% 84 de 726	
Infarctus cérébral avec thrombectomie intracrânienne, mortalité	Valeur d'observation 1	20,7% 1.960 de 9.469	10,7% 9 de 84	
Infarctus cérébral (CIM10 I63) avec pneumonie, mortalité âge > 19	Valeur d'observation 1	10,0% 9.655 de 96.515	7,4% 54 de 726	
Infarctus cérébral (CIM10 I63) avec pneumonie, pourcentage âge > 19	Valeur d'observation 1	31,2% 3.008 de 9.655	35,2% 19 de 54	
Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)				
Hémorragie intracérébrale (CIM10 I61), mortalité âge > 19	Valeur d'observation 1	29,4% 3.508 de 11.918	25,5% 26 de 102	
Hémorragie sousarachnoïdienne (CIM10 I60), mortalité âge > 19	Valeur d'observation 1	19,5% 716 de 3.675	13,3% 6 de 45	

Résultats de qualité
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2022

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
Accident vasculaire cérébral, sans précision (CIM10 I64), pourcentage âge > 19	<0,55% 1	0,25% 279 de 112.387	0,0% 0 de 873	
AIT, mortalité	Valeur d'observation 1	0,3604% 130 de 36.068	0,0% 0 de 147	
Traitement en unité cérébro-vasculaire				
Traitement complexe neurlogique ou autre	Information de quantité 2	453,5 (426) 105.658	879	
Infarctus cérébral avec traitement complexe neurologique ou autre	Information 1	73,7% 71.138 de 96.515	86,8% 630 de 726	
AIT avec traitement complexe neurologique ou autre	Information 1	66,8% 24.102 de 36.068	85,0% 125 de 147	
Infarctus cérébral ou AIT avec traitement complexe neurologique ou autre, admissions directes (basé sur le registre des accidents vasculaires cérébraux)	Information 1	73,1% 91.428 de 125.014	86,6% 749 de 865	
Infarctus cérébral ou AIT avec traitement complexe neurologique ou autre, transféré d'un autre hôpital (basé sur le registre des accidents vasculaires cérébraux)	Information 1	50,4% 3.812 de 7.569	75,0% 6 de 8	
Epilepsie				
Traitements hospitaliers en cas de DP épilepsie âge > 19	Information de quantité 2	106,4 (27) 42.137	266	
Traitements hospitaliers en cas de DP épilepsie âge < 20	Information de quantité 2	51,5 (16) 11.649	85	
Sclérose en plaques				
Traitements hospitaliers en cas de DP sclérose en plaques	Information de quantité 2	38,9 (26) 10.120	34	

Résultats de qualité

HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2022

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
Médecine gériatrique				
Rééducation gériatrique précoce				
Rééducation gériatrique précoce	Information de quantité 2	408,8 (336) 106.708	36	
Malnutrition chez les personnes âgées				
Malnutrition / cachexie significative, âge > = 65, sans tumeur	Information 1	0,92% 23.470 de 2.546.804	5,62% 864 de 15.364	
Cas avec thérapie entérale / parentérale	Information 1	2,1% 498 de 23.470	23,3% 201 de 864	

Résultats de qualité
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2022

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
Maladies pulmonaires				
Pneumonie				
DP de pneumonie, mortalité Toutes les tranches d'âge	< Valeur attendue 1	15,3% 22.071 de 144.452	9,0% 148 de 1.644	16,6%
DP de pneumonie sans tumeur ni mucoviscidose, admissions directes, mortalité âge > 19	< Valeur attendue 1	14,1% 12.497 de 88.725	7,2% 82 de 1.138	15,8%
DP de pneumonie sans tumeur ni mucoviscidose, admissions directes, mortalité, COVID-19 âge > 19	< Valeur attendue 1	10,9% 5.983 de 54.716	5,3% 34 de 641	11,5% 0,46
DP de pneumonie sans tumeur ni mucoviscidose, admissions directes, mortalité, âge 1 - 19	Valeur d'observation 1	0,45% 50 de 11.118	0,84% 1 de 119	
Pneumonie par aspiration, mortalité	Valeur d'observation 1	29,9% 3.968 de 13.277	24,0% 36 de 150	
DP bronchite/bronchiolite, sans tumeur ni mucoviscidose, admissions directes, mortalité âge > 19	< Valeur attendue 1	2,2% 246 de 11.334	0,0% 0 de 24	2,4%
Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)				
BPCO sans tumeur, mortalité âge > 19	< Valeur attendue 1	5,4% 3.488 de 65.129	7,5% 25 de 335	5,1% 1,46
Cancer du poumon (carcinome bronchique)				
Traitements hospitaliers en cas de DP cancer du poumon	Information de quantité 2	174,9 (47) 71.536	322	
Opérations du poumon				
Total des résections pulmonaires ou bronchiques majeures, mortalité	Valeur d'observation 1	2,6% 336 de 13.096	0,0% 0 de 132	
Résections pulmonaires partielles en cas de carcinome bronchique, mortalité	<2,2% 1	2,2% 127 de 5.698	0,0% 0 de 76	
Pneumonectomie en cas de carcinome bronchique, pourcentage	<20% 1 / 3	4,1% 246 de 5.944	0,0% 0 de 76	
Bronchoplastie et angioplastie en cas de carcinome bronchique, pourcentage	Valeur d'observation 1	7,4% 423 de 5.698	5,3% 4 de 76	

Résultats de qualité
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2022

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
Maladies des organes abdominaux				
Ablation de la vésicule biliaire (cholécystectomie)				
Laparoscopie avec cholécystectomie en cas de calculs biliaires et cholécystite, sans tumeur, pourcentage	>94,6% 1	95,1% 52.517 de 55.228	96,0% 360 de 375	
Cholécystectomie en cas de calculs biliaires et cholécystite, sans tumeur, mortalité	<0,55% 1	0,574% 317 de 55.228	0,0% 0 de 375	
Réparations de hernie				
Herniotomie sans OP de l'intestin, mortalité	<0,12% 1	0,1244% 90 de 72.334	0,297% 1 de 337	
Herniotomie avec OP de l'intestin, mortalité	Valeur d'observation 1	2,4% 167 de 7.056	0,0% 0 de 8	
OP alloplastique de hernie inguinale, pourcentage âge < 20	Information 1	10,6% 301 de 2.845	4,3% 1 de 23	
OP alloplastique de hernie inguinale, pourcentage âge > 19	Information 1	98,2% 49.235 de 50.160	99,3% 146 de 147	
Opérations de la thyroïde				
Résections thyroïdiennes	Information de quantité 2	55,4 (21) 18.240	243	
Résections thyroïdiennes / parathyroïdiennes de tumeur maligne, pourcentage	Information de quantité 2	10,9 (4) 2.565	67	
Résections thyroïdiennes de tumeur benigne, pourcentage	Information de quantité 2	47,4 (20) 14.702	164	
Cas de respiration artificielle > 24 h en cas de résections thyroïdiennes, pourcentage	Information 1	0,53% 91 de 17.237	0,0% 0 de 231	
Radiothérapie par iode radioactif	Information de quantité 2	197,0 (177) 8.864	58	
Maladies du côlon et du rectum				
Traitements hospitaliers en cas de DP carcinome colorectal	Information de quantité 2	121,9 (81) 50.116	277	
Traitements hospitaliers en cas de colite ulcéreuse ou maladie de Crohn (DP ou DS)	Information de quantité 2	88,8 (57) 39.497	215	

Résultats de qualité
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2022

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
Total des résections colorectales, mortalité	Valeur d'observation 1	8,0% 3.136 de 39.173	6,0% 17 de 282	
Résections du côlon pour cancer colorectal sans diagnostic compliquant, mortalité	<3,9% 1	4,0% 393 de 9.719	2,5% 2 de 81	
Résections du côlon pour cancer colorectal avec diagnostic compliquant, mortalité	Valeur d'observation 1	11,4% 329 de 2.896	11,1% 2 de 18	
Résections du rectum pour cancer colorectal, mortalité	<3,1% 1	2,7% 122 de 4.566	0,0% 0 de 24	
Résections colorectales pour diverticule sans abcès/perforation, mortalité	<1,0% 1	0,43 % 9 de 2.103	0,00 % 0 de 11	
Résections colorectales pour diverticule avec abcès/perforation, mortalité	Valeur d'observation 1	5,4% 281 de 5.220	2,6% 1 de 39	
Résections colorectales pour ischémie intestinale, mortalité	Information 1	44,8% 1.018 de 2.274	28,6% 6 de 21	
Résections colorectales pour colite ulcéreuse ou maladie de Crohn, mortalité	Valeur d'observation 1	2,9% 59 de 2.019	0,0% 0 de 22	
Résections du côlon pour autre diagnostic	Information 1	8,9% 925 de 10.376	9,1% 6 de 66	
Résection/destruction du foie avec résections colorectales pour carcinome colorectal, pourcentage	Information 1	4,8% 826 de 17.181	4,9% 6 de 123	
Maladies de l'estomac				
Traitements hospitaliers en cas de DP cancer de l'estomac	Information de quantité 2	43,0 (24) 16.824	112	
DP ulcère de l'estomac, du duodénum ou du jéjunum, sans tumeur, mortalité	Valeur d'observation 1	5,5% 1.148 de 20.709	5,2% 5 de 97	
Total des gastrectomies	Information de quantité 2	31,6 (11) 10.380	153	
Gastrectomies (sans OP de l'œsophage) en cas de cancer de l'estomac, mortalité	Valeur d'observation 1	5,6% 123 de 2.189	0,0% 0 de 17	

Résultats de qualité
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2022

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
Gastrectomies avec OP complexe de l'œsophage, mortalité	Valeur d'observation 1	17,2% 42 de 244	0,0% 0 de 18	
Gastrectomies partielles ou totales pour autre diagnostic, mortalité	Valeur d'observation 1	3,7% 296 de 7.947	0,0% 0 de 118	
Chirurgie bariatrique				
Chirurgie bariatrique, mortalité	Valeur d'observation 1	0,0631% 7 de 11.099	0,0% 0 de 105	
Opérations de l'œsophage				
Interventions complexes de l'œsophage, mortalité	Valeur d'observation 1	8,4% 149 de 1.782	0,0% 0 de 21	
Opérations du pancréas				
Total des interventions sur le pancréas (sans transplantation), mortalité âge > 19	Valeur d'observation 1	9,0% 461 de 5.105	2,7% 2 de 73	
Résections du pancréas en cas de tumeurs malignes du pancréas (TIPMP inclus), mortalité	Valeur d'observation 1	7,4% 220 de 2.957	2,9% 1 de 35	
Résections anatomiques du foie, mortalité âge > 19	Valeur d'observation 1	7,0% 203 de 2.895	2,6% 1 de 39	

Résultats de qualité
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2022

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
Opérations de vaisseaux				
Opérations des artères cérébrales				
OP des vaisseaux extracrâniens sur l'artère carotide, mortalité	<0,98% 1	1,09% 102 de 9.322	0,0% 0 de 52	
Implantation percutanée de stents dans l'artère carotide, mortalité	<1,9% 1	2,8% 69 de 2.492	0,0% 0 de 24	
Autres OP des vaisseaux extracrâniens en cas d'OP du cœur, de l'aorte, des artères des jambes, de traumatisme ou de tumeurs malignes ORL, mortalité	Valeur d'observation 1	14,6% 246 de 1.680	n.a. <4	
Interventions vasculaires percutanées transluminales intracrâniennes	Information de quantité 2	95,4 (43) 15.168	63	
Dilatation de l'aorte (anévrisme de l'aorte)				
Total des OP de l'aorte	Information de quantité 2	49,9 (28) 10.380	63	
Résection/remplacement de l'aorte abdominale	Information de quantité 2	26,4 (23) 5.377	34	
Résection/remplacement de l'aorte abdominale en cas d'anévrisme de l'aorte sans rupture, OP à ciel ouvert, mortalité	<6,3% 1	6,5% 50 de 771	0,0% 0 de 4	
Stentgraft endovasculaire de l'aorte abdominale en cas d'anévrisme (EVAR), sans rupture, mortalité	<1,3% 1	1,4% 44 de 3.133	0,0% 0 de 22	
Résection/remplacement de l'aorte abdominale sans anévrisme, OP à ciel ouvert, mortalité	Valeur d'observation 1	9,3% 46 de 496	n.a. <4	
Résection/remplacement de l'aorte thoracique/thoracoabdominale sans anévrisme, mortalité	Valeur d'observation 1	19,1% 72 de 376	12,5% 1 de 8	
Anévrisme de l'aorte avec rupture, mortalité	Information 1	41,8% 814 de 1.949	31,3% 5 de 16	
Anévrisme de l'aorte avec rupture, avec OP, mortalité	Information 1	32,3% 327 de 1.013	18,2% 2 de 11	

Résultats de qualité
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2022

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
Opérations des artères du bassin et des jambes				
Total des OP des artères du bassin/des jambes, mortalité	Information 1	6,3% 1.838 de 29.299	3,3% 3 de 91	
OP des artères du bassin/des jambes en cas de claudication (Fontaine I+II), mortalité	<0,5% 1	0,2322% 13 de 5.598	0,0% 0 de 13	
OP des artères du bassin/des jambes en cas de douleurs au repos (Fontaine III), mortalité	<2,3% 1	1,9% 43 de 2.278	n.a. <4	
OP des artères du bassin/des jambes en cas d'ulcération ou de gangrène (Fontaine IV), mortalité	<4,4% 1	4,0% 143 de 3.603	0,0% 0 de 7	
Angioplasties transluminales percutanées (ATP)				
ATP des artères de l'abdomen/des jambes (hormis aorte), mortalité	Valeur d'observation 1	3,1% 1.866	4,4% 11 de 249	
ATP des artères de l'abdomen/des jambes (hormis aorte) avec OP des artères du bassin/des jambes	Information de quantité 2	43,2 (36) 10.332	33	
Fistule artério - veineuse				
Insertion de shunt artério - veineux (fistule AV interne)	Information de quantité 2	33,1 (18) 6.909	11	

Résultats de qualité
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2022

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
Gynécologie et obstétrique				
Accouchements				
Accouchements hospitaliers contribuant au décès de la mère, pourcentage	<0,004% 1	0,0054% 15 de 277.978	0,0% 0 de 4.070	
Accouchements par voie vaginale avec rupture périnéale du 3ème et 4ème degré, pourcentage	<1,9% 1	1,9% 3.598 de 187.763	2,0% 64 de 3.133	
Accouchements par voie vaginale avec épisiotomie, pourcentage	Information 1	10,4% 19.514 de 187.763	12,8% 400 de 3.133	
Césariennes, pourcentage	Information 1	32,5% 90.215 de 277.978	23,0% 937 de 4.070	
Césariennes en cas d'accouchement à faible risque, pourcentage	Information 1	27,0% 65.531 de 242.862	19,3% 695 de 3.597	
Césariennes en cas d'accouchement à faible risque, pourcentage âge < 35	Information 1	24,9% 44.848 de 179.848	16,7% 398 de 2.389	
Césariennes en cas d'accouchement à faible risque, pourcentage âge > 34	Information 1	32,8% 20.683 de 63.014	24,6% 297 de 1.208	
Nouveaunés				
Nouveaunés < 1250 g	Information de quantité 2	24,7 (24) 2.620	37	
Nouveaunés < 1250 g, transféré d'un autre hôpital	Information de quantité 2	5,2 (2) 206	n.a. <4	
Nouveaunés < 500 g	Information de quantité 2	3,7 (3) 279	n.a. <4	
Nouveaunés 500 - 749 g	Information de quantité 2	7,3 (7) 622	4	
Nouveaunés 750 - 999 g	Information de quantité 2	9,8 (9) 817	9	
Nouveaunés 1000 - 1249 g	Information de quantité 2	9,0 (8) 902	20	
Nouveaunés 1250 - 1499 g	Information de quantité 2	11,9 (9) 1.284	19	
Nouveaunés 1500 - 2499 g	Information de quantité 2	72,7 (26) 17.153	286	

Résultats de qualité
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2022

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
Nouveaunés > 2.499 g ou sans indication de poids	Information de quantité 2	1117,3 (875) 275.970	4.055	
Ablation de l'utérus pour affections bénignes (hystérectomie)				
Hystérectomie pour affections bénignes, mortalité âge > 14	<0,04% 1	0,0673% 15 de 22.281	0,0% 0 de 178	
OP vaginales / laparoscopiques dans les hystérectomies sans plastique (y compris le changement), pourcentage	>87,9% 1	88,3% 19.551 de 22.132	90,4% 161 de 178	
Hystérectomies vaginales, sans plastie, pourcentage	Information 1	31,1% 6.892 de 22.132	25,3% 45 de 178	
Hystérectomies laparoscopiques, sans plastie, pourcentage	Information 1	57,2% 12.659 de 22.132	65,2% 116 de 178	
Hystérectomie pour affections bénignes sans endométriose avec ovariectomie, pourcentage âge < 50	Information 1	6,6% 485 de 7.322	1,6% 1 de 61	
Hystérectomie pour affections bénignes sans endométriose avec ovariectomie, pourcentage âge > 49	Information 1	31,2% 2.695 de 8.638	39,5% 17 de 43	
Tumeurs malignes du sein et des organes génitaux féminins				
DP tumeurs malignes du sein et des organes génitaux féminins	Information de quantité 2	194,8 (60) 79.483	519	
Traitements hospitaliers en cas de DP tumeurs malignes des ovaires	Information de quantité 2	29,2 (12) 10.162	86	
Tumeurs malignes des ovaires avec ovariectomie, mortalité	Valeur d'observation 1	1,5% 40 de 2.723	4,8% 1 de 21	
Traitements hospitaliers en cas de DP tumeurs malignes de l'utérus	Information de quantité 2	48,2 (28) 16.188	71	
Tumeurs malignes de l'utérus avec hystérectomie, mortalité	Valeur d'observation 1	0,78% 49 de 6.321	0,0% 0 de 40	
Traitements hospitaliers en cas de DP cancer du sein	Information de quantité 2	124,1 (32) 48.414	341	

Résultats de qualité
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2022

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
Total des interventions sur le sein (résections et plasties mammaires)				
Total des interventions sur le sein (résections et plasties mammaires)	Information de quantité 2	154,7 (116) 42.375	436	
Résections mammaires en cas de cancer du sein	Information de quantité 2	138,4 (118) 31.281	273	
Résections partielles en cas de cancer du sein, pourcentage	Information 1	72,4% 22.650 de 31.281	64,1% 175 de 273	
Interventions sur le plancher pelvien chez les femmes				
Opérations de suspension et plastiques du plancher pelvien, totale	Information de quantité 2	63,9 (45) 19.102	89	

Résultats de qualité
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2022

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif				
Tumeurs malignes des os, des articulations et du tissu conjonctif				
DP tumeurs malignes des os, du cartilage articulaire, des nerfs périphériques, du rétropéritoine, du tissu conjonctif, des tissus mous	Information de quantité 2	41,7 (5) 14.915	86	
Endoprothèses				
Première implantation d'endoprothèse de hanche en cas de coxarthrose ou arthrite chronique, mortalité	<0,13% 1	0,1427% 84 de 58.846	0,0% 0 de 281	
Première implantation d'endoprothèse de hanche en cas de fractures du col du fémur ou du trochanter, mortalité	Valeur d'observation 1	5,7% 1.278 de 22.320	3,0% 5 de 168	
Première implantation d'endoprothèse de hanche en cas d'autre diagnostic, mortalité	Valeur d'observation 1	5,6% 376 de 6.683	0,0% 0 de 92	
Première implantation d'endoprothèse de hanche en cas de coxarthrose ou arthrite chronique avec complications non chirurgicales, pourcentage	Valeur d'observation 1	2,4% 1.441 de 58.846	5,0% 14 de 281	
Changement d'endoprothèse de hanche, sans fractures ou infections, mortalité	<1,36% 1	1,23% 62 de 5.031	0% 0 de 36	
Changement d'endoprothèse de hanche en cas de fractures ou infections, mortalité	Valeur d'observation 1	4,5% 175 de 3.853	8,3% 2 de 24	
Première implantation d'endoprothèse de genou en cas de gonarthrose ou arthrite chronique, mortalité	<0,06% 1	0,0613% 34 de 55.475	0,0% 0 de 219	
Première implantation d'endoprothèse de genou en cas d'autre diagnostic, mortalité	Valeur d'observation 1	0,7438% 25 de 3.361	0,0% 0 de 15	
Première implantation d'endoprothèse de genou en cas de gonarthrose ou arthrite chronique avec complications non chirurgicales, pourcentage	Valeur d'observation 1	1,7% 956 de 55.475	6,8% 15 de 219	

Résultats de qualité
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2022

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
Changement d'endoprothèse de genou, sans fractures ou infections, mortalité	<0,27% 1	0,3042% 14 de 4.602	4,167% 1 de 24	
Changement d'endoprothèse de genou, sans fractures ou infections, prothèse spéciale, mortalité	Information 1	0,1405% 2 de 1.423	n.a. <4	
Changement d'endoprothèse de genou en cas de fractures ou infections, mortalité	Valeur d'observation 1	2,9% 59 de 2.028	0,0% 0 de 8	
Interventions de l'endoprothèse de hanche ou de genou en cas de tumeurs, mortalité	Valeur d'observation 1	6,9% 163 de 2.369	6,3% 1 de 16	
Fractures métaphysaires de la hanche				
Fractures du col du fémur avec traitement opératoire, mortalité âge > 19	< Valeur attendue 1	5,2% 1.275 de 24.704	3,0% 6 de 201	5,8% 0,51
Fractures du col du fémur avec traitement par endoprothèse, mortalité âge > 19	Valeur d'observation 1	5,7% 1.239 de 21.829	3,1% 5 de 163	
Fractures du col du fémur avec traitement par ostéosynthèse, mortalité âge > 19	Valeur d'observation 1	1,3% 36 de 2.875	2,6% 1 de 38	
Fracture du trochanter avec traitement opératoire, mortalité âge > 19	< Valeur attendue 1	5,3% 1.079 de 20.370	5,9% 11 de 186	5,3% 1,13
Fracture du trochanter avec traitement par endoprothèse, mortalité âge > 19	Valeur d'observation 1	7,7% 34 de 444	0,0% 0 de 5	
Fracture du trochanter avec traitement par ostéosynthèse, mortalité âge > 19	Valeur d'observation 1	5,2% 1.045 de 19.926	6,1% 11 de 181	
Opérations de la colonne vertébrale et de la moelle épinière				
Toutes les opérations sur la colonne vertébrale et la moelle épinière sans analgésie locale	Information de quantité 2	297,2 (174) 114.438	837	
Fusion vertébrale ou remplacement de corps vertébral en cas de tumeurs (réparations complexes incluses), mortalité	Valeur d'observation 1	7,9% 274 de 3.459	9,5% 2 de 21	

Résultats de qualité
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2022

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
Fusion vertébrale ou remplacement de corps vertébral en cas de traumatisme (réparations complexes et OP de la moelle épinière incluses), mortalité	Valeur d'observation 1	3,9% 578 de 14.953	4,2% 4 de 95	
Intervention pour discitis ou ostéomyélite vetebrale, mortalité	Valeur d'observation 1	8,5% 211 de 2.472	0,0% 0 de 18	
Réparations complexes de la colonne vertébrale (sans tumeur, traumatisme), mortalité	Valeur d'observation 1	1,5068% 11 de 730	2,9412% 1 de 34	
Fusion vertébrale ou remplacement de corps vertébral, 1 corps vértebral (sans tumeur, traumatisme, réparations complexes), mortalité	Valeur d'observation 1	0,0747% 10 de 13.389	0,0% 0 de 105	
Fusion vertébrale ou remplacement de corps vertébral, 2 corps vértebral (sans tumeur, traumatisme, réparations complexes), mortalité	Valeur d'observation 1	0,3296% 22 de 6.675	0,0% 0 de 41	
Fusion vertébrale ou remplacement de corps vertébral, 3 et plus corps vértebrals (sans tumeur, traumatisme, réparations complexes), mortalité	Valeur d'observation 1	0,672% 33 de 4.911	0,0% 0 de 31	
Décompression de la colonne vertébrale), mortalité	Valeur d'observation 1	0,0485% 11 de 22.694	0,0% 0 de 63	
Discectomie (sans accident, tumeur, Décompression, OP complexe de la colonne vertébrale), mortalité	<0,04% 1	0,0233% 4 de 17.139	0,0% 0 de 150	
Vertébroplastie/kyphoplastie (sans tumeur, réparations complexes, fusion vertébrale, remplacement de corps vertébral, interventions aux disques intervertébraux), mortalité	<0,51% 1	0,4074% 28 de 6.873	1,37% 1 de 73	
Autres OP de la colonne vertébrale ou de la moelle épinière, mortalité	Valeur d'observation 1	1,8% 377 de 21.143	0,5% 1 de 206	

Résultats de qualité
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2022

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
Discectomie avec complications non chirurgicales (sans accident, tumeur, OP complexe de la colonne vertébrale), pourcentage	Valeur d'observation 1	0,5368% 92 de 17.139	0,0% 0 de 150	
Traitement local des douleurs de la colonne vertébrale, sans OP de la colonne vertébrale	Information de quantité 2	77,9 (33) 28.430	47	
Traitements hospitaliers en cas de HD maladies de la colonne vertébrale, sans OP ou traitement local des douleurs de la colonne	Information de quantité 2	120,6 (101) 52.570	253	
Traitement local et conservatif des maladies de la colonne vertébrale				
Endoprothèse à l'articulation de l'épaule/du coude	Information de quantité 2	30,8 (22) 11.717	96	
Polytraumatisme				
Polytraumatismes au sens de la definition DRG	Information de quantité 2	20,9 (6) 7.673	121	

Résultats de qualité
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2022

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
Maladies des voies urinaires et des organes génitaux masculins				
Ablation du rein (néphrectomie et néphrectomie partielle)				
Néphrectomie totale, mortalité	<1,6% 1	1,6% 59 de 3.685	0,0% 0 de 26	
OP laparoscopique en cas de néphrectomie totale, pourcentage	Information 1	42,9% 1.580 de 3.685	46,2% 12 de 26	
Néphrectomie partielle, mortalité	<0,25% 1	0,1208% 4 de 3.311	0,0% 0 de 13	
OP laparoscopique en cas de néphrectomie partielle, pourcentage	Information 1	54,7% 1.810 de 3.311	53,8% 7 de 13	
Néphrectomie partielle en cas de tumeur maligne du rein, pourcentage	Information 1	47,3% 3.311 de 6.996	33,3% 13 de 39	
Néphrectomie totale pour un autre diagnostic, mortalité	Valeur d'observation 1	3,9% 86 de 2.226	0,0% 0 de 15	
Néphrectomie partielle pour un autre diagnostic, mortalité	Valeur d'observation 1	0,7513% 9 de 1.198	n.a. <4	
Opérations de la vessie				
DP tumeur maligne de la vessie	Information de quantité 2	131,7 (41) 45.296	261	
Total des RTU de vessie	Information de quantité 2	203,0 (195) 46.280	253	
RTU de vessie en cas de tumeur maligne	Information de quantité 2	164,1 (149) 32.651	186	
RTU en cas de tumeur maligne avec instillation de médicaments chimiothérapeutiques dans la vessie, pourcentage	Valeur d'observation 1	19,1% 6.222 de 32.651	6,5% 12 de 186	
Ablation de la vessie (cystectomie), mortalité	<5,0% 1	4,5% 142 de 3.139	0,0% 0 de 17	
Eviscération pelvienne chez l'homme ou la femme, mortalité	Valeur d'observation 1	5,3% 33 de 623	0,0% 0 de 5	

Résultats de qualité
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2022

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
Résection prostatique transurétrale (TURP)				
RTU de prostate, mortalité	<0,23% 1	0,2239% 55 de 24.563	0,0% 0 de 121	
RTU de prostate pour une maladie maligne, mortalité	Valeur d'observation 1	0,6408% 45 de 7.022	0,0% 0 de 36	
RTU de prostate avec complications non chirurgicales, pourcentage	Valeur d'observation 1	3,6% 1.124 de 31.585	4,5% 7 de 157	
DP carcinome de la prostate	Information de quantité 2	91,4 (19) 34.805	116	
Prostatovésiculectomie radicale, mortalité	<0,19% 1	0,1452% 18 de 12.398	0,0% 0 de 44	
Calculs rénaux				
DP calculs rénaux	Information de quantité 2	184,5 (36) 73.597	183	
Cas avec intervention pour extraction des calculs en cas de DP calculs rénaux, pourcentage	Information 1	53,5% 39.395 de 73.597	38,8% 71 de 183	

Résultats de qualité
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2022

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
Affections de la peau				
Affections de la peau				
Traitements hospitaliers en cas de DP mélanome	Information de quantité 2	42,8 (4) 12.754	53	
Traitements hospitaliers en cas de DP dermatoses et eczémas	Information de quantité 2	29,0 (5) 10.718	46	
Traitements hospitaliers en cas de DP psoriasis	Information de quantité 2	26,8 (2) 4.203	15	

Résultats de qualité
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2022

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
Soins intensifs				
Soins intensifs				
Cas de respiration artificielle > 24 h (à l'exclusion des nouveaunés), mortalité	Valeur d'observation 1	36,8% 35.901 de 97.454	22,3% 148 de 665	
Assistance cardio / cardio-pulmonaire ECLS / ECMO	Information de quantité 2	32,0 (13) 2.846	58	
Assistance pulmonaire ECMO	Information de quantité 2	18,9 (5) 2.245	13	
Cas de respiration artificielle >24 h (à l'exclusion des nouveaunés, sans COVID-19), mortalité	<34,1% 1	36,0% 30.098 de 83.509	21,7% 123 de 568	
DP états septiques, mortalité	Valeur d'observation 1	33,5% 9.946 de 29.690	22,9% 87 de 380	
DP états septiques avec complications d'organe/choc, mortalité	Valeur d'observation 1	36,3% 9.456 de 26.052	25,6% 79 de 308	
DP états septiques sans complications d'organe/choc, mortalité	Valeur d'observation 1	13,5% 490 de 3.638	11,1% 8 de 72	
DS états septiques, mortalité	Valeur d'observation 1	40,6% 26.949 de 66.415	31,4% 108 de 344	
DS états septiques avec complications d'organe/choc, mortalité	Valeur d'observation 1	42,2% 26.295 de 62.358	34,1% 98 de 287	
SIRS sans complications d'organe, mortalité	Information 1	8,8% 3.866 de 43.820	33,3% 2 de 6	
Troubles congénitaux de la coagulation				
Cas de traitement avec des troubles congénitaux de la coagulation	Information de quantité 2	29,4 (15) 12.580	140	
Cas de traitement opérés avec des troubles congénitaux de la coagulation	Information de quantité 2	19,7 (10) 7.987	96	
Taux d'autopsies				
Taux d'autopsie	Information 1	0,8% 1.472 de 183.377	0,0% 0 de 1.534	

Résultats de qualité
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2022

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
Médicine hautement spécialisée				
Transplantations				
Total des transplantations hépatiques	Information de quantité 2	46,8 (52) 421	44	
Total des transplantations du pancréas ou de tissu pancréatique	Information de quantité 2	2,9 (2) 26	9	
Total des transplantations rénales	Information de quantité 2	54,6 (44) 1.093	40	
Total des transplantations ou transfusions de cellules souches hématopoïétiques	Information de quantité 2	78,6 (55) 3.693	70	
Total des transplantations de cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse	Information de quantité 2	6,5 (3) 162	8	
Transfusion de cellules souches hématopoïétiques périphériques, autogène	Information de quantité 2	78,6 (57) 3.536	62	
Transfusion de cellules souches hématopoïétiques, autogène	Information de quantité 2	45,1 (37) 2.030	n.a. <4	
Chimiothérapie hyperthermique				
Chimiothérapie hyperthermique intrapéritonéale	Information de quantité 2	7,4 (4) 473	5	

Résultats de qualité
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2022

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
Médecine palliative				
Médecine palliative				
Traitement complexe de médecine palliative	Information de quantité 2	183,9 (122) 45.053	818	

Résultats de qualité
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2022

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
Interventions assistées par robot				
Interventions assistées par robot				
Chirurgie robotisée en cas d'interventions index urologiques	Information de quantité 2	125,9 (99) 11.082	76	

Résultats de qualité
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2022

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
COVID-19 Chiffres clés				
COVID-19 Chiffres clés				
Pourcentage de cas de traitement testés sur COVID-19	Information 1	89,7% 5.732.391 de 6.389.949	38,7% 18.833 de 48.725	
Cas de traitement testés sur COVID-19, pourcentage détecté positive	Information 1	5,6% 322.961 de 5.732.391	19,8% 3.729 de 18.833	
Cas de COVID-19 avec mise en évidence du virus en laboratoire, pourcentage	Information 1	5,1% 322.961 de 6.389.950	7,7% 3.729 de 48.722	
Cas de COVID-19 avec confirmation clinico-épidémiologique, pourcentage	Information 1	0,4% 23.866 de 6.389.950	0,1% 36 de 48.722	
Cas de COVID-19 avec affections sévères et aiguës des voies respiratoires, pourcentage	Information 1	26,7% 86.151 de 322.961	25,1% 937 de 3.729	
Cas de COVID-19 avec certaines maladies préexistantes, pourcentage	Information 1	72,1% 232.777 de 322.961	68,3% 2.546 de 3.729	
Cas de COVID-19 avec mise en évidence du virus en laboratoire, mortalité	Information 1	8,1% 26.221 de 322.961	6,2% 233 de 3.729	

Résultats de qualité
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2021

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
Maladies cardiaques				
Infarctus du myocarde				
DP infarctus du myocarde, mortalité âge > 19	< Valeur attendue 1	8,4% 6.822 de 81.175	6,1% 31 de 508	7,8% 0,78
Proportion de crises cardiaques avec cathéter de vaisseaux coronaires dans tous les cas	Information 1	83,7% 67.966 de 81.175	89,6% 455 de 508	
DP infarctus du myocarde, admissions directes pas transféré, mortalité âge > 19	Valeur d'observation 1	8,3% 6.073 de 72.973	6,1% 30 de 495	
Infarctus du myocarde transmural (STEMI), pourcentage	Information 1	34,6% 28.047 de 81.081	42,5% 216 de 508	
Infarctus du myocarde transmural, mortalité	< Valeur attendue 1	12,3% 3.438 de 28.047	7,9% 17 de 216	12,0%
Infarctus non transmural/NSTEMI, mortalité	< Valeur attendue 1	5,8% 3.026 de 52.286	4,6% 13 de 284	5,3%
Infarctus seulement comme DS, mortalité âge > 19	Valeur d'observation 1	21,1% 5.194 de 24.664	19,6% 44 de 224	
Insuffisance cardiaque				
DP insuffisance cardiaque, mortalité âge > 19	< Valeur attendue 1	8,1% 13.949 de 172.821	6,2% 68 de 1.096	9,5% 0,65
NYHA IV en cas de DP insuffisance ventriculaire gauche, pourcentage	Information 1	49,4% 56.089 de 113.523	57,1% 189 de 331	
Cathétérisme cardiaque				
Cas avec cathétérisme des vaisseaux coronaires âge > 19	Information de quantité 2	810,2 (658) 300.577	1.133	
Cathétérisme des vaisseaux coronaires en cas de DP infarctus du myocarde sans OP du cœur, mortalité (Mortalité prévu en fonction des cas de traitement avec cathéters coronaires et infarctus du myocarde) âge > 19	< Valeur attendue 1	6,6% 4.416 de 66.575	3,6% 15 de 420	5,9% 0,61
Cathétérisme diagnostique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde sans OP du cœur, mortalité âge > 19	<1,4% 1	1,7% 2.337 de 139.596	2,2% 9 de 405	

Résultats de qualité
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2021

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
Cathétérisme thérapeutique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde sans OP du cœur, mortalité âge > 19	Valeur d'observation 1	1,9% 1.540 de 79.813	4,8% 7 de 145	
Cathétérisme thérapeutique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde sans OP du cœur, pourcentage âge > 19	Information 1	36,4% 79.813 de 219.409	25,8% 145 de 561	
Cas avec cathétérisme cardiaque chez l'enfant et l'adolescent âge < 20	Information de quantité 2	26,0 (2) 3.125	35	
Troubles du rythme cardiaque				
DP troubles du rythme cardiaque	Information de quantité 2	415,8 (266) 176.303	561	
Implantation de pacemaker/défibrillateur				
Implantation de pacemaker/défibrillateur	Information de quantité 2	147,9 (103) 53.113	254	
Implantation et changement de défibrillateur	Information de quantité 2	53,1 (37) 14.722	49	
Thérapie ablative				
Ablation par cathéter	Information de quantité 2	243,7 (186) 45.822	244	
Ablation de l'oreillette en cas de fibrillation auriculaire / de flutter auriculaire, mortalité	Information 1	0,0839% 23 de 27.421	0,0% 0 de 134	
Ablation chirugicale	Information de quantité 2	49,4 (38) 1.580	23	
Opérations du cœur				
Total des OP du cœur	Information de quantité 2	231,2 (8) 50.864	423	
OP des valves cardiaques	Information de quantité 2	291,0 (35) 33.751	223	
OP des vaisseaux coronaires	Information de quantité 2	400,3 (359) 17.614	113	
Autres OP du cœur	Information de quantité 2	49,7 (3) 9.885	180	
OP combinée du cœur	Information de quantité 2	220,5 (172) 9.261	86	
OP du cœur chez l'enfant et l'adolescent âge < 20	Information de quantité 2	40,2 (2) 1.728	130	

Résultats de qualité
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2021

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
Remplacement de la valve aortique ouverte, tous les cas	Information de quantité 2	204,7 (176) 7.369	37	
Remplacement isolé de valve aortique à cœur ouvert sans autre OP du cœur, mortalité	<2,3% 1	2,3% 66 de 2.821	0,0% 0 de 14	
Remplacement de la valve aortique ouverte avec remplacement de la valve mitrale, proportion de décès âge > 19	Valeur d'observation 1	14,2% 40 de 281	n.a. <4	
Remplacement de la valve aortique ouverte avec une autre chirurgie cardiaque, mortalité âge > 19	Valeur d'observation 1	6,9% 291 de 4.224	5,3% 1 de 19	
Implantation miniinvasive de valve aortique, mortalité	Valeur d'observation 1	2,0% 263 de 12.882	3,2% 2 de 63	
Implantation miniinvasive de valve aortique par voie endovasculaire, mortalité	Valeur d'observation 1	1,8% 227 de 12.383	3,2% 2 de 63	
Interventions endovasculaire/transapicale de la valve mitrale, mortalité	Valeur d'observation 1	2,9% 128 de 4.357	7,4% 2 de 27	
OP des vaisseaux coronaires uniquement, en cas de DP infarctus du myocarde, mortalité (Mortalité prévu en fonction des cas de traitement avec infarctus du myocarde et une chirurgie coronarienne), standardized mortality ratio (SMR)	< Valeur attendue 1	5,9% 232 de 3.925	0,0% 0 de 31	4,9% 0,00
OP des vaisseaux coronaires uniquement, en cas de DP infarctus du myocarde sans systèmes de soutien cardiaque, mortalité âge > 19	Valeur d'observation 1	3,8% 143 de 3.759	0,0% 0 de 28	
OP des vaisseaux coronaires uniquement, sans DP infarctus du myocarde, mortalité âge > 19	<2,0% 1	1,8% 163 de 8.990	3,6% 2 de 55	
OP des vaisseaux coronaires avec d'autres opérations cardiaques, mortalité âge > 19	Valeur d'observation 1	10,0% 469 de 4.667	13,6% 3 de 22	
OP des carotides en cas de remplacement isolé de valve aortique à cœur ouvert sans autre OP du cœur, pourcentage	Information 1	0,25% 7 de 2.821	0,0% 0 de 14	

Résultats de qualité
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2021

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
OP des carotides en cas d'OP des vaisseaux coronaires uniquement, sans DP infarctus du myocarde, pourcentage âge > 19	Information 1	0,78% 70 de 8.990	1,82% 1 de 55	

Résultats de qualité
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2021

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral				
Tumeurs malignes de l'encéphale ou des méninges cérébrales				
DP tumeurs malignes de l'encéphale ou des méninges cérébrales	Information de quantité 2	33,0 (7) 9.858	129	
OP du cerveau en cas de tumeurs malignes, mortalité	Valeur d'observation 1	2,7% 100 de 3.758	3,8% 2 de 53	
Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)				
DP d'accident vasculaire cérébral, toutes les formes, mortalité âge > 19	Valeur d'observation 1	10,1% 11.700 de 116.036	8,1% 84 de 1.042	
Accident vasculaire cérébrale différencié selon la forme de l'affection				
Infarctus cérébral (CIM10 I63), mortalité âge > 19	Valeur d'observation 1	7,3% 7.162 de 98.672	5,5% 48 de 877	
Infarctus cérébral (CIM10 I63) avec thrombolyse systémique, pourcentage	Information 1	15,9% 15.662 de 98.672	18,7% 164 de 877	
Infarctus cérébral (CIM10 I63) avec thrombolyse systémique, mortalité	Valeur d'observation 1	7,5% 1.171 de 15.662	3,7% 6 de 164	
Proportion d'infarctus cérébraux avec thrombectomie intracrânienne	Information 1	9,6% 9.434 de 98.672	14,3% 125 de 877	
Infarctus cérébral avec thrombectomie intracrânienne, mortalité	Valeur d'observation 1	19,3% 1.818 de 9.434	4,8% 6 de 125	
Infarctus cérébral (CIM10 I63) avec pneumonie, mortalité âge > 19	Valeur d'observation 1	10,0% 9.825 de 98.672	9,5% 83 de 877	
Infarctus cérébral (CIM10 I63) avec pneumonie, pourcentage âge > 19	Valeur d'observation 1	28,8% 2.826 de 9.825	16,9% 14 de 83	
Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)				
Hémorragie intracérébrale (CIM10 I61), mortalité âge > 19	Valeur d'observation 1	28,7% 3.712 de 12.945	26,3% 26 de 99	
Hémorragie sousarachnoïdienne (CIM10 I60), mortalité âge > 19	Valeur d'observation 1	19,5% 787 de 4.026	15,2% 10 de 66	

Résultats de qualité
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2021

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
Accident vasculaire cérébral, sans précision (CIM10 I64), pourcentage âge > 19	<0,55% 1	0,34% 393 de 116.036	0,0% 0 de 1.042	
AIT, mortalité	Valeur d'observation 1	0,3508% 133 de 37.917	0,0% 0 de 180	
Traitement en unité cérébro-vasculaire				
Traitement complexe neurlogique ou autre	Information de quantité 2	470,6 (420) 109.645	997	
Infarctus cérébral avec traitement complexe neurologique ou autre	Information 1	73,8% 72.868 de 98.672	83,4% 731 de 877	
AIT avec traitement complexe neurologique ou autre	Information 1	67,4% 25.540 de 37.917	75,0% 135 de 180	
Infarctus cérébral ou AIT avec traitement complexe neurologique ou autre, admissions directes (basé sur le registre des accidents vasculaires cérébraux)	Information 1	73,5% 94.573 de 128.627	81,9% 853 de 1.041	
Infarctus cérébral ou AIT avec traitement complexe neurologique ou autre, transféré d'un autre hôpital (basé sur le registre des accidents vasculaires cérébraux)	Information 1	48,2% 3.835 de 7.962	81,3% 13 de 16	
Epilepsie				
Traitements hospitaliers en cas de DP épilepsie âge > 19	Information de quantité 2	107,1 (26) 42.625	306	
Traitements hospitaliers en cas de DP épilepsie âge < 20	Information de quantité 2	51,8 (18) 11.398	76	
Sclérose en plaques				
Traitements hospitaliers en cas de DP sclérose en plaques	Information de quantité 2	36,0 (15) 10.223	38	

Résultats de qualité

HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2021

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
Médecine gériatrique				
Rééducation gériatrique précoce				
Rééducation gériatrique précoce	Information de quantité 2	391,1 (317) 101.291	101	
Malnutrition chez les personnes âgées				
Malnutrition / cachexie significative, âge > = 65, sans tumeur	Information 1	0,99% 24.194 de 2.444.716	5,23% 723 de 13.823	
Cas avec thérapie entérale / parentérale	Information 1	1,8% 432 de 24.194	24,9% 180 de 723	

Résultats de qualité
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2021

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
Maladies pulmonaires				
Pneumonie				
DP de pneumonie, mortalité Toutes les tranches d'âge	< Valeur attendue 1	17,6% 30.364 de 172.220	8,2% 145 de 1.772	13,8%
DP de pneumonie sans tumeur ni mucoviscidose, admissions directes, mortalité âge > 19	< Valeur attendue 1	15,9% 18.429 de 116.175	6,5% 87 de 1.337	11,7%
DP de pneumonie sans tumeur ni mucoviscidose, admissions directes, mortalité, COVID-19 âge > 19	< Valeur attendue 1	11,8% 5.139 de 43.716	5,7% 27 de 473	11,5% 0,50
DP de pneumonie sans tumeur ni mucoviscidose, admissions directes, mortalité, âge 1 - 19	Valeur d'observation 1	0,24% 19 de 7.782	0,0% 0 de 82	
Pneumonie par aspiration, mortalité	Valeur d'observation 1	28,0% 3.539 de 12.661	19,4% 26 de 134	
DP bronchite/bronchiolite, sans tumeur ni mucoviscidose, admissions directes, mortalité âge > 19	< Valeur attendue 1	2,5% 173 de 6.935	7,1% 1 de 14	1,7%
Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)				
BPCO sans tumeur, mortalité âge > 19	< Valeur attendue 1	4,9% 2.728 de 55.260	4,1% 11 de 270	4,8% 0,85
Cancer du poumon (carcinome bronchique)				
Traitements hospitaliers en cas de DP cancer du poumon	Information de quantité 2	178,9 (47) 74.223	256	
Opérations du poumon				
Total des résections pulmonaires ou bronchiques majeures, mortalité	Valeur d'observation 1	3,1% 404 de 13.098	2,4% 3 de 127	
Pneumonectomie en cas de carcinome bronchique, mortalité	Valeur d'observation 1	12,8% 36 de 282	n.a. <4	
Résections pulmonaires partielles en cas de carcinome bronchique, mortalité	<2,2% 1	2,5% 141 de 5.697	1,4% 1 de 69	
Pneumonectomie en cas de carcinome bronchique, pourcentage	<20% 1 / 3	4,7% 282 de 5.979	4,2% 3 de 72	

Résultats de qualité
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2021

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
Bronchoplastie et angioplastie en cas de carcinome bronchique, pourcentage	Valeur d'observation 1	8,1% 461 de 5.697	4,3% 3 de 69	

Résultats de qualité
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2021

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
Maladies des organes abdominaux				
Ablation de la vésicule biliaire (cholécystectomie)				
Laparoscopie avec cholécystectomie en cas de calculs biliaires et cholécystite, sans tumeur, pourcentage	>94,6% 1	94,9% 50.695 de 53.427	96,3% 369 de 383	
Cholécystectomie en cas de calculs biliaires et cholécystite, sans tumeur, mortalité	<0,55% 1	0,5278% 282 de 53.427	0,2611% 1 de 383	
Réparations de hernie				
Herniotomie sans OP de l'intestin, mortalité	<0,12% 1	0,1137% 72 de 63.317	0,0% 0 de 337	
Herniotomie avec OP de l'intestin, mortalité	Valeur d'observation 1	2,1% 153 de 7.325	5,6% 1 de 18	
OP alloplastique de hernie inguinale, pourcentage âge < 20	Information 1	7,8% 254 de 3.250	0,0% 0 de 34	
OP alloplastique de hernie inguinale, pourcentage âge > 19	Information 1	97,8% 42.871 de 43.823	95,8% 138 de 144	
Opérations de la thyroïde				
Résections thyroïdiennes	Information de quantité 2	53,4 (19) 17.881	255	
Résections thyroïdiennes / parathyroïdiennes de tumeur maligne, pourcentage	Information de quantité 2	10,7 (4) 2.503	98	
Résections thyroïdiennes de tumeur benigne, pourcentage	Information de quantité 2	44,8 (17) 14.346	144	
Cas de respiration artificielle > 24 h en cas de résections thyroïdiennes, pourcentage	Information 1	0,48% 81 de 16.822	0,41% 1 de 242	
Radiothérapie par iode radioactif	Information de quantité 2	222,2 (185) 9.779	65	
Maladies du côlon et du rectum				
Traitements hospitaliers en cas de DP carcinome colorectal	Information de quantité 2	125,9 (81) 51.740	245	
Traitements hospitaliers en cas de colite ulcéreuse ou maladie de Crohn (DP ou DS)	Information de quantité 2	92,7 (59) 41.459	191	

Résultats de qualité
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2021

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
Total des résections colorectales, mortalité	Valeur d'observation 1	7,9% 3.195 de 40.208	3,2% 9 de 284	
Résections du côlon pour cancer colorectal sans diagnostic compliquant, mortalité	<3,9% 1	3,8% 380 de 10.042	0,0% 0 de 94	
Résections du côlon pour cancer colorectal avec diagnostic compliquant, mortalité	Valeur d'observation 1	11,9% 359 de 3.015	0,0% 0 de 6	
Résections du rectum pour cancer colorectal, mortalité	<3,1% 1	3,1% 149 de 4.872	7,4% 2 de 27	
Résections colorectales pour diverticule sans abcès/perforation, mortalité	<1,0% 1	1,02 % 21 de 2.055	0,00 % 0 de 11	
Résections colorectales pour diverticule avec abcès/perforation, mortalité	Valeur d'observation 1	5,9% 313 de 5.332	3,7% 1 de 27	
Résections colorectales pour ischémie intestinale, mortalité	Information 1	42,5% 996 de 2.346	13,6% 3 de 22	
Résections colorectales pour colite ulcéreuse ou maladie de Crohn, mortalité	Valeur d'observation 1	4,0% 84 de 2.106	0,0% 0 de 16	
Résections du côlon pour autre diagnostic	Information 1	8,5% 892 de 10.433	3,7% 3 de 81	
Résection/destruction du foie avec résections colorectales pour carcinome colorectal, pourcentage	Information 1	5,0% 889 de 17.929	5,5% 7 de 127	
Maladies de l'estomac				
Traitements hospitaliers en cas de DP cancer de l'estomac	Information de quantité 2	43,3 (23) 17.048	90	
DP ulcère de l'estomac, du duodénum ou du jéjunum, sans tumeur, mortalité	Valeur d'observation 1	5,4% 1.135 de 20.890	2,0% 2 de 100	
Total des gastrectomies	Information de quantité 2	28,7 (10) 9.515	173	
Gastrectomies (sans OP de l'œsophage) en cas de cancer de l'estomac, mortalité	Valeur d'observation 1	5,4% 116 de 2.136	5,6% 1 de 18	

Résultats de qualité
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2021

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
Gastrectomies avec OP complexe de l'œsophage, mortalité	Valeur d'observation 1	16,8% 52 de 310	0,0% 0 de 20	
Gastrectomies partielles ou totales pour autre diagnostic, mortalité	Valeur d'observation 1	3,8% 269 de 7.069	0,0% 0 de 135	
Chirurgie bariatrique				
Chirurgie bariatrique, mortalité	Valeur d'observation 1	0,0313% 3 de 9.571	0,0% 0 de 110	
Opérations de l'œsophage				
Interventions complexes de l'œsophage, mortalité	Valeur d'observation 1	8,8% 156 de 1.782	0,0% 0 de 23	
Opérations du pancréas				
Total des interventions sur le pancréas (sans transplantation), mortalité âge > 19	Valeur d'observation 1	8,9% 461 de 5.180	4,4% 3 de 68	
Résections du pancréas en cas de tumeurs malignes du pancréas (TIPMP inclus), mortalité	Valeur d'observation 1	7,1% 221 de 3.107	0,0% 0 de 29	
Résections anatomiques du foie, mortalité âge > 19	Valeur d'observation 1	5,9% 173 de 2.938	0,0% 0 de 36	

Résultats de qualité
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2021

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
Opérations de vaisseaux				
Opérations des artères cérébrales				
OP des vaisseaux extracrâniens sur l'artère carotide, mortalité	<0,98% 1	1,26% 117 de 9.250	0,0% 0 de 66	
Implantation percutanée de stents dans l'artère carotide, mortalité	<1,9% 1	2,4% 58 de 2.450	0,0% 0 de 22	
Autres OP des vaisseaux extracrâniens en cas d'OP du cœur, de l'aorte, des artères des jambes, de traumatisme ou de tumeurs malignes ORL, mortalité	Valeur d'observation 1	14,8% 267 de 1.809	14,3% 1 de 7	
Interventions vasculaires percutanées transluminales intracrâniennes	Information de quantité 2	94,4 (45) 15.199	77	
Dilatation de l'aorte (anévrisme de l'aorte)				
Total des OP de l'aorte	Information de quantité 2	48,0 (25) 10.034	43	
Résection/remplacement de l'aorte abdominale	Information de quantité 2	25,2 (21) 5.109	19	
Résection/remplacement de l'aorte abdominale en cas d'anévrisme de l'aorte sans rupture, OP à ciel ouvert, mortalité	<6,3% 1	8,2% 61 de 740	0,0% 0 de 4	
Stentgraft endovasculaire de l'aorte abdominale en cas d'anévrisme (EVAR), sans rupture, mortalité	<1,3% 1	1,7% 50 de 2.968	0,0% 0 de 13	
Résection/remplacement de l'aorte thoracique/thoracoabdominale sans anévrisme, mortalité	Valeur d'observation 1	19,4% 74 de 381	0,0% 0 de 4	
Anévrisme de l'aorte avec rupture, mortalité	Information 1	40,6% 873 de 2.150	37,5% 6 de 16	
Anévrisme de l'aorte avec rupture, avec OP, mortalité	Information 1	32,3% 354 de 1.096	25,0% 1 de 4	
Opérations des artères du bassin et des jambes				
Total des OP des artères du bassin/des jambes, mortalité	Information 1	6,5% 1.829 de 28.292	4,6% 5 de 108	

Résultats de qualité
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2021

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
OP des artères du bassin/des jambes en cas de claudication (Fontaine I+II), mortalité	<0,5% 1	0,4363% 22 de 5.042	0,0% 0 de 10	
OP des artères du bassin/des jambes en cas de douleurs au repos (Fontaine III), mortalité	<2,3% 1	1,9% 39 de 2.105	14,3% 1 de 7	
OP des artères du bassin/des jambes en cas d'ulcération ou de gangrène (Fontaine IV), mortalité	<4,4% 1	4,8% 170 de 3.530	5,9% 1 de 17	
Angioplasties transluminales percutanées (ATP)				
ATP des artères de l'abdomen/des jambes (hormis aorte), mortalité	Valeur d'observation 1	3,4% 2.005	3,4% 9 de 265	
ATP des artères de l'abdomen/des jambes (hormis aorte) avec OP des artères du bassin/des jambes	Information de quantité 2	41,9 (34) 9.963	38	
Fistule artério - veineuse				
Insertion de shunt artério - veineux (fistule AV interne)	Information de quantité 2	33,4 (19) 7.189	11	

Résultats de qualité
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2021

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
Gynécologie et obstétrique				
Accouchements				
Accouchements hospitaliers contribuant au décès de la mère, pourcentage	<0,004% 1	0,005% 15 de 300.765	0,025% 1 de 4.048	
Accouchements par voie vaginale avec rupture périnéale du 3ème et 4ème degré, pourcentage	<1,9% 1	1,9% 3.809 de 205.052	2,1% 64 de 2.994	
Accouchements par voie vaginale avec épisiotomie, pourcentage	Information 1	11,3% 23.237 de 205.052	12,7% 381 de 2.994	
Césariennes, pourcentage	Information 1	31,8% 95.713 de 300.765	26,0% 1.054 de 4.048	
Césariennes en cas d'accouchement à faible risque, pourcentage	Information 1	26,3% 69.193 de 262.701	21,6% 759 de 3.518	
Césariennes en cas d'accouchement à faible risque, pourcentage âge < 35	Information 1	24,4% 47.504 de 194.706	17,8% 421 de 2.371	
Césariennes en cas d'accouchement à faible risque, pourcentage âge > 34	Information 1	31,9% 21.689 de 67.995	29,5% 338 de 1.147	
Nouveaunés				
Nouveaunés < 1250 g	Information de quantité 2	26,6 (24) 2.762	64	
Nouveaunés < 1250 g, transféré d'un autre hôpital	Information de quantité 2	4,8 (2) 220	n.a. <4	
Nouveaunés < 500 g	Information de quantité 2	3,9 (3) 285	7	
Nouveaunés 500 - 749 g	Information de quantité 2	7,6 (5) 659	16	
Nouveaunés 750 - 999 g	Information de quantité 2	10,4 (9) 915	18	
Nouveaunés 1000 - 1249 g	Information de quantité 2	10,1 (9) 903	23	
Nouveaunés 1250 - 1499 g	Information de quantité 2	12,6 (12) 1.358	22	
Nouveaunés 1500 - 2499 g	Information de quantité 2	73,3 (24) 17.745	283	

Résultats de qualité
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2021

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
Nouveaunés > 2.499 g ou sans indication de poids	Information de quantité 2	1170,2 (886) 297.229	3.964	
Ablation de l'utérus pour affections bénignes (hystérectomie)				
Hystérectomie pour affections bénignes, mortalité âge > 14	<0,04% 1	0,0047% 1 de 21.183	0,0% 0 de 199	
OP vaginales / laparoscopiques dans les hystérectomies sans plastique (y compris le changement), pourcentage	>87,9% 1	87,5% 18.406 de 21.034	89,8% 176 de 196	
Hystérectomies vaginales, sans plastie, pourcentage	Information 1	30,4% 6.395 de 21.034	32,1% 63 de 196	
Hystérectomies laparoscopiques, sans plastie, pourcentage	Information 1	57,1% 12.011 de 21.034	57,7% 113 de 196	
Hystérectomie pour affections bénignes sans endométriose avec ovariectomie, pourcentage âge < 50	Information 1	6,7% 489 de 7.280	6,9% 5 de 72	
Hystérectomie pour affections bénignes sans endométriose avec ovariectomie, pourcentage âge > 49	Information 1	31,1% 2.401 de 7.715	47,9% 23 de 48	
Tumeurs malignes du sein et des organes génitaux féminins				
DP tumeurs malignes du sein et des organes génitaux féminins	Information de quantité 2	200,6 (64) 81.639	513	
Traitements hospitaliers en cas de DP tumeurs malignes des ovaires	Information de quantité 2	30,4 (12) 10.860	82	
Tumeurs malignes des ovaires avec ovariectomie, mortalité	Valeur d'observation 1	2,0% 56 de 2.799	0,0% 0 de 34	
Traitements hospitaliers en cas de DP tumeurs malignes de l'utérus	Information de quantité 2	50,8 (28) 16.654	81	
Tumeurs malignes de l'utérus avec hystérectomie, mortalité	Valeur d'observation 1	0,54% 34 de 6.286	0,0% 0 de 47	
Traitements hospitaliers en cas de DP cancer du sein	Information de quantité 2	128,8 (34) 49.859	336	

Résultats de qualité
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2021

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
Total des interventions sur le sein (résections et plasties mammaires)				
Total des interventions sur le sein (résections et plasties mammaires)	Information de quantité 2	151,4 (96) 42.701	379	
Résections mammaires en cas de cancer du sein	Information de quantité 2	132,2 (111) 32.135	263	
Résections partielles en cas de cancer du sein, pourcentage	Information 1	72,5% 23.288 de 32.135	67,3% 177 de 263	
Interventions sur le plancher pelvien chez les femmes				
Opérations de suspension et plastiques du plancher pelvien, totale	Information de quantité 2	53,7 (36) 16.155	113	

Résultats de qualité
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2021

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif				
Tumeurs malignes des os, des articulations et du tissu conjonctif				
DP tumeurs malignes des os, du cartilage articulaire, des nerfs périphériques, du rétropéritoine, du tissu conjonctif, des tissus mous	Information de quantité 2	42,5 (5) 15.525	117	
Endoprothèses				
Première implantation d'endoprothèse de hanche en cas de coxarthrose ou arthrite chronique, mortalité	<0,13% 1	0,1068% 55 de 51.502	0,0% 0 de 224	
Première implantation d'endoprothèse de hanche en cas de fractures du col du fémur ou du trochanter, mortalité	Valeur d'observation 1	5,7% 1.181 de 20.654	2,5% 4 de 157	
Première implantation d'endoprothèse de hanche en cas d'autre diagnostic, mortalité	Valeur d'observation 1	5,5% 355 de 6.473	2,8% 2 de 71	
Première implantation d'endoprothèse de hanche en cas de coxarthrose ou arthrite chronique avec complications non chirurgicales, pourcentage	Valeur d'observation 1	2,6% 1.359 de 51.502	4,9% 11 de 224	
Changement d'endoprothèse de hanche, sans fractures ou infections, mortalité	<1,36% 1	1,45% 71 de 4.885	0% 0 de 29	
Changement d'endoprothèse de hanche en cas de fractures ou infections, mortalité	Valeur d'observation 1	4,7% 177 de 3.802	0,0% 0 de 34	
Première implantation d'endoprothèse de genou en cas de gonarthrose ou arthrite chronique, mortalité	<0,06% 1	0,0435% 20 de 45.992	0,0% 0 de 230	
Première implantation d'endoprothèse de genou en cas d'autre diagnostic, mortalité	Valeur d'observation 1	0,4888% 16 de 3.273	0,0% 0 de 8	
Première implantation d'endoprothèse de genou en cas de gonarthrose ou arthrite chronique avec complications non chirurgicales, pourcentage	Valeur d'observation 1	1,8% 807 de 45.992	7,4% 17 de 230	

Résultats de qualité
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2021

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
Changement d'endoprothèse de genou, sans fractures ou infections, mortalité	<0,27% 1	0,305% 14 de 4.590	0,0% 0 de 26	
Changement d'endoprothèse de genou, sans fractures ou infections, prothèse spéciale, mortalité	Information 1	0,1294% 2 de 1.545	n.a. <4	
Changement d'endoprothèse de genou en cas de fractures ou infections, mortalité	Valeur d'observation 1	2,3% 45 de 1.950	0,0% 0 de 6	
Interventions de l'endoprothèse de hanche ou de genou en cas de tumeurs, mortalité	Valeur d'observation 1	7,2% 178 de 2.476	6,7% 1 de 15	
Fractures métaphysaires de la hanche				
Fractures du col du fémur avec traitement opératoire, mortalité âge > 19	< Valeur attendue 1	5,2% 1.185 de 23.009	2,1% 4 de 189	6,2% 0,34
Fractures du col du fémur avec traitement par endoprothèse, mortalité âge > 19	Valeur d'observation 1	5,7% 1.143 de 20.147	2,6% 4 de 154	
Fractures du col du fémur avec traitement par ostéosynthèse, mortalité âge > 19	Valeur d'observation 1	1,5% 42 de 2.862	0,0% 0 de 35	
Fracture du trochanter avec traitement opératoire, mortalité âge > 19	< Valeur attendue 1	5,3% 1.045 de 19.678	1,9% 3 de 159	5,6% 0,33
Fracture du trochanter avec traitement par endoprothèse, mortalité âge > 19	Valeur d'observation 1	7,8% 37 de 475	n.a. <4	
Fracture du trochanter avec traitement par ostéosynthèse, mortalité âge > 19	Valeur d'observation 1	5,2% 1.008 de 19.203	1,9% 3 de 157	
Opérations de la colonne vertébrale et de la moelle épinière				
Toutes les opérations sur la colonne vertébrale et la moelle épinière sans analgésie locale	Information de quantité 2	295,5 (172) 113.182	794	
Fusion vertébrale ou remplacement de corps vertébral en cas de tumeurs (réparations complexes incluses), mortalité	Valeur d'observation 1	7,6% 287 de 3.766	14,3% 4 de 28	

Résultats de qualité
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2021

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
Fusion vertébrale ou remplacement de corps vertébral en cas de traumatisme (réparations complexes et OP de la moelle épinière incluses), mortalité	Valeur d'observation 1	3,8% 571 de 14.894	1,1% 1 de 93	
Intervention pour discitis ou ostéomyélite vetebrale, mortalité	Valeur d'observation 1	8,1% 193 de 2.386	0,0% 0 de 15	
Réparations complexes de la colonne vertébrale (sans tumeur, traumatisme), mortalité	Valeur d'observation 1	0,2685% 2 de 745	0,0% 0 de 30	
Fusion vertébrale ou remplacement de corps vertébral, 1 corps vértebral (sans tumeur, traumatisme, réparations complexes), mortalité	Valeur d'observation 1	0,1223% 16 de 13.082	0,0% 0 de 102	
Fusion vertébrale ou remplacement de corps vertébral, 2 corps vértebral (sans tumeur, traumatisme, réparations complexes), mortalité	Valeur d'observation 1	0,2844% 19 de 6.680	0,0% 0 de 45	
Fusion vertébrale ou remplacement de corps vertébral, 3 et plus corps vértebrals (sans tumeur, traumatisme, réparations complexes), mortalité	Valeur d'observation 1	0,7821% 37 de 4.731	0,0% 0 de 25	
Décompression de la colonne vertébrale), mortalité	Valeur d'observation 1	0,072% 15 de 20.843	1,852% 1 de 54	
Discectomie (sans accident, tumeur, Décompression, OP complexe de la colonne vertébrale), mortalité	<0,04% 1	0,0396% 7 de 17.677	0,0% 0 de 168	
Vertébroplastie/kyphoplastie (sans tumeur, réparations complexes, fusion vertébrale, remplacement de corps vertébral, interventions aux disques intervertébraux), mortalité	<0,51% 1	0,5682% 42 de 7.392	0,0% 0 de 51	
Autres OP de la colonne vertébrale ou de la moelle épinière, mortalité	Valeur d'observation 1	1,8% 370 de 20.986	3,8% 7 de 183	

Résultats de qualité
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2021

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
Discectomie avec complications non chirurgicales (sans accident, tumeur, OP complexe de la colonne vertébrale), pourcentage	Valeur d'observation 1	0,3903% 69 de 17.677	1,1905% 2 de 168	
Traitement local des douleurs de la colonne vertébrale, sans OP de la colonne vertébrale	Information de quantité 2	82,4 (37) 30.251	37	
Traitements hospitaliers en cas de HD maladies de la colonne vertébrale, sans OP ou traitement local des douleurs de la colonne	Information de quantité 2	123,4 (103) 53.921	227	
Traitement local et conservatif des maladies de la colonne vertébrale				
Endoprothèse à l'articulation de l'épaule/du coude	Information de quantité 2	29,1 (21) 11.128	100	
Polytraumatisme				
Polytraumatismes au sens de la definition DRG	Information de quantité 2	19,8 (7) 7.069	79	

Résultats de qualité
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2021

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
Maladies des voies urinaires et des organes génitaux masculins				
Ablation du rein (néphrectomie et néphrectomie partielle)				
Néphrectomie totale, mortalité	<1,6% 1	1,7% 64 de 3.763	0,0% 0 de 11	
OP laparoscopique en cas de néphrectomie totale, pourcentage	Information 1	40,6% 1.527 de 3.763	27,3% 3 de 11	
Néphrectomie partielle, mortalité	<0,25% 1	0,4838% 16 de 3.307	0,0% 0 de 15	
OP laparoscopique en cas de néphrectomie partielle, pourcentage	Information 1	49,6% 1.641 de 3.307	33,3% 5 de 15	
Néphrectomie partielle en cas de tumeur maligne du rein, pourcentage	Information 1	46,8% 3.307 de 7.070	57,7% 15 de 26	
Néphrectomie totale pour un autre diagnostic, mortalité	Valeur d'observation 1	4,3% 92 de 2.148	0,0% 0 de 15	
Néphrectomie partielle pour un autre diagnostic, mortalité	Valeur d'observation 1	0,1738% 2 de 1.151	n.a. <4	
Opérations de la vessie				
DP tumeur maligne de la vessie	Information de quantité 2	129,8 (32) 45.678	265	
Total des RTU de vessie	Information de quantité 2	198,8 (190) 46.520	229	
RTU de vessie en cas de tumeur maligne	Information de quantité 2	161,2 (154) 32.876	174	
RTU en cas de tumeur maligne avec instillation de médicaments chimiothérapeutiques dans la vessie, pourcentage	Valeur d'observation 1	19,1% 6.275 de 32.876	5,7% 10 de 174	
Ablation de la vessie (cystectomie), mortalité	<5,0% 1	4,5% 143 de 3.201	0,0% 0 de 13	
Eviscération pelvienne chez l'homme ou la femme, mortalité	Valeur d'observation 1	3,6% 21 de 587	0,0% 0 de 5	

Résultats de qualité
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2021

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
Résection prostatique transurétrale (TURP)				
RTU de prostate, mortalité	<0,23% 1	0,1823% 39 de 21.393	0,758% 1 de 132	
RTU de prostate pour une maladie maligne, mortalité	Valeur d'observation 1	0,6682% 47 de 7.034	0,0% 0 de 38	
RTU de prostate avec complications non chirurgicales, pourcentage	Valeur d'observation 1	4,3% 1.214 de 28.427	6,5% 11 de 170	
DP carcinome de la prostate	Information de quantité 2	86,9 (20) 33.807	95	
Prostatovésiculectomie radicale, mortalité	<0,19% 1	0,1985% 23 de 11.584	0,0% 0 de 31	
Calculs rénaux				
DP calculs rénaux	Information de quantité 2	188,1 (39) 74.121	180	
Cas avec intervention pour extraction des calculs en cas de DP calculs rénaux, pourcentage	Information 1	53,8% 39.903 de 74.121	42,8% 77 de 180	

Résultats de qualité
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2021

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
Affections de la peau				
Affections de la peau				
Traitements hospitaliers en cas de DP mélanome	Information de quantité 2	40,6 (3) 12.107	45	
Traitements hospitaliers en cas de DP dermatoses et eczémas	Information de quantité 2	27,0 (5) 10.587	44	
Traitements hospitaliers en cas de DP psoriasis	Information de quantité 2	22,8 (2) 4.088	12	

Résultats de qualité
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2021

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
Soins intensifs				
Soins intensifs				
Cas de respiration artificielle > 24 h (à l'exclusion des nouveaunés), mortalité	Valeur d'observation 1	37,7% 41.431 de 110.016	19,6% 145 de 738	
Assistance cardio / cardio-pulmonaire ECLS / ECMO	Information de quantité 2	33,5 (12) 3.016	46	
Assistance pulmonaire ECMO	Information de quantité 2	29,5 (10) 3.809	29	
Cas de respiration artificielle >24 h (à l'exclusion des nouveaunés, sans COVID-19), mortalité	<34,1% 1	35,5% 30.744 de 86.685	18,7% 108 de 577	
DP états septiques, mortalité	Valeur d'observation 1	29,0% 8.470 de 29.221	23,0% 85 de 370	
DP états septiques avec complications d'organe/choc, mortalité	Valeur d'observation 1	32,4% 8.074 de 24.943	25,4% 79 de 311	
DP états septiques sans complications d'organe/choc, mortalité	Valeur d'observation 1	9,3% 396 de 4.278	10,2% 6 de 59	
DS états septiques, mortalité	Valeur d'observation 1	41,5% 29.900 de 72.123	25,9% 90 de 347	
DS états septiques avec complications d'organe/choc, mortalité	Valeur d'observation 1	43,3% 29.285 de 67.555	30,1% 84 de 279	
SIRS sans complications d'organe, mortalité	Information 1	8,7% 3.322 de 38.402	0,0% 0 de 19	
Troubles congénitaux de la coagulation				
Cas de traitement avec des troubles congénitaux de la coagulation	Information de quantité 2	30,9 (15) 13.431	145	
Cas de traitement opérés avec des troubles congénitaux de la coagulation	Information de quantité 2	21,1 (9) 8.568	98	
Taux d'autopsies				
Taux d'autopsie	Information 1	0,91% 1.667 de 184.160	0,0% 0 de 1.350	

Résultats de qualité
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2021

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
Médicine hautement spécialisée				
Transplantations				
Total des transplantations hépatiques	Information de quantité 2	48,3 (41) 435	50	
Total des transplantations du pancréas ou de tissu pancréatique	Information de quantité 2	4,6 (4) 41	13	
Total des transplantations rénales	Information de quantité 2	55,8 (46) 1.117	61	
Total des transplantations ou transfusions de cellules souches hématopoïétiques	Information de quantité 2	82,7 (58) 3.804	68	
Total des transplantations de cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse	Information de quantité 2	6,8 (4) 191	10	
Transfusion de cellules souches hématopoïétiques périphériques, autogène	Information de quantité 2	78,9 (57) 3.629	59	
Thérapie allogène de cellules souches	Information de quantité 2	4,2 (2) 67	n.a. <4	
Chimiothérapie hyperthermique				
Chimiothérapie hyperthermique intrapéritonéale	Information de quantité 2	6,5 (4) 405	10	

Résultats de qualité
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2021

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
Médecine palliative				
Médecine palliative				
Traitement complexe de médecine palliative	Information de quantité 2	185,6 (128) 45.649	645	

Résultats de qualité
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2021

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
Interventions assistées par robot				
Interventions assistées par robot				
Chirurgie robotisée en cas d'interventions index urologiques	Information de quantité 2	124,1 (101) 9.552	59	

Résultats de qualité
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, Genf

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2021

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
COVID-19 Chiffres clés				
COVID-19 Chiffres clés				
Pourcentage de cas de traitement testés sur COVID-19	Information 1	88,1% 5.593.793 de 6.351.030	42,4% 19.891 de 46.902	
Cas de traitement testés sur COVID-19, pourcentage détecté positive	Information 1	2,9% 163.386 de 5.593.793	10,5% 2.090 de 19.891	
Cas de COVID-19 avec mise en évidence du virus en laboratoire, pourcentage	Information 1	2,6% 163.388 de 6.351.072	4,5% 2.090 de 46.895	
Cas de COVID-19 avec confirmation clinico-épidémiologique, pourcentage	Information 1	0,9% 55.480 de 6.351.072	0,2% 71 de 46.895	
Cas de COVID-19 avec affections sévères et aiguës des voies respiratoires, pourcentage	Information 1	67,5% 110.272 de 163.388	58,2% 1.216 de 2.090	
Cas de COVID-19 avec certaines maladies préexistantes, pourcentage	Information 1	73,2% 119.556 de 163.388	61,2% 1.279 de 2.090	
Cas de COVID-19 avec mise en évidence du virus en laboratoire, mortalité	Information 1	16,9% 27.538 de 163.388	8,0% 168 de 2.090	

Guide de lecture de l'IQM indicateurs de qualité

Exemple de lecture

Pour l'indicateur de qualité suivant « DP infarctus du myocarde, mortalité (âge > 19) » la valeur indiquée de la mortalité à l'hôpital de la République Fédérale d'Allemagne est de 8,2 % (source : Office fédéral de la Statistique). Pour l'exemple d'hôpital cela s'ensuit, en raison d'âge et de sexe des patients de l'année évaluée, une mortalité attendue de 7,5 % (4) comme espérance. L'objectif des membres de l'IQM est de se situer au-dessous de cette valeur (1). La valeur effective de l'exemple d'hôpital de l'année évaluée était de 9,8 % (3) et, par conséquence, au-dessous de la clinique valeur attendue pour l'indicateur « DP infarctus du myocarde, mortalité ». La valeur moyenne de tous membres de l'IQM de cet indicateur est de 7,9 % (2).

G-IQI / CH-IQI 5.4 Mise à jour: 15.04.2023 Année: 2022

Chaque fois que vous utilisez ces résultats, assurez-vous de suivre impérativement les instructions du préambule

IQM Indicateurs de qualité	IQM Valeur cible Source	IQM Valeur moyenne Nombre des cas	Clinique Valeur effective Nombre des cas	Clinique Valeur attendue SMR
Maladies cardiaques				
Infarctus du myocarde	(1)	(2)	(3)	(4)
DP infarctus du myocarde, mortalité	< Valeur attendue	7,9%	9,8%	7,5%
âge > 19	1	6.267 de 79.312	123 de 1.259	1,31

Les indicateurs

Les German/Swiss Impatient Quality Indicators (G-IQI/CH-IQI) sélectionnés par IQM représentent aussi bien des signes cliniques fréquents et importants que des procédures importantes. Tous des indicateurs provenant des données de routine de l'hôpital sans documentation supplémentaire, par laquelle une documentation supplémentaire n'est pas nécessaire.

On mesure quoi ?

Nous faisons la distinction entre les informations absolues et les informations relatives qui représentent une part de procédés opératoires déterminés par exemple.

La valeur mesurée essentielle est la mortalité des signes cliniques différents, même si nous sommes conscients que la mortalité à l'hôpital n'est pas évitable, aussi avec la meilleure qualité de médicine. C'est pourquoi, nous comparons les mortalités, si disponible, avec les valeurs de la moyenne fédérale. Les valeurs sont calculées soit des données de l'Office fédéral de la Statistique soit des données du centre de la recherche des données des Offices statistiques fédéraux et nationaux.

Les données de l'Office fédéral de la Statistique permettent une pondération pour l'âge et sexe des patients traités. Des cliniques avec un taux plus élevé de patients plus âgés présentent un autre taux de mortalité que des cliniques avec des patients relativement jeunes.

La valeur attendue sert de guide essentiel pour le classement des résultats„ parce qu'elle indiquée la mortalité attendue de la moyenne fédérale d'un groupe de patients avec la même distribution d''âge et de sexe. En raison des différences entre la distribution d'âge et de sexe des patients traités existent des valeurs individuelles pour les cliniques différentes. L'objectif des membres de l'IQM est d'indiquer des valeurs « meilleures » qu'attendues.

La relation entre la mortalité attendue et la valeur effective de la clinique s'appelle scientifiquement « standardized mortality rate » ou en bref « SMR ». Si le taux se situer au-dessous de 1, la mortalité effective de la clinique est plus faible que l'attendue, si elle se situer au-dessus de 1, la mortalité est plus élevée que l'attendue. Cette valeur est seulement calculée pour les indicateurs dont la mortalité attendue est indiquée dans les données de l'Office fédéral de la Statistique.

Si les valeurs d'âge et de sexe ne sont pas indiquées pour un indicateur, la valeur attendue ne peut pas être calculée. Nous sommes également conscients que la mortalité de certains indicateurs est un phénomène plutôt rare et ne peut pas servir comme preuve unique de la qualité médicale. La mortalité mesurée dans le domaine « low risk » permet de soulever les potentiels d'amélioration importants dans les analyses suivantes.

Glossaire

IQM Valeur cible - sources:

Les valeurs de référence respectivement les valeurs cibles sont indiquées par le nombre écrit au-dessous de la valeur cible.

Les valeurs cibles ou de référence se fondent sur les sources suivantes :

1. Centres de données de recherche des offices statistiques fédéraux et la Confédération et des États, statistiques DRG 2020. Calculs propres. Ces données constituent également la base du calcul des valeurs attendues spécifiques aux hôpitaux, standardisées par âge et par sexe (lorsque cela est indiqué).

2. Même source que 1 ; pour les indicateurs de volume, il s'agit du nombre moyen de cas (entre parenthèses : la médiane) par rapport aux hôpitaux membres de l'IQM qui ont fourni la prestation en 2020.

3. La valeur cible n'est pas identique à la valeur fédérale et a été tirée de : Mindestmengen aus thoraxchirurgischer Sicht. Chirurg, 78 (11): 1012-1017

IQM Valeur moyenne - Nombre des cas:

Présentation des résultats moyens pour tous les patients traités dans les hôpitaux membres de l'IQM (D) pendant la période d'observation. L'information quantitative de l'IQM (total) est exprimée en tant que moyenne et entre parenthèses comme médiane.

Clinique Valeur attendue:

La valeur attendue comprend la mortalité attendue de nos malades en raison de leur répartition par âge et sexe et est indiquée seulement pour les indicateurs dont les chiffres comparatifs de la moyenne fédérale permettent le **calcul**.

SMR:

Le SMR (standardized mortality ratio) est le quotient de la mortalité observée (valeur moyenne) et de la valeur attendue.

Remarque pour l'indicateur „Taux d'autopsies":

Le nombre d'autopsies rapportées ici ne pourrait éventuellement pas être complet car un codage complet après la sortie de l'hôpital n'est pas supporté par tous systèmes d'information numériques employés.