

### Ergebnisdarstellung und Nutzung der Indikatoren-Sets

Gerne möchten wir Ihnen an dieser Stelle Informationen mitgeben, die Ihnen eine Orientierung und Analyse der im Folgenden dargestellten Ergebnisse erleichtern sollen.

#### Auswirkungen der COVID-19 Pandemie

Analysen der Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf das Leistungsgeschehen der IQM-Mitgliedskliniken mit dem Schwerpunkt auf die Zielwertindikatoren haben gezeigt, dass sich zwar die Fallpopulationen in den Kennzahlen verändern, jedoch die beobachtete Rate in der Tendenz überwiegend stabil bleibt. Lediglich in den Kennzahlen G-IQI 14.2 (Pneumonie ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose, Alter>19, Anteil Todesfälle) und G-IQI 56.1 (Beatmung > 24 Stunden (ohne Neugeborene), Anteil Todesfälle) lässt sich der „COVID-Effekt“ auch in der Rate deutlich erkennen. Nach wie vor wird für die beiden Kennzahlen zur Sterblichkeit bei Pneumonie und Sterblichkeit bei Beatmung > 24 Stunden der Status „Zielwert“ auf jeweils alternative Kennzahlen ohne COVID-19-Fälle gewechselt. Für alle weiteren Zielwertindikatoren wurde die Darstellung der Ziel- und Erwartungswerte seit vergangem Jahr wieder eingesetzt.

#### Wiedereinsetzen Zielwert bei Sepsis

Die Kennzahl G-IQI 57.1 „Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) als Hauptdiagnose“ war in den vergangenen zwei Jahren nicht als Zielwertindikator definiert. Grund war die geänderte Sepsis-Definition im Jahr 2020 und die dadurch bedingte „Ungleichheit“ der Kodierung in den Referenzwerten des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Vergleich zu den Auswertungsdaten der IQM-Mitgliedskliniken. Durch die bereits im Dezember 2023 vom Statistischen Bundesamt bereitgestellten Bundesreferenzwerte für das Jahr 2022 und die neue Sepsis-Kodierung ist die genannte Kennzahl nach Beschluss des IQM-Vorstandes ab der aktuellen Ergebnisveröffentlichung wieder ein Zielwertindikator mit dem Ziel „< Erwartungswert“.

#### Kennzahlen zur Sterblichkeit bei Schlaganfall

Die Kennzahlen zur Sterblichkeit bei Schlaganfall und bei Hirninfarkt werden nicht mehr mit Zielwerten hinterlegt. Hintergrund ist, dass nach Einschätzung von Experten neurologischer Fachgesellschaften und der Arbeitsgemeinschaft Deutschsprachiger Schlaganfallregister (ADSR), durch verschiedene Einflussfaktoren wie die Zeit bis zur Aufnahme, Schweregrad des Hirninfarktes, Begleiterkrankungen, Erfolgsaussichten der Therapie oder Patientenverfügung u.v.m., die Behandlungsqualität in den aktuellen Kennzahlen nicht adäquat abgebildet werden kann. Da jedoch keine alternative Veröffentlichung der Schlaganfallsterblichkeit durch andere Institutionen erfolgt, soll die Darstellung - ohne Zielwerte - beibehalten werden und parallel neue geeignete Kennzahlen zu Schlaganfallbehandlung entwickelt werden.

#### Kennzahl zur Sterblichkeit bei operativen Eingriffen/ Ereignissen

Bei Kennzahlen mit der Bezeichnung „Todesfälle bei [Eingriffsart]“ betrifft dies den gesamten Behandlungsfall, nicht allein ein intraoperatives Ereignis. Sie stellen also **nicht ausschließlich** den intraoperativen Tod dar. Dies ist anzuwenden auf alle Kennzahlen, die einen operativen Eingriff/ ein operatives Ereignis beschreiben.

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

### IQM Indikatoren

[Qualitätsbericht](#)

[QSR-Mehrjahresergebnisse](#)

### Inhaltsverzeichnis

|                                                    |                      |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Herzerkrankungen                                   | <a href="#">2023</a> | <a href="#">2022</a> |
| Erkrankungen des Nervensystems und Schlaganfall    | <a href="#">2023</a> | <a href="#">2022</a> |
| Altersmedizin                                      | <a href="#">2023</a> | <a href="#">2022</a> |
| Lungenerkrankungen                                 | <a href="#">2023</a> | <a href="#">2022</a> |
| Erkrankungen der Bauchorgane                       | <a href="#">2023</a> | <a href="#">2022</a> |
| Gefäßoperationen                                   | <a href="#">2023</a> | <a href="#">2022</a> |
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe                   | <a href="#">2023</a> | <a href="#">2022</a> |
| Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe | <a href="#">2023</a> | <a href="#">2022</a> |
| Urologie                                           | <a href="#">2023</a> | <a href="#">2022</a> |
| Hautkrankheiten                                    | <a href="#">2023</a> | <a href="#">2022</a> |
| Intensivmedizin                                    | <a href="#">2023</a> | <a href="#">2022</a> |
| Palliativmedizin                                   | <a href="#">2023</a> | <a href="#">2022</a> |
| Roboterassistierte Eingriffe                       | <a href="#">2023</a> | <a href="#">2022</a> |
| COVID-19 Kennzahlen                                | <a href="#">2023</a> | <a href="#">2022</a> |

[Lesehilfe](#)

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | <div>IQM<br/>Zielwert</div> <div><a href="#">Quelle</a></div> | <div>IQM<br/>Durchschnittswert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Ist-Wert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Erwartungs-<br/>wert</div> <div><a href="#">SMR</a></div> |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                               |                                                                          |                                                                    |                                                                           |

Herzerkrankungen

Herzinfarkt

|                                                            |                  |                   |             |       |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|-------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Herzinfarkt                   | < Erwartungswert | 7,6%              | 12,2%       | 8,1%  |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                              | 1                | 5.744 von 75.253  | 36 von 296  | 1,50  |
| Anteil der Herzinfarkte mit Linksherzkatheter              | Information      | 85,8%             | 97,0%       |       |
|                                                            | 1                | 64.604 von 75.253 | 287 von 296 |       |
| Todesfälle bei Direktaufnahme ohne Verlegung               | Beobachtungswert | 7,5%              | 12,2%       |       |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                              | 1                | 5.127 von 68.298  | 35 von 288  |       |
| Anteil Transmuraler Herzinfarkte (STEMI)                   | Information      | 33,7%             | 38,2%       |       |
|                                                            | 1                | 25.362 von 75.169 | 113 von 296 |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Transmuraler Herzinfarkt      | < Erwartungswert | 11,7%             | 17,7%       | 13,7% |
|                                                            | 1                | 2.962 von 25.362  | 20 von 113  |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Nichttransmuraler Herzinfarkt | < Erwartungswert | 5,1%              | 8,8%        | 5,2%  |
|                                                            | 1                | 2.527 von 49.072  | 16 von 182  |       |
| Todesfälle bei Nebendiagnose Herzinfarkt                   | Beobachtungswert | 17,9%             | 20,9%       |       |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                              | 1                | 3.946 von 22.059  | 9 von 43    |       |

Herzinsuffizienz

|                                                                                |                  |                    |            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------|------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Herzinsuffizienz                                  | < Erwartungswert | 8,3%               | 7,9%       | 9,0% |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                  | 1                | 14.396 von 174.125 | 42 von 529 | 0,88 |
| Linksherzinsuffizienz, Anteil mit Beschwerden bereits im Ruhezustand (NYHA IV) | Information      | 47,7%              | 24,8%      |      |
|                                                                                | 1                | 55.198 von 115.810 | 75 von 302 |      |

Linksherzkatheter

|                                                                                                                                                                          |                   |                   |            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------|
| Anzahl aller Linksherzkatheter zur Koronardiagnostik                                                                                                                     | Mengeninformation | 827,2 (717)       | 1.002      |      |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                                                                                            | 2                 | 285.391           |            |      |
| Todesfälle mit Linksherzkatheter bei Herzinfarkt, bezogen auf Behandlungsfälle mit Herzinfarkt und Linksherzkatheter                                                     | < Erwartungswert  | 6,1%              | 11,1%      | 6,5% |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                                                                                            | 1                 | 3.883 von 63.325  | 32 von 287 | 1,71 |
| Behandlungsfälle mit diagnostischem Linksherzkatheter bei allen Erkrankungen (oder Z.n. Reanimation), ohne Hauptdiagnose Herzinfarkt und ohne Herz-OP, Anteil Todesfälle | <1,6%             | 1,6%              | 4,4%       |      |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                                                                                            | 1                 | 1.999 von 128.445 | 18 von 405 |      |
| Behandlungsfälle mit therapeutischem Linksherzkatheter ohne Hauptdiagnose Herzinfarkt und ohne Herz-OP, Anteil Todesfälle                                                | Beobachtungswert  | 1,7%              | 3,9%       |      |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                                                                                            | 1                 | 1.361 von 80.373  | 12 von 305 |      |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                                                               | IQM<br>Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> | IQM<br>Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert<br><a href="#">SMR</a> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                           |                                                      |                                                |                                                      |
| Anteil der Behandlungen mit therapeutischem Linksherzkatheter ohne Hauptdiagnose Herzinfarkt und ohne Herz-OP | Information                               | 38,5%                                                | 43,0%                                          |                                                      |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                                 | 1                                         | 80.373 von 208.818                                   | 305 von 710                                    |                                                      |
| Linksherzkatheterfälle bei Kindern und Jugendlichen                                                           | Mengeninformation                         | 24,3 (2)                                             | n.a.                                           |                                                      |
| Alle Patient:innen < 20 Jahre                                                                                 | 2                                         | 2.913                                                | <4                                             |                                                      |
| Herzrhythmusstörungen                                                                                         |                                           |                                                      |                                                |                                                      |
| Behandlungsfälle mit Herzrhythmusstörungen als Hauptdiagnose                                                  | Mengeninformation                         | 482,7 (318)                                          | 773                                            |                                                      |
|                                                                                                               | 2                                         | 189.203                                              |                                                |                                                      |
| Schrittmacher/Defibrillator Implantation                                                                      |                                           |                                                      |                                                |                                                      |
| Implantation eines Herzschrittmachers/Defibrillators                                                          | Mengeninformation                         | 146,9 (104)                                          | 172                                            |                                                      |
|                                                                                                               | 2                                         | 49.079                                               |                                                |                                                      |
| davon Einsatz oder Wechsel von Defibrillatoren                                                                | Mengeninformation                         | 49,2 (35)                                            | 44                                             |                                                      |
|                                                                                                               | 2                                         | 12.887                                               |                                                |                                                      |
| Ablative Therapie                                                                                             |                                           |                                                      |                                                |                                                      |
| Behandlungsfälle mit kathetergestützter ablativer Therapie                                                    | Mengeninformation                         | 297,8 (210)                                          | 162                                            |                                                      |
|                                                                                                               | 2                                         | 54.502                                               |                                                |                                                      |
| davon Vorhofablation bei Vorhofflimmern/-flattern, Anteil Todesfälle                                          | Information                               | 0,0766%                                              | 0,0%                                           |                                                      |
|                                                                                                               | 1                                         | 27 von 35.254                                        | 0 von 104                                      |                                                      |
| Operationen am Herzen                                                                                         |                                           |                                                      |                                                |                                                      |
| Behandlungsfälle mit Herzoperationen                                                                          | Mengeninformation                         | 256,3 (14)                                           | 22                                             |                                                      |
|                                                                                                               | 2                                         | 53.571                                               |                                                |                                                      |
| davon Herzklappenoperation                                                                                    | Mengeninformation                         | 282,7 (32)                                           | 21                                             |                                                      |
|                                                                                                               | 2                                         | 36.753                                               |                                                |                                                      |
| davon andere Operationen am Herzen                                                                            | Mengeninformation                         | 55,9 (3)                                             | n.a.                                           |                                                      |
|                                                                                                               | 2                                         | 9.448                                                | <4                                             |                                                      |
| Todesfälle bei minimalinvasivem Eingriff (endovaskulär/transapikal) der Mitralklappe                          | Beobachtungswert                          | 2,6%                                                 | 0,0%                                           |                                                      |
|                                                                                                               | 1                                         | 121 von 4.709                                        | 0 von 11                                       |                                                      |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2023

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der****[Präambel](#)**

IQM Indikatoren

IQM  
Zielwert[Quelle](#)IQM  
Durchschnittswert[Fallzahl](#)Klinik  
Ist-Wert[Fallzahl](#)Klinik  
Erwartungs-  
wert[SMR](#)

## Erkrankungen des Nervensystems und Schlaganfall

### Bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhaut

|                                                                         |                   |          |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----|--|
| Bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhäute als Hauptdiagnose | Mengeninformation | 32,4 (6) | 31 |  |
|                                                                         | 2                 | 9.285    |    |  |

### Todesfälle bei Hauptdiagnose Schlaganfall

|                                               |                  |                    |            |  |
|-----------------------------------------------|------------------|--------------------|------------|--|
| Todesfälle bei allen Formen des Schlaganfalls | Beobachtungswert | 10,3%              | 11,7%      |  |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                 | 1                | 11.457 von 111.650 | 98 von 835 |  |

### Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirninfarkt

|                               |                  |                  |            |  |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------|--|
| Todesfälle bei Hirninfarkt    | Beobachtungswert | 7,6%             | 8,6%       |  |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre | 1                | 7.237 von 95.762 | 62 von 721 |  |

|                                                                                       |             |                   |             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--|
| Anteil der Hirninfarkte mit medikamentöser Auflösung des Blutgerinnsels (Thrombolyse) | Information | 17,0%             | 20,2%       |  |
|                                                                                       | 1           | 16.257 von 95.762 | 146 von 721 |  |

|                                                                                          |                  |                  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|--|
| Todesfälle bei Hirninfarkt mit medikamentöser Auflösung des Blutgerinnsels (Thrombolyse) | Beobachtungswert | 7,1%             | 10,3%      |  |
|                                                                                          | 1                | 1.158 von 16.257 | 15 von 146 |  |

|                                                                                          |             |                  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------|--|
| Anteil der Hirninfarkte mit Entfernung des Blutgerinnsels durch Katheter (Thrombektomie) | Information | 10,3%            | 11,7%      |  |
|                                                                                          | 1           | 9.856 von 95.762 | 84 von 721 |  |

|                                                                                             |                  |                 |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|--|
| Todesfälle bei Hirninfarkt mit Entfernung des Blutgerinnsels durch Katheter (Thrombektomie) | Beobachtungswert | 20,5%           | 22,6%     |  |
|                                                                                             | 1                | 2.024 von 9.856 | 19 von 84 |  |

|                                              |                  |                  |             |  |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|--|
| Anteil der Hirninfarkte mit Lungenentzündung | Beobachtungswert | 9,9%             | 14,4%       |  |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                | 1                | 9.513 von 95.762 | 104 von 721 |  |

|                                                 |                  |                 |            |  |
|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------|--|
| Todesfälle bei Hirninfarkt mit Lungenentzündung | Beobachtungswert | 29,9%           | 32,7%      |  |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                   | 1                | 2.846 von 9.513 | 34 von 104 |  |

### Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirnblutung

|                                            |                  |                  |           |  |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|--|
| Todesfälle bei Hirnblutung (intrazerebral) | Beobachtungswert | 29,3%            | 37,1%     |  |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre              | 1                | 3.500 von 11.938 | 36 von 97 |  |

|                                             |                  |               |          |  |
|---------------------------------------------|------------------|---------------|----------|--|
| Todesfälle bei Hirnblutung (subarachnoidal) | Beobachtungswert | 18,7%         | 0,0%     |  |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre               | 1                | 690 von 3.697 | 0 von 17 |  |

|                                              |        |                 |           |  |
|----------------------------------------------|--------|-----------------|-----------|--|
| Anteil nicht näher bezeichneter Schlaganfall | <0,42% | 0,23%           | 0,0%      |  |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                | 1      | 253 von 111.650 | 0 von 835 |  |

|                    |                  |                |           |  |
|--------------------|------------------|----------------|-----------|--|
| Todesfälle bei TIA | Beobachtungswert | 0,3155%        | 0,4975%   |  |
|                    | 1                | 117 von 37.086 | 2 von 402 |  |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2023

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der****[Präambel](#)**

| IQM Indikatoren                                                                                                                   | <b>IQM<br/>Zielwert</b> | <b>IQM<br/>Durchschnittswert</b> | <b>Klinik<br/>Ist-Wert</b> | <b>Klinik<br/>Erwartungs-<br/>wert</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                   | <a href="#">Quelle</a>  | <a href="#">Fallzahl</a>         | <a href="#">Fallzahl</a>   | <a href="#">SMR</a>                    |
| <b>Behandlung auf einer Stroke Unit</b>                                                                                           |                         |                                  |                            |                                        |
| Behandlungsfälle mit neurologischer oder anderer<br>Komplexbehandlung                                                             | Mengeninformation<br>2  | 489,9 (486)<br>108.752           | 1.171                      |                                        |
| Hirnfarkte mit neurologischer oder anderer<br>Komplexbehandlung                                                                   | Information<br>1        | 75,0%<br>71.818 von 95.762       | 92,6%<br>668 von 721       |                                        |
| TIA mit neurologischer oder anderer<br>Komplexbehandlung                                                                          | Information<br>1        | 69,3%<br>25.693 von 37.086       | 85,8%<br>345 von 402       |                                        |
| Hirnfarkt oder TIA mit neurologischer oder<br>anderer Komplexbehandlung ohne Zuverlegungen<br>(in Anlehnung Schlaganfallregister) | Information<br>1        | 75,0%<br>93.593 von 124.869      | 90,9%<br>993 von 1.093     |                                        |
| Hirnfarkt oder TIA mit neurologischer oder<br>anderer Komplexbehandlung nur Zuverlegungen (in<br>Anlehnung Schlaganfallregister)  | Information<br>1        | 49,1%<br>3.918 von 7.979         | 66,7%<br>20 von 30         |                                        |
| <b>Epilepsie</b>                                                                                                                  |                         |                                  |                            |                                        |
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Epilepsie<br>Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                     | Mengeninformation<br>2  | 111,4 (33)<br>41.091             | 290                        |                                        |
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Epilepsie<br>Alle Patient:innen < 20 Jahre                                                     | Mengeninformation<br>2  | 51,4 (14)<br>11.247              | 34                         |                                        |
| <b>Multiple Sklerose</b>                                                                                                          |                         |                                  |                            |                                        |
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Multiple<br>Sklerose                                                                           | Mengeninformation<br>2  | 37,2 (24)<br>9.105               | 70                         |                                        |

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | <div>IQM Zielwert</div> <div><a href="#">Quelle</a></div> | <div>IQM Durchschnittswert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik Ist-Wert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik Erwartungs-wert</div> <div><a href="#">SMR</a></div> |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                           |                                                                      |                                                                |                                                                  |

Altersmedizin

Geriatrische Frührehabilitation

|                                                       |                                           |                                           |                |  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|--|
| Behandlungsfälle mit geriatrischer Frührehabilitation | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div> | <div>489,1 (412)</div> <div>119.341</div> | <div>463</div> |  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|--|

Mangelernährung bei Älteren

|                                                                                        |                                     |                                                  |                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| Behandlungsfälle mit erheblicher Mangelernährung, >= 65 Jahre und ohne Tumorerkrankung | <div>Information</div> <div>1</div> | <div>0,94%</div> <div>23.878 von 2.533.709</div> | <div>0,52%</div> <div>47 von 9.075</div> |  |
| Behandlungsfälle mit Sondenernährung/Infusionsernährung                                | <div>Information</div> <div>1</div> | <div>2,2%</div> <div>515 von 23.878</div>        | <div>0,0%</div> <div>0 von 47</div>      |  |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2023

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der****[Präambel](#)**

IQM Indikatoren

IQM  
Zielwert[Quelle](#)IQM  
Durchschnittswert[Fallzahl](#)Klinik  
Ist-Wert[Fallzahl](#)Klinik  
Erwartungs-  
wert[SMR](#)

## Lungenerkrankungen

### Lungenentzündung (Pneumonie)

|                                                                                                |                  |                    |            |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------|-------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung                                                  | < Erwartungswert | 12,7%              | 12,7%      | 15,1% |
| alle Altersgruppen                                                                             | 1                | 18.561 von 145.659 | 75 von 591 |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung ohne Zuverlegung, Tumor, Mukoviszidose           | < Erwartungswert | 11,8%              | 13,5%      | 15,2% |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                  | 1                | 11.935 von 100.994 | 54 von 399 |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung ohne Zuverlegung, Tumor, Mukoviszidose, COVID-19 | < Erwartungswert | 10,3%              | 10,0%      | 11,7% |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                  | 1                | 8.283 von 80.634   | 30 von 300 | 0,85  |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung ohne Zuverlegung, Tumor, Mukoviszidose           | Beobachtungswert | 0,33%              | 1,25%      |       |
| Alle Patient:innen < 20 Jahre                                                                  | 1                | 41 von 12.607      | 1 von 80   |       |
| Todesfälle bei Lungenentzündung durch Aspiration von Nahrungsmitteln oder Mageninhalt          | Beobachtungswert | 28,9%              | 28,1%      |       |
|                                                                                                | 1                | 3.663 von 12.659   | 9 von 32   |       |
| Todesfälle bei Bronchitis oder Bronchiolitis ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose          | < Erwartungswert | 2,2%               | 0,0%       | 2,0%  |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                  | 1                | 297 von 13.204     | 0 von 53   |       |

### COPD (Chronisch obstruktive Lungenerkrankung)

|                               |                  |                  |           |      |
|-------------------------------|------------------|------------------|-----------|------|
| Todesfälle bei COPD           | < Erwartungswert | 4,7%             | 2,7%      | 5,0% |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre | 1                | 3.311 von 69.877 | 9 von 339 | 0,53 |

### Lungenkrebs

|                                                |                   |            |     |  |
|------------------------------------------------|-------------------|------------|-----|--|
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Lungenkrebs | Mengeninformation | 191,2 (56) | 456 |  |
|                                                | 2                 | 72.065     |     |  |

### Operationen an der Lunge

|                                                                                                       |                  |                |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------|--|
| Todesfälle bei größeren operativen Entfernungen von Lunge/Bronchien                                   | Beobachtungswert | 2,6%           | 1,9%     |  |
|                                                                                                       | 1                | 364 von 14.037 | 1 von 54 |  |
| Todesfälle bei operativer Teilentfernung eines Lungenflügels bei Lungenkrebs                          | <2,0%            | 2,1%           | 0,0%     |  |
|                                                                                                       | 1                | 136 von 6.532  | 0 von 24 |  |
| Anteil der operativen Entfernungen eines Lungenflügels bei Lungenkrebsbehandlungsfällen               | <20%             | 3,5%           | 0,0%     |  |
|                                                                                                       | 1 / 3            | 238 von 6.770  | 0 von 24 |  |
| Anteil der bronchioangioplastischen Entfernungen eines Lungenflügels bei Lungenkrebsbehandlungsfällen | Beobachtungswert | 7,2%           | 0,0%     |  |
|                                                                                                       | 1                | 469 von 6.532  | 0 von 24 |  |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2023

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der**
**[Präambel](#)**

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |

## Erkrankungen der Bauchorgane

### Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen

|                                                                    |                  |                   |             |  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|--|
| Anteil laparoskopische Operationen                                 | >95,1%           | 95,7%             | 89,4%       |  |
|                                                                    | 1                | 52.365 von 54.722 | 194 von 217 |  |
| Anteil Umsteiger auf offene Operationen                            | Beobachtungswert | 2,6%              | 8,8%        |  |
|                                                                    | 1                | 1.429 von 54.722  | 19 von 217  |  |
| Anteil Todesfälle bei Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen | <0,6%            | 0,4678%           | 1,3825%     |  |
|                                                                    | 1                | 256 von 54.722    | 3 von 217   |  |

### Operation von Leisten-, Schenkel- und Nabelbrüchen (Hernien)

|                                                               |                  |                   |             |  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|--|
| Todesfälle bei Bruchoperationen ohne anteilige Darmentfernung | <0,12%           | 0,1186%           | 0,0%        |  |
|                                                               | 1                | 81 von 68.284     | 0 von 285   |  |
| Todesfälle bei Bruchoperationen mit anteiliger Darmentfernung | Beobachtungswert | 2,1%              | 0,0%        |  |
|                                                               | 1                | 157 von 7.308     | 0 von 35    |  |
| Anteil Leistenbruchoperationen mit Netz                       | Information      | 8,9%              | 0,0%        |  |
| Alle Patient:innen < 20 Jahre                                 | 1                | 228 von 2.564     | 0 von 16    |  |
| Anteil Leistenbruchoperationen mit Netz                       | Information      | 98,3%             | 95,9%       |  |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                 | 1                | 45.877 von 46.685 | 164 von 171 |  |

### Eingriffe an der Schilddrüse

|                                                                      |                   |               |           |  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------|--|
| Operative Entfernung der Schilddrüse                                 | Mengeninformation | 61,3 (20)     | 136       |  |
|                                                                      | 2                 | 18.747        |           |  |
| davon operative Entfernung der Schilddrüse bei Schilddrüsenkrebs     | Mengeninformation | 12,7 (5)      | 18        |  |
|                                                                      | 2                 | 2.703         |           |  |
| davon operative Entfernung der Schilddrüse bei gutartiger Erkrankung | Mengeninformation | 50,9 (18)     | 115       |  |
|                                                                      | 2                 | 15.005        |           |  |
| Anteil der Beatmungsfälle (> 24 Std.) nach Schilddrüseneingriff      | Information       | 0,5%          | 0,0%      |  |
|                                                                      | 1                 | 89 von 17.685 | 0 von 133 |  |
| Behandlungsfälle mit Radiojodtherapie                                | Mengeninformation | 250,4 (192)   | 375       |  |
|                                                                      | 2                 | 10.266        |           |  |

### Große Operationen am Dick- und Enddarm (Kolon und Rektum)

|                                                         |                   |            |     |  |
|---------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----|--|
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Dick-/Enddarmkrebs   | Mengeninformation | 126,9 (85) | 265 |  |
|                                                         | 2                 | 47.850     |     |  |
| Behandlungsfälle mit Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn | Mengeninformation | 94,1 (61)  | 157 |  |
|                                                         | 2                 | 39.141     |     |  |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2023

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der**
**[Präambel](#)**

| IQM Indikatoren                                                                                              | IQM Zielwert      | IQM Durchschnittswert |            | Klinik Ist-Wert |     |     | Klinik Erwartungs-wert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------|-----------------|-----|-----|------------------------|
|                                                                                                              | Quelle            | Fallzahl              |            | Fallzahl        |     |     | SMR                    |
|                                                                                                              |                   |                       |            |                 |     |     |                        |
| Todesfälle bei operativer Entfernung des Dick-/Enddarms                                                      | Beobachtungswert  | 7,8%                  |            | 10,2%           |     |     |                        |
|                                                                                                              | 1                 | 2.973                 | 37.902     | 22              | von | 215 |                        |
| Todesfälle bei operativer Dickdarmentfernung bei Krebs, ohne komplizierende Diagnose                         | <4,1%             | 3,9%                  |            | 0,0%            |     |     |                        |
|                                                                                                              | 1                 | 358                   | von 9.296  | 0               | von | 45  |                        |
| Todesfälle bei operativer Dickdarmentfernung bei Krebs, mit komplizierender Diagnose                         | Beobachtungswert  | 11,6%                 |            | 27,8%           |     |     |                        |
|                                                                                                              | 1                 | 324                   | von 2.804  | 5               | von | 18  |                        |
| Todesfälle bei operativer Enddarmentfernung bei Krebs                                                        | <3,2%             | 2,7%                  |            | 6,9%            |     |     |                        |
|                                                                                                              | 1                 | 122                   | von 4.478  | 2               | von | 29  |                        |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Divertikel, ohne Abszess/Perforation               | <0,72%            | 0,7557%               |            | 0,0%            |     |     |                        |
|                                                                                                              | 1                 | 15                    | von 1.985  | 0               | von | 10  |                        |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Divertikel, mit Abszess/Perforation                | Beobachtungswert  | 5,4%                  |            | 0,0%            |     |     |                        |
|                                                                                                              | 1                 | 274                   | von 5.071  | 0               | von | 30  |                        |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Darmischämie                                       | Information       | 42,5%                 |            | 62,5%           |     |     |                        |
|                                                                                                              | 1                 | 934                   | von 2.198  | 10              | von | 16  |                        |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Colitis oder Crohn                                 | Beobachtungswert  | 3,8%                  |            | 9,1%            |     |     |                        |
|                                                                                                              | 1                 | 76                    | von 2.000  | 1               | von | 11  |                        |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei anderen Diagnosen                                  | Information       | 8,6%                  |            | 7,1%            |     |     |                        |
|                                                                                                              | 1                 | 870                   | von 10.070 | 4               | von | 56  |                        |
| Anteil operative Leberentfernung bei Entfernung des Dick-/Enddarms bei Dick- und Enddarmkrebs                | Information       | 4,3%                  |            | 4,3%            |     |     |                        |
|                                                                                                              | 1                 | 717                   | von 16.578 | 4               | von | 92  |                        |
|                                                                                                              |                   |                       |            |                 |     |     |                        |
| Erkrankungen des Magens                                                                                      |                   |                       |            |                 |     |     |                        |
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Magenkrebs (mit und ohne Magenoperation)                                  | Mengeninformation | 45,7 (26)             |            | 117             |     |     |                        |
|                                                                                                              | 2                 | 16.139                |            |                 |     |     |                        |
| Todesfälle bei Geschwüren an Magen, Zwölffingerdarm oder Dünndarm als Hauptdiagnose (mit und ohne Operation) | Beobachtungswert  | 5,4%                  |            | 7,6%            |     |     |                        |
|                                                                                                              | 1                 | 1.072                 | von 20.006 | 5               | von | 66  |                        |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                                       | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                                                                                       | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |
| Magenentfernungen                                                                     | Mengeninformation<br>2 | 36,4 (13)<br>10.624      | 18                       |                               |
| Todesfälle bei operativer Magenentfernung bei Magenkrebs (exkl. Speiseröhre)          | Beobachtungswert<br>1  | 5,4%<br>114 von 2.096    | 0,0%<br>0 von 4          |                               |
| Todesfälle bei operativer Magenentfernung kombiniert mit Speiseröhreneingriff         | Beobachtungswert<br>1  | 18,1%<br>47 von 259      | 20,0%<br>1 von 5         |                               |
| Todesfälle bei partieller und totaler operativer Magenentfernung bei anderer Diagnose | Beobachtungswert<br>1  | 2,9%<br>240 von 8.269    | 44,4%<br>4 von 9         |                               |
| Eingriffe an der Speiseröhre (Ösophagus)                                              |                        |                          |                          |                               |
| Todesfälle bei komplexen Eingriffen an der Speiseröhre                                | Beobachtungswert<br>1  | 8,9%<br>166 von 1.864    | 12,5%<br>3 von 24        |                               |
| Eingriffe an der Bauchspeicheldrüse (Pankreas)                                        |                        |                          |                          |                               |
| Todesfälle bei Eingriffen an der Bauchspeicheldrüse ohne Transplantation              | Beobachtungswert<br>1  | 9,3%<br>467 von 5.035    | 14,3%<br>5 von 35        |                               |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                         |                        |                          |                          |                               |
| Todesfälle bei operativer Bauchspeicheldrüsenentfernung bei Bauchspeicheldrüsenkrebs  | Beobachtungswert<br>1  | 7,7%<br>229 von 2.966    | 9,1%<br>1 von 11         |                               |
| Anatomische Leberentfernung, Anteil Todesfälle                                        | Beobachtungswert<br>1  | 5,8%<br>157 von 2.692    | 15,4%<br>2 von 13        |                               |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                         |                        |                          |                          |                               |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |

## Gefäßoperationen

### Operationen der Halsschlagader (Carotis)

|                                                                                                                        |                   |               |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------|--|
| Todesfälle bei Operation der Halsschlagader, nur extrakranielle Operationen                                            | <1,09%            | 1,05%         | 0,0%     |  |
|                                                                                                                        | 1                 | 101 von 9.635 | 0 von 65 |  |
| Todesfälle bei Implantation von Stents in die Halsschlagader, nur extrakranielle Gefäße                                | <2,2%             | 2,7%          | 0,0%     |  |
|                                                                                                                        | 1                 | 65 von 2.411  | 0 von 8  |  |
| Todesfälle bei extrakraniellen Gefäßoperationen bei Herz-, Aorten- oder Beinarterienoperationen, Trauma oder HNO-Tumor | Beobachtungswert  | 15,2%         | 30,8%    |  |
|                                                                                                                        | 1                 | 283 von 1.863 | 4 von 13 |  |
| Intrakranielle perkutan-transluminale Gefäßinterventionen                                                              | Mengeninformation | 101,8 (54)    | 89       |  |
|                                                                                                                        | 2                 | 15.582        |          |  |

### Eingriffe an der Hauptschlagader

|                                                                                                |                   |               |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------|--|
| Operationen an der Hauptschlagader (Aorta)                                                     | Mengeninformation | 56,1 (31)     | 36       |  |
|                                                                                                | 2                 | 10.773        |          |  |
| Operationen Ersatz der Baucha Schlagader                                                       | Mengeninformation | 30,4 (25)     | 35       |  |
|                                                                                                | 2                 | 5.623         |          |  |
| Todesfälle bei offener Operation eines nicht rupturierten Bauchaortenaneurysmas                | <7,6%             | 6,7%          | 0,0%     |  |
|                                                                                                | 1                 | 57 von 855    | 0 von 6  |  |
| Todesfälle bei endovaskulärer Stentimplantation eines nicht rupturierten Bauchaortenaneurysmas | <1,4%             | 0,7%          | 0,0%     |  |
|                                                                                                | 1                 | 24 von 3.341  | 0 von 18 |  |
| Todesfälle bei Operation der Bauchaorta, nicht bei Aneurysma                                   | Beobachtungswert  | 6,1%          | 10,0%    |  |
|                                                                                                | 1                 | 30 von 492    | 1 von 10 |  |
| Todesfälle bei rupturiertem Aortenaneurysma                                                    | Information       | 41,7%         | n.a.     |  |
|                                                                                                | 1                 | 778 von 1.867 | <4       |  |
| davon Todesfälle bei Operation eines rupturierten Aortenaneurysmas                             | Information       | 34,5%         | n.a.     |  |
|                                                                                                | 1                 | 345 von 999   | <4       |  |

### Operationen der Becken-/Bein-Arterien

|                                                          |             |                  |            |  |
|----------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------|--|
| Todesfälle bei Operationen der Becken-/Beinarterien      | Information | 5,7%             | 8,6%       |  |
|                                                          | 1           | 1.655 von 29.140 | 13 von 152 |  |
| davon Todesfälle bei Schaufensterkrankheit (Claudicatio) | <0,33%      | 0,2817%          | 0,0%       |  |
|                                                          | 1           | 17 von 6.035     | 0 von 25   |  |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                                                             | <div>IQM<br/>Zielwert</div> <div><a href="#">Quelle</a></div> | <div>IQM<br/>Durchschnittswert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Ist-Wert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Erwartungs-<br/>wert</div> <div><a href="#">SMR</a></div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             |                                                               |                                                                          |                                                                    |                                                                           |
| davon Todesfälle bei Ruheschmerz                                                                            | <div>&lt;2,3%</div> <div>1</div>                              | <div>1,3%</div> <div>27 von 2.093</div>                                  | <div>0,0%</div> <div>0 von 10</div>                                |                                                                           |
| davon Todesfälle bei Ulzeration/Gangrän                                                                     | <div>&lt;4,5%</div> <div>1</div>                              | <div>3,8%</div> <div>140 von 3.698</div>                                 | <div>6,3%</div> <div>1 von 16</div>                                |                                                                           |
| PTA (Perkutan transluminale Gefäßinterventionen)                                                            |                                                               |                                                                          |                                                                    |                                                                           |
| Behandlungsfälle mit Wiedereröffnung eines verschlossenen Gefäßes mittels Ballonkatheter, Anteil Todesfälle | <div>Beobachtungswert</div> <div>1</div>                      | <div>2,9%</div> <div>1.767 von 61.041</div>                              | <div>4,9%</div> <div>10 von 206</div>                              |                                                                           |
| PTA Abdomen/Beinarterien mit arterieller Operation im gleichen stationären Aufenthalt                       | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div>                     | <div>45,9 (36)</div> <div>10.200</div>                                   | <div>32</div>                                                      |                                                                           |
| Arteriovenöser Shunt                                                                                        |                                                               |                                                                          |                                                                    |                                                                           |
| Anlegen eines arteriovenösen Shunts                                                                         | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div>                     | <div>29,3 (17)</div> <div>5.801</div>                                    | <div>12</div>                                                      |                                                                           |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2023

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der**

**[Präambel](#)**

IQM Indikatoren

IQM  
Zielwert

[Quelle](#)

IQM  
Durchschnittswert

[Fallzahl](#)

Klinik  
Ist-Wert

[Fallzahl](#)

Klinik  
Erwartungs-  
wert

[SMR](#)

## Frauenheilkunde und Geburtshilfe

### Geburtshilfe

|                                                                                             |                  |                             |                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|--|
| Mütterliche Todesfälle bei der Geburt                                                       | <0,005%<br>1     | 0,0049%<br>12 von 243.869   | 0,0%<br>0 von 1.214    |  |
| Anteil vaginale Geburten mit Dammriss 3. und 4. Grades                                      | <2,0%<br>1       | 2,1%<br>3.328 von 162.208   | 1,9%<br>13 von 699     |  |
| Anteil vaginale Geburten mit Dammschnitt                                                    | Information<br>1 | 9,6%<br>15.637 von 162.208  | 16,0%<br>112 von 699   |  |
| Kaiserschnitttrate, Anteil an allen Geburten                                                | Information<br>1 | 33,5%<br>81.661 von 243.869 | 42,4%<br>515 von 1.214 |  |
| Anteil sanfter Kaiserschnitt (nach Misgav-Ladach), Anteil an allen Kaiserschnittoperationen | Information<br>1 | 78,4%<br>64.042 von 81.661  | 6,6%<br>34 von 515     |  |
| Anteil Kaiserschnitte bei risikoarmer Geburt                                                | Information<br>1 | 28,1%<br>59.928 von 213.073 | 35,8%<br>367 von 1.025 |  |
| davon Anteil Kaiserschnitte bei risikoarmer Geburt                                          | Information<br>1 | 26,0%<br>40.688 von 156.630 | 32,9%<br>264 von 803   |  |
| Alle Patient:innen < 35 Jahre                                                               |                  |                             |                        |  |
| davon Anteil Kaiserschnitte bei risikoarmer Geburt                                          | Information<br>1 | 34,1%<br>19.240 von 56.443  | 46,4%<br>103 von 222   |  |
| Alle Patient:innen > 34 Jahre                                                               |                  |                             |                        |  |

### Neugeborene

|                                                         |                        |                         |            |  |
|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|--|
| Neugeborene mit Gewicht < 1.250 Gramm                   | Mengeninformation<br>2 | 23,7 (25)<br>2.398      | 12         |  |
| davon Neugeborene mit Gewicht von 500 bis 749 Gramm     | Mengeninformation<br>2 | 7,4 (6)<br>564          | n.a.<br><4 |  |
| davon Neugeborene mit Gewicht von 750 bis 999 Gramm     | Mengeninformation<br>2 | 9,3 (8)<br>717          | n.a.<br><4 |  |
| davon Neugeborene mit Gewicht von 1.000 bis 1.249 Gramm | Mengeninformation<br>2 | 10,4 (10)<br>875        | 6          |  |
| Neugeborene mit Gewicht von 1.250 bis 1.499 Gramm       | Mengeninformation<br>2 | 10,1 (8)<br>1.001       | 6          |  |
| Neugeborene mit Gewicht von 1.500 bis 2.499 Gramm       | Mengeninformation<br>2 | 69,9 (26)<br>14.885     | 101        |  |
| Neugeborene mit Gewicht > 2.500 Gramm                   | Mengeninformation<br>2 | 1057,1 (773)<br>242.078 | 1.202      |  |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2023

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der**

**[Präambel](#)**

| IQM Indikatoren                                                                                                             | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                             | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |
| <b>Frauenheilkunde</b>                                                                                                      |                        |                          |                          |                               |
| Todesfälle bei operativer Entfernung der Gebärmutter bei gutartigen Erkrankungen                                            | <0,04%                 | 0,0492%                  | 0,0%                     |                               |
| Alle Patient:innen > 14 Jahre                                                                                               | 1                      | 11 von 22.351            | 0 von 76                 |                               |
| Anteil der Behandlungsfälle mit vaginaler/laparoskopischer Gebärmutterentfernung, ohne plastische Operation                 | >88,4%                 | 89,3%                    | 88,2%                    |                               |
|                                                                                                                             | 1                      | 19.797 von 22.158        | 67 von 76                |                               |
| Anteil der Behandlungsfälle mit vaginaler Gebärmutterentfernung, ohne plastische Operation                                  | Information            | 29,1%                    | 27,6%                    |                               |
|                                                                                                                             | 1                      | 6.439 von 22.158         | 21 von 76                |                               |
| Anteil der Behandlungsfälle mit vaginaler Entfernung durch Zerkleinerung der Gebärmutter                                    | Information            | 5,7%                     | 4,8%                     |                               |
|                                                                                                                             | 1                      | 366 von 6.439            | 1 von 21                 |                               |
| Anteil der Behandlungsfälle mit laparoskopischer Gebärmutterentfernung, ohne plastische Operation                           | Information            | 60,3%                    | 60,5%                    |                               |
|                                                                                                                             | 1                      | 13.358 von 22.158        | 46 von 76                |                               |
| Anteil der Behandlungsfälle mit laparoskopischer Entfernung durch Zerkleinerung der Gebärmutter                             | Information            | 27,5%                    | 4,3%                     |                               |
|                                                                                                                             | 1                      | 3.667 von 13.358         | 2 von 46                 |                               |
| Anteil der Behandlungsfälle mit Gebärmutterentfernung und Eierstockentfernung bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose | Information            | 5,7%                     | 17,6%                    |                               |
| Alle Patient:innen < 50 Jahre                                                                                               | 1                      | 420 von 7.325            | 3 von 17                 |                               |
| Anteil der Behandlungsfälle mit Gebärmutterentfernung und Eierstockentfernung bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose | Information            | 31,7%                    | 63,0%                    |                               |
| Alle Patient:innen > 49 Jahre                                                                                               | 1                      | 2.744 von 8.657          | 17 von 27                |                               |
| <b>Bösartige Neubildungen der Brust und der weiblichen Geschlechtsorgane</b>                                                |                        |                          |                          |                               |
| Behandlungsfälle mit Krebserkrankung der Brust oder der Geschlechtsorgane als Hauptdiagnose                                 | Mengeninformation      | 213,4 (67)               | 245                      |                               |
|                                                                                                                             | 2                      | 77.033                   |                          |                               |
| Behandlungsfälle mit Eierstockkrebs als Hauptdiagnose                                                                       | Mengeninformation      | 30,5 (13)                | 33                       |                               |
|                                                                                                                             | 2                      | 9.647                    |                          |                               |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2023

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

| IQM Indikatoren                                                         | <b>IQM<br/>Zielwert</b> | <b>IQM<br/>Durchschnittswert</b> | <b>Klinik<br/>Ist-Wert</b> | <b>Klinik<br/>Erwartungs-<br/>wert</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
|                                                                         | <a href="#">Quelle</a>  | <a href="#">Fallzahl</a>         | <a href="#">Fallzahl</a>   | <a href="#">SMR</a>                    |
| <b>Todesfälle nach Eierstockentfernung bei Eierstockkrebs</b>           |                         |                                  |                            |                                        |
|                                                                         | Beobachtungswert        | 1,4%                             | 9,1%                       |                                        |
|                                                                         | 1                       | 36 von 2.641                     | 1 von 11                   |                                        |
| <b>Behandlungsfälle mit Gebärmutterkrebs als Hauptdiagnose</b>          |                         |                                  |                            |                                        |
|                                                                         | Mengeninformation       | 51,7 (29)                        | 79                         |                                        |
|                                                                         | 2                       | 15.677                           |                            |                                        |
| <b>Todesfälle nach Gebärmutterentfernung bei Gebärmutterkrebs</b>       |                         |                                  |                            |                                        |
|                                                                         | Beobachtungswert        | 0,74%                            | 11,76%                     |                                        |
|                                                                         | 1                       | 45 von 6.083                     | 2 von 17                   |                                        |
| <b>Behandlungsfälle mit Brustkrebs als Hauptdiagnose</b>                |                         |                                  |                            |                                        |
|                                                                         | Mengeninformation       | 136,0 (33)                       | 115                        |                                        |
|                                                                         | 2                       | 47.606                           |                            |                                        |
| <b>Eingriffe an der Brust</b>                                           |                         |                                  |                            |                                        |
| <b>Eingriffe an der Brust</b>                                           |                         |                                  |                            |                                        |
|                                                                         | Mengeninformation       | 167,2 (121)                      | 89                         |                                        |
|                                                                         | 2                       | 42.291                           |                            |                                        |
| <b>Operationen der Brust bei Brustkrebs</b>                             |                         |                                  |                            |                                        |
|                                                                         | Mengeninformation       | 149,9 (125)                      | 78                         |                                        |
|                                                                         | 2                       | 31.181                           |                            |                                        |
| <b>Anteil brusterhaltender Operationen bei Brustkrebs</b>               |                         |                                  |                            |                                        |
|                                                                         | Information             | 72,1%                            | 59,0%                      |                                        |
|                                                                         | 1                       | 22.484 von 31.181                | 46 von 78                  |                                        |
| <b>Eingriffe am Beckenboden bei der Frau</b>                            |                         |                                  |                            |                                        |
| <b>Beckenbodenoperationen mit und ohne plastische Operation, gesamt</b> |                         |                                  |                            |                                        |
|                                                                         | Mengeninformation       | 72,5 (54)                        | 54                         |                                        |
|                                                                         | 2                       | 20.359                           |                            |                                        |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungs-wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>    |

Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe

Bösartige Neubildungen des Bewegungsapparates

|                                                                                                                                    |                   |          |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----|--|
| Behandlungsfälle mit bösartiger Neubildung an Knochen, Gelenkknorpel, peripheren Nerven, Retroperitoneum, Bindegewebe, Weichteilen | Mengeninformation | 43,1 (5) | 12 |  |
|                                                                                                                                    | 2                 | 14.443   |    |  |

Gelenkersatz (Endoprothetik)

|                                                                                                                                           |                  |                  |           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|--|
| Todesfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung                                        | <0,13%           | 0,0845%          | 0,0%      |  |
|                                                                                                                                           | 1                | 51 von 60.341    | 0 von 113 |  |
| Todesfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei hüftgelenksnahen Frakturen                                                         | Beobachtungswert | 5,2%             | 4,3%      |  |
|                                                                                                                                           | 1                | 1.115 von 21.648 | 3 von 70  |  |
| Todesfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei anderen Diagnosen                                                                  | Beobachtungswert | 5,7%             | 6,7%      |  |
|                                                                                                                                           | 1                | 382 von 6.712    | 1 von 15  |  |
| Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung | Beobachtungswert | 2,4%             | 0,9%      |  |
|                                                                                                                                           | 1                | 1.442 von 60.341 | 1 von 113 |  |
| Todesfälle bei Wechsel Hüftgelenkersatz ohne Fraktur oder Infektion bei Aufnahme                                                          | <1,38%           | 1,35%            | 6,67%     |  |
|                                                                                                                                           | 1                | 66 von 4.881     | 1 von 15  |  |
| davon Todesfälle bei Wechsel Hüftgelenkersatz mit Sonderprothesen                                                                         | Information      | 1,0%             | n.a.      |  |
|                                                                                                                                           | 1                | 9 von 933        | <4        |  |
| Todesfälle bei Wechsel Hüftgelenkersatz wegen Fraktur oder Infektion                                                                      | Beobachtungswert | 4,6%             | 0,0%      |  |
|                                                                                                                                           | 1                | 187 von 4.097    | 0 von 7   |  |
| Todesfälle bei Kniegelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung                                        | <0,06%           | 0,0442%          | 0,0%      |  |
|                                                                                                                                           | 1                | 27 von 61.154    | 0 von 100 |  |
| Todesfälle bei Kniegelenkersatz (Erstimplantation) bei anderen Diagnosen                                                                  | Beobachtungswert | 0,3313%          | 0,0%      |  |
|                                                                                                                                           | 1                | 12 von 3.622     | 0 von 11  |  |
| Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei Kniegelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung | Beobachtungswert | 1,6%             | 0,0%      |  |
|                                                                                                                                           | 1                | 975 von 61.154   | 0 von 100 |  |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2023

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der****[Präambel](#)**

| IQM Indikatoren                                                                                                                        | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert |     |        | Klinik<br>Ist-Wert       |     |    | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----|--------|--------------------------|-----|----|-------------------------------|
|                                                                                                                                        | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> |     |        | <a href="#">Fallzahl</a> |     |    | <a href="#">SMR</a>           |
| Todesfälle bei Wechsel Kniegelenkersatz oder -<br>teilersatz bei Aufnahme                                                              | <0,16%                 | 0,3995%                  |     |        | 0,0%                     |     |    |                               |
|                                                                                                                                        | 1                      | 20                       | von | 5.006  | 0                        | von | 9  |                               |
| davon Todesfälle bei Wechsel Kniegelenkersatz mit<br>Sonderprothesen                                                                   | Information            | 0,456%                   |     |        | 0,0%                     |     |    |                               |
|                                                                                                                                        | 1                      | 7                        | von | 1.535  | 0                        | von | 6  |                               |
| Todesfälle bei Wechsel Kniegelenkersatz wegen<br>Fraktur oder Infektion                                                                | Beobachtungswert       | 3,2%                     |     |        | 0,0%                     |     |    |                               |
|                                                                                                                                        | 1                      | 66                       | von | 2.092  | 0                        | von | 5  |                               |
| Todesfälle bei Hüft- oder Kniegelenkersatz bei<br>Tumorerkrankung                                                                      | Beobachtungswert       | 7,4%                     |     |        | 5,9%                     |     |    |                               |
|                                                                                                                                        | 1                      | 178                      | von | 2.404  | 1                        | von | 17 |                               |
| Hüftgelenknahe Frakturen                                                                                                               |                        |                          |     |        |                          |     |    |                               |
| Todesfälle nach operativer Versorgung einer<br>Schenkelhalsfraktur                                                                     | < Erwartungswert       | 4,7%                     |     |        | 4,3%                     |     |    | 5,8%                          |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                                                          | 1                      | 1.118                    | von | 23.922 | 3                        | von | 70 | 0,74                          |
| Todesfälle nach Gelenkersatz bei<br>Schenkelhalsfraktur                                                                                | Beobachtungswert       | 5,1%                     |     |        | 4,4%                     |     |    |                               |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                                                          | 1                      | 1.075                    | von | 21.194 | 3                        | von | 68 |                               |
| Todesfälle nach Osteosynthese (Verbindung der<br>Knochenfragmente durch Platten, Schrauben oder<br>Nägel) bei Schenkelhalsfraktur      | Beobachtungswert       | 1,6%                     |     |        | n.a.                     |     |    |                               |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                                                          | 1                      | 43                       | von | 2.728  | <4                       |     |    |                               |
| Todesfälle nach operativer Versorgung einer<br>perthrochantären Fraktur                                                                | < Erwartungswert       | 4,8%                     |     |        | 4,3%                     |     |    | 5,5%                          |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                                                          | 1                      | 957                      | von | 19.901 | 3                        | von | 70 | 0,78                          |
| Todesfälle nach Gelenkersatz bei perthrochantärer<br>Fraktur                                                                           | Beobachtungswert       | 9,0%                     |     |        | n.a.                     |     |    |                               |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                                                          | 1                      | 38                       | von | 422    | <4                       |     |    |                               |
| Todesfälle nach Osteosynthese (Verbindung der<br>Knochenfragmente durch Platten, Schrauben oder<br>Nägel) bei perthrochantärer Fraktur | Beobachtungswert       | 4,7%                     |     |        | 4,4%                     |     |    |                               |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                                                          | 1                      | 919                      | von | 19.479 | 3                        | von | 68 |                               |
| Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark                                                                                       |                        |                          |     |        |                          |     |    |                               |
| Operationen an der Wirbelsäule und am<br>Rückenmark (ohne lokale Schmerztherapien)                                                     | Mengeninformation      | 320,5 (208)              |     |        | 331                      |     |    |                               |
|                                                                                                                                        | 2                      | 113.450                  |     |        |                          |     |    |                               |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder<br>Wirbelkörper-Ersatz bei Tumor (inkl. komplexe<br>Rekonstruktionen)                     | Beobachtungswert       | 7,9%                     |     |        | 20,0%                    |     |    |                               |
|                                                                                                                                        | 1                      | 265                      | von | 3.351  | 3                        | von | 15 |                               |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2023

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der**

**[Präambel](#)**

| IQM Indikatoren                                                                                                                    | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert |            | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                    | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> |            | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder Wirbelkörper-Ersatz bei Trauma (inkl. komplexe Rekonstruktionen, Rückenmarkoperation) | Beobachtungswert<br>1  | 514                      | von 14.514 | 3                        | von 46                        |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Operation bei Entzündung der Bandscheibe oder des Rückenmarks                                          | Beobachtungswert<br>1  | 193                      | von 2.439  | 1                        | von 7                         |
| Todesfälle bei komplexen Rekonstruktionen der Wirbelsäule (ohne Tumor oder Trauma)                                                 | Beobachtungswert<br>1  | 0,7134%<br>6             | von 841    | n.a.                     | <4                            |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder 1 Wirbelkörper-Ersatz (ohne Tumor, Trauma oder kompl. Rekonstruktionen)               | Beobachtungswert<br>1  | 22                       | von 13.018 | 0                        | von 45                        |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder 2 Wirbelkörper-Ersatz (ohne Tumor, Trauma oder kompl. Rekonstruktionen)               | Beobachtungswert<br>1  | 14                       | von 6.867  | 0                        | von 31                        |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder 3 oder mehr Wirbelkörper-Ersatz (ohne Tumor, Trauma oder kompl. Rekonstruktionen)     | Beobachtungswert<br>1  | 39                       | von 5.254  | 0                        | von 18                        |
| Todesfälle bei alleiniger 'Entlastung' (Dekompression) der Wirbelsäule                                                             | Beobachtungswert<br>1  | 17                       | von 23.310 | 0                        | von 43                        |
| Todesfälle bei 'einfachen' Bandscheibenentfernungen                                                                                | <0,03%<br>1            | 2                        | von 16.176 | 0                        | von 75                        |
| Todesfälle bei Vertebro-/Kyphoplastie (ohne Tumor, kompl. Rekonstruktion, Versteifung, WK-Ersatz oder Bandscheibeneingriffe)       | <0,53%<br>1            | 34                       | von 6.450  | 0                        | von 5                         |
| Todesfälle bei anderen Operationen an der Wirbelsäule oder am Rückenmark                                                           | Beobachtungswert<br>1  | 394                      | von 21.230 | 1                        | von 45                        |
| Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei 'einfachen' Bandscheibenentfernungen                                         | Beobachtungswert<br>1  | 83                       | von 16.176 | 1                        | von 75                        |
| Lokale Schmerztherapie an der Wirbelsäule (ohne andere Wirbelsäulenoperation)                                                      | Mengeninformation<br>2 | 81,0 (33)                | 27.774     | 47                       |                               |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                                                                           | <div>IQM<br/>Zielwert</div> <div><a href="#">Quelle</a></div> | <div>IQM<br/>Durchschnittswert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Ist-Wert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Erwartungs-<br/>wert</div> <div><a href="#">SMR</a></div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           |                                                               |                                                                          |                                                                    |                                                                           |
| Behandlungsfälle mit Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen als Hauptdiagnose ohne Operation oder lokale Schmerztherapie | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div>                     | <div>129,7 (109)</div> <div>53.308</div>                                 | <div>220</div>                                                     |                                                                           |
| Operationen am Bewegungsapparat inkl. Endoprothetik                                                                       |                                                               |                                                                          |                                                                    |                                                                           |
| Gelenkersatz am Schulter-/ Ellenbogengelenk                                                                               | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div>                     | <div>35,7 (26)</div> <div>12.571</div>                                   | <div>17</div>                                                      |                                                                           |
| Mehrfachverletzungen - Polytraumen                                                                                        |                                                               |                                                                          |                                                                    |                                                                           |
| Mehrfachverletzungen (Polytraumen) im Sinne der DRG-Definition                                                            | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div>                     | <div>21,4 (8)</div> <div>7.373</div>                                     | <div>22</div>                                                      |                                                                           |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2023

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

IQM Indikatoren

IQM  
Zielwert

[Quelle](#)

IQM  
Durchschnittswert

[Fallzahl](#)

Klinik  
Ist-Wert

[Fallzahl](#)

Klinik  
Erwartungs-  
wert

[SMR](#)

## Urologie

### Operationen der Niere

|                                                                                             |                       |                          |                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|--|
| Todesfälle bei Totalentfernung der Niere bei bösartiger Neubildung                          | <1,8%<br>1            | 1,3%<br>43 von 3.384     | 0,0%<br>0 von 15   |  |
| Anteil laparoskopischer Operationen bei Totalentfernung der Niere bei bösartiger Neubildung | Information<br>1      | 46,1%<br>1.559 von 3.384 | 60,0%<br>9 von 15  |  |
| Todesfälle bei Teilentfernung der Niere bei bösartiger Neubildung                           | <0,35%<br>1           | 0,2538%<br>9 von 3.546   | 0,0%<br>0 von 13   |  |
| Anteil laparoskopischer Operationen bei Teilentfernung der Niere bei bösartiger Neubildung  | Information<br>1      | 59,1%<br>2.096 von 3.546 | 84,6%<br>11 von 13 |  |
| Anteil der Teilentfernungen der Niere bei bösartiger Neubildung                             | Information<br>1      | 51,2%<br>3.546 von 6.930 | 46,4%<br>13 von 28 |  |
| Todesfälle bei Totalentfernung der Niere bei anderer Diagnose                               | Beobachtungswert<br>1 | 3,9%<br>82 von 2.086     | 12,5%<br>1 von 8   |  |
| Todesfälle bei Teilentfernung der Niere bei anderer Diagnose                                | Beobachtungswert<br>1 | 0,1654%<br>2 von 1.209   | n.a.<br><4         |  |

### Harnblase

|                                                                                             |                        |                           |                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|--|
| Behandlungsfälle mit Blasenkrebs als Hauptdiagnose                                          | Mengeninformation<br>2 | 136,3 (46)<br>44.148      | 326                 |  |
| Operationen an der Harnblase durch die Harnröhre                                            | Mengeninformation<br>2 | 214,2 (207)<br>44.556     | 323                 |  |
| davon Entfernung des Tumorgewebes durch die Harnröhre                                       | Mengeninformation<br>2 | 168,7 (151)<br>31.552     | 243                 |  |
| Anteil Entfernung des Tumorgewebes durch die Harnröhre mit Einbringen von Chemotherapeutika | Beobachtungswert<br>1  | 18,1%<br>5.716 von 31.552 | 18,9%<br>46 von 243 |  |
| Todesfälle bei Entfernung der Harnblase                                                     | <4,8%<br>1             | 4,5%<br>134 von 2.952     | 16,7%<br>2 von 12   |  |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2023

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

| IQM Indikatoren                                                                                                              | <b>IQM<br/>Zielwert</b>    | <b>IQM<br/>Durchschnittswert</b> | <b>Klinik<br/>Ist-Wert</b> | <b>Klinik<br/>Erwartungs-<br/>wert</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                              | <a href="#">Quelle</a>     | <a href="#">Fallzahl</a>         | <a href="#">Fallzahl</a>   | <a href="#">SMR</a>                    |
| Todesfälle bei vollständiger Entnahme aller Organe<br>des kleinen Beckens bei Mann oder Frau                                 | Beobachtungswert<br><br>1  | 6,0%<br><br>32 von 536           | 0,0%<br><br>0 von 7        |                                        |
| <b>Prostata</b>                                                                                                              |                            |                                  |                            |                                        |
| Todesfälle bei Operationen der Prostata durch die<br>Harnröhre                                                               | <0,2%<br><br>1             | 0,1542%<br><br>39 von 25.286     | 0,0%<br><br>0 von 139      |                                        |
| Todesfälle bei Operationen der Prostata durch die<br>Harnröhre bei bösartigen Erkrankungen                                   | Beobachtungswert<br><br>1  | 0,6955%<br><br>49 von 7.045      | 0,0%<br><br>0 von 29       |                                        |
| Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle<br>bei Behandlungsfällen mit Operation der Prostata<br>durch die Harnröhre | Beobachtungswert<br><br>1  | 3,5%<br><br>1.129 von 32.331     | 1,8%<br><br>3 von 168      |                                        |
| Behandlungsfälle mit Prostatakrebs als<br>Hauptdiagnose                                                                      | Mengeninformation<br><br>2 | 101,8 (23)<br><br>34.829         | 193                        |                                        |
| Todesfälle bei radikaler Prostataentfernung                                                                                  | <0,16%<br><br>1            | 0,1882%<br><br>24 von 12.755     | 0,0%<br><br>0 von 50       |                                        |
| <b>Nierensteine</b>                                                                                                          |                            |                                  |                            |                                        |
| Behandlungsfälle mit Nierensteinen als<br>Hauptdiagnose                                                                      | Mengeninformation<br><br>2 | 193,8 (47)<br><br>70.929         | 619                        |                                        |
| Anteil der Behandlungsfälle mit Intervention zur<br>Steinentfernung                                                          | Information<br><br>1       | 53,4%<br><br>37.870 von 70.929   | 55,9%<br><br>346 von 619   |                                        |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | <div>IQM<br/>Zielwert</div> <div><a href="#">Quelle</a></div> | <div>IQM<br/>Durchschnittswert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Ist-Wert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Erwartungs-<br/>wert</div> <div><a href="#">SMR</a></div> |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

Hautkrankheiten

Hautkrankheiten

|                                                             |                                           |                                       |                                  |  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| Behandlungsfälle mit Melanom als Hauptdiagnose              | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div> | <div>46,1 (5)</div> <div>13.053</div> | <div>n.a.</div> <div>&lt;4</div> |  |
| Behandlungsfälle mit Dermatitis und Ekzem als Hauptdiagnose | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div> | <div>33,2 (5)</div> <div>11.493</div> | <div>n.a.</div> <div>&lt;4</div> |  |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2023

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der**

**[Präambel](#)**

| IQM Indikatoren                                                                                                    | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert   | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                    | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a>   | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |
| <b>Intensivmedizin</b>                                                                                             |                        |                            |                          |                               |
| <b>Intensivmedizin</b>                                                                                             |                        |                            |                          |                               |
| Todesfälle bei Beatmung > 24 Stunden ohne<br>Neugeborene                                                           | Beobachtungswert<br>1  | 35,6%<br>33.011 von 92.799 | 45,7%<br>205 von 449     |                               |
| ECLS/ECMO - Herz- / Herz-Lungenunterstützung                                                                       | Mengeninformation<br>2 | 30,0 (11)<br>2.728         | n.a.<br><4               |                               |
| ECMO - Lungenunterstützung                                                                                         | Mengeninformation<br>2 | 19,1 (5)<br>1.991          | 23                       |                               |
| Todesfälle bei Beatmung > 24 Stunden ohne<br>Neugeborene und ohne COVID-19 Fälle                                   | <35,9%<br>1            | 35,0%<br>29.849 von 85.353 | 46,0%<br>193 von 420     |                               |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) als<br>Hauptdiagnose                                                        | < Erwartungswert<br>1  | 33,3%<br>10.295 von 30.870 | 31,6%<br>48 von 152      | 32,9%<br>0,96                 |
| davon Todesfälle bei Sepsis mit<br>Organversagen/Schock (als Hauptdiagnose)                                        | Beobachtungswert<br>1  | 35,6%<br>9.781 von 27.479  | 37,0%<br>47 von 127      |                               |
| davon Todesfälle bei Sepsis ohne<br>Organversagen/Schock (als Hauptdiagnose)                                       | Beobachtungswert<br>1  | 15,2%<br>514 von 3.391     | 4,0%<br>1 von 25         |                               |
| Todesfälle bei Sepsis (als Nebendiagnose)                                                                          | Beobachtungswert<br>1  | 37,9%<br>24.199 von 63.870 | 51,2%<br>105 von 205     |                               |
| davon Todesfälle bei Sepsis mit<br>Organversagen/Schock (als Nebendiagnose)                                        | Beobachtungswert<br>1  | 39,2%<br>23.621 von 60.313 | 54,5%<br>104 von 191     |                               |
| Anteil Todesfälle bei generalisierter<br>Entzündungsreaktion des gesamten Körpers ohne<br>Organkomplikation (SIRS) | Information<br>1       | 7,3%<br>3.659 von 49.942   | 10,2%<br>19 von 186      |                               |
| <b>Angeborene Gerinnungsstörung</b>                                                                                |                        |                            |                          |                               |
| Behandlungsfälle mit angeborenen<br>Gerinnungsstörungen                                                            | Mengeninformation<br>2 | 28,1 (14)<br>11.231        | 28                       |                               |
| davon operierte Behandlungsfälle (mit angeborenen<br>Gerinnungsstörungen)                                          | Mengeninformation<br>2 | 18,8 (9)<br>7.177          | 16                       |                               |
| <b>Obduktionen</b>                                                                                                 |                        |                            |                          |                               |
| Obduktionsrate                                                                                                     | Information<br>1       | 0,81%<br>1.377 von 169.507 | 0,98%<br>8 von 813       |                               |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                         | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                                         | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |
| Palliativmedizin                        |                        |                          |                          |                               |
| Palliativmedizin                        |                        |                          |                          |                               |
| Palliativmedizinische Komplexbehandlung | Mengeninformation      | 202,0 (133)              | 238                      |                               |
|                                         | 2                      | 46.252                   |                          |                               |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                                                | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |
| Roboterassistierte Eingriffe                   |                        |                          |                          |                               |
| Roboterassistierte Eingriffe                   |                        |                          |                          |                               |
| Urologische Eingriffe mittels Roboterchirurgie | Mengeninformation      | 142 (116)                | 67                       |                               |
|                                                | 2                      | 12.922                   |                          |                               |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | <div>IQM<br/>Zielwert</div> <div><a href="#">Quelle</a></div> | <div>IQM<br/>Durchschnittswert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Ist-Wert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Erwartungs-<br/>wert</div> <div><a href="#">SMR</a></div> |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                               |                                                                          |                                                                    |                                                                           |

COVID-19 Kennzahlen

COVID-19 Kennzahlen

|                                                                                        |                                     |                                                     |                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| Behandlungsfälle mit Testung auf COVID-19-Infektion                                    | <div>Information</div> <div>1</div> | <div>31,0%</div> <div>1.932.638 von 6.234.399</div> | <div>23,7%</div> <div>5.916 von 24.971</div> |  |
| Anteil positiver Virusnachweis auf COVID-19 von allen getesteten Behandlungsfällen     | <div>Information</div> <div>1</div> | <div>8,7%</div> <div>168.657 von 1.932.638</div>    | <div>10,6%</div> <div>629 von 5.916</div>    |  |
| COVID-19 positiver Virusnachweis von allen Behandlungsfällen                           | <div>Information</div> <div>1</div> | <div>2,7%</div> <div>168.657 von 6.234.399</div>    | <div>2,5%</div> <div>629 von 24.971</div>    |  |
| COVID-19 - Anteil von Behandlungsfällen ohne Virusnachweis                             | <div>Information</div> <div>1</div> | <div>0,3%</div> <div>15.596 von 6.234.399</div>     | <div>0,5%</div> <div>113 von 24.971</div>    |  |
| COVID-19 - Behandlungsfälle mit Virusnachweis und schweren akuten Atemwegserkrankungen | <div>Information</div> <div>1</div> | <div>33,8%</div> <div>57.036 von 168.657</div>      | <div>35,1%</div> <div>221 von 629</div>      |  |
| COVID-19 - Behandlungsfälle mit Virusnachweis und ausgewählten Vorerkrankungen         | <div>Information</div> <div>1</div> | <div>80,3%</div> <div>135.474 von 168.657</div>     | <div>76,9%</div> <div>484 von 629</div>      |  |
| COVID-19 - Mortalität bei Virusnachweis                                                | <div>Information</div> <div>1</div> | <div>8,7%</div> <div>14.592 von 168.657</div>       | <div>9,5%</div> <div>60 von 629</div>        |  |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2022

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der**

**[Präambel](#)**

IQM Indikatoren

IQM  
Zielwert

[Quelle](#)

IQM  
Durchschnittswert

[Fallzahl](#)

Klinik  
Ist-Wert

[Fallzahl](#)

Klinik  
Erwartungs-  
wert

[SMR](#)

## Herzerkrankungen

### Herzinfarkt

|                                                            |                  |                   |             |       |       |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|-------|-------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Herzinfarkt                   | < Erwartungswert | 7,9%              |             | 7,2%  | 7,5%  |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                              | 1                | 5.985 von 75.638  | 20 von 278  | 0,95  |       |
| Anteil der Herzinfarkte mit Linksherzkatheter              | Information      | 85,1%             |             | 96,0% |       |
|                                                            | 1                | 64.391 von 75.638 | 267 von 278 |       |       |
| Todesfälle bei Direktaufnahme ohne Verlegung               | Beobachtungswert | 7,8%              |             | 7,2%  |       |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                              | 1                | 5.373 von 68.448  | 17 von 235  |       |       |
| Anteil Transmuraler Herzinfarkte (STEMI)                   | Information      | 33,7%             |             | 43,1% |       |
|                                                            | 1                | 25.485 von 75.551 | 119 von 276 |       |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Transmuraler Herzinfarkt      | < Erwartungswert | 11,8%             |             | 9,2%  | 10,7% |
|                                                            | 1                | 3.015 von 25.485  | 11 von 119  |       |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Nichttransmuraler Herzinfarkt | < Erwartungswert | 5,4%              |             | 5,1%  | 5,6%  |
|                                                            | 1                | 2.685 von 49.354  | 8 von 157   |       |       |
| Todesfälle bei Nebendiagnose Herzinfarkt                   | Beobachtungswert | 19,8%             |             | 16,3% |       |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                              | 1                | 4.314 von 21.826  | 8 von 49    |       |       |

### Herzinsuffizienz

|                                                                                |                  |                    |            |       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------|-------|------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Herzinsuffizienz                                  | < Erwartungswert | 8,5%               |            | 9,9%  | 9,3% |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                  | 1                | 13.946 von 163.930 | 43 von 435 | 1,06  |      |
| Linksherzinsuffizienz, Anteil mit Beschwerden bereits im Ruhezustand (NYHA IV) | Information      | 49,1%              |            | 28,5% |      |
|                                                                                | 1                | 53.024 von 107.883 | 83 von 291 |       |      |

### Linksherzkatheter

|                                                                                                                                                                          |                   |                   |            |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------|------|
| Anzahl aller Linksherzkatheter zur Koronardiagnostik                                                                                                                     | Mengeninformation | 823,8 (670)       |            | 979  |      |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                                                                                            | 2                 | 281.748           |            |      |      |
| Todesfälle mit Linksherzkatheter bei Herzinfarkt, bezogen auf Behandlungsfälle mit Herzinfarkt und Linksherzkatheter                                                     | < Erwartungswert  | 6,3%              |            | 5,6% | 6,0% |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                                                                                            | 1                 | 3.997 von 63.021  | 15 von 267 | 0,94 |      |
| Behandlungsfälle mit diagnostischem Linksherzkatheter bei allen Erkrankungen (oder Z.n. Reanimation), ohne Hauptdiagnose Herzinfarkt und ohne Herz-OP, Anteil Todesfälle | <1,6%             | 1,7%              |            | 4,2% |      |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                                                                                            | 1                 | 2.173 von 129.883 | 17 von 405 |      |      |
| Behandlungsfälle mit therapeutischem Linksherzkatheter ohne Hauptdiagnose Herzinfarkt und ohne Herz-OP, Anteil Todesfälle                                                | Beobachtungswert  | 1,9%              |            | 3,4% |      |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                                                                                            | 1                 | 1.454 von 75.776  | 10 von 295 |      |      |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2022

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

| IQM Indikatoren                                                                                               | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert    | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                               | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a>    | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |
| Anteil der Behandlungen mit therapeutischem Linksherzkatheter ohne Hauptdiagnose Herzinfarkt und ohne Herz-OP |                        |                             |                          |                               |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                                 | Information<br>1       | 36,8%<br>75.776 von 205.659 | 42,1%<br>295 von 700     |                               |
| Herzrhythmusstörungen                                                                                         |                        |                             |                          |                               |
| Behandlungsfälle mit Herzrhythmusstörungen als Hauptdiagnose                                                  | Mengeninformation<br>2 | 440,0 (291)<br>173.349      | 738                      |                               |
| Schrittmacher/Defibrillator Implantation                                                                      |                        |                             |                          |                               |
| Implantation eines Herzschrittmachers/Defibrillators                                                          | Mengeninformation<br>2 | 145,8 (101)<br>49.587       | 188                      |                               |
| davon Einsatz oder Wechsel von Defibrillatoren                                                                | Mengeninformation<br>2 | 51,7 (34)<br>13.491         | 57                       |                               |
| Ablative Therapie                                                                                             |                        |                             |                          |                               |
| Behandlungsfälle mit kathetergestützter ablativer Therapie                                                    | Mengeninformation<br>2 | 243,3 (167)<br>46.966       | 148                      |                               |
| davon Vorhofablation bei Vorhofflimmern/-flattern, Anteil Todesfälle                                          | Information<br>1       | 0,0988%<br>29 von 29.358    | 0,0%<br>0 von 88         |                               |
| Operationen am Herzen                                                                                         |                        |                             |                          |                               |
| Behandlungsfälle mit Herzoperationen                                                                          | Mengeninformation<br>2 | 237,9 (11)<br>47.827        | 38                       |                               |
| davon Herzklappenoperation                                                                                    | Mengeninformation<br>2 | 272,2 (36)<br>32.659        | 36                       |                               |
| davon andere Operationen am Herzen                                                                            | Mengeninformation<br>2 | 49,1 (3)<br>8.389           | n.a.<br><4               |                               |
| Todesfälle bei minimalinvasivem Eingriff (endovaskulär/transapikal) der Mitralklappe                          | Beobachtungswert<br>1  | 2,8%<br>122 von 4.302       | 0,0%<br>0 von 28         |                               |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2022

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungs-wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>    |

## Erkrankungen des Nervensystems und Schlaganfall

### Bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhaut

|                                                                         |                   |          |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----|--|
| Bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhäute als Hauptdiagnose | Mengeninformation | 32,9 (7) | 22 |  |
|                                                                         | 2                 | 9.175    |    |  |

### Todesfälle bei Hauptdiagnose Schlaganfall

|                                               |                  |                    |             |  |
|-----------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------|--|
| Todesfälle bei allen Formen des Schlaganfalls | Beobachtungswert | 10,5%              | 14,1%       |  |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                 | 1                | 11.413 von 108.989 | 115 von 814 |  |

### Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirninfarkt

|                               |                  |                  |            |  |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------|--|
| Todesfälle bei Hirninfarkt    | Beobachtungswert | 7,8%             | 11,6%      |  |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre | 1                | 7.299 von 93.757 | 82 von 707 |  |

|                                                                                       |             |                   |             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--|
| Anteil der Hirninfarkte mit medikamentöser Auflösung des Blutgerinnsels (Thrombolyse) | Information | 16,0%             | 20,9%       |  |
|                                                                                       | 1           | 14.996 von 93.757 | 148 von 707 |  |

|                                                                                          |                  |                  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|--|
| Todesfälle bei Hirninfarkt mit medikamentöser Auflösung des Blutgerinnsels (Thrombolyse) | Beobachtungswert | 7,6%             | 8,8%       |  |
|                                                                                          | 1                | 1.144 von 14.996 | 13 von 148 |  |

|                                                                                          |             |                  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------|--|
| Anteil der Hirninfarkte mit Entfernung des Blutgerinnsels durch Katheter (Thrombektomie) | Information | 9,5%             | 9,2%       |  |
|                                                                                          | 1           | 8.900 von 93.757 | 65 von 707 |  |

|                                                                                             |                  |                 |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|--|
| Todesfälle bei Hirninfarkt mit Entfernung des Blutgerinnsels durch Katheter (Thrombektomie) | Beobachtungswert | 20,6%           | 24,6%     |  |
|                                                                                             | 1                | 1.835 von 8.900 | 16 von 65 |  |

|                                              |                  |                  |             |  |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|--|
| Anteil der Hirninfarkte mit Lungenentzündung | Beobachtungswert | 9,9%             | 15,6%       |  |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                | 1                | 9.318 von 93.757 | 110 von 707 |  |

|                                                 |                  |                 |            |  |
|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------|--|
| Todesfälle bei Hirninfarkt mit Lungenentzündung | Beobachtungswert | 30,9%           | 37,3%      |  |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                   | 1                | 2.883 von 9.318 | 41 von 110 |  |

### Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirnblutung

|                                            |                  |                  |           |  |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|--|
| Todesfälle bei Hirnblutung (intrazerebral) | Beobachtungswert | 29,6%            | 34,5%     |  |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre              | 1                | 3.402 von 11.485 | 29 von 84 |  |

|                                             |                  |               |          |  |
|---------------------------------------------|------------------|---------------|----------|--|
| Todesfälle bei Hirnblutung (subarachnoidal) | Beobachtungswert | 19,6%         | 17,4%    |  |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre               | 1                | 682 von 3.480 | 4 von 23 |  |

|                                              |        |                 |           |  |
|----------------------------------------------|--------|-----------------|-----------|--|
| Anteil nicht näher bezeichneter Schlaganfall | <0,42% | 0,24%           | 0,0%      |  |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                | 1      | 267 von 108.989 | 0 von 814 |  |

|                    |                  |                |           |  |
|--------------------|------------------|----------------|-----------|--|
| Todesfälle bei TIA | Beobachtungswert | 0,3673%        | 0,4515%   |  |
|                    | 1                | 129 von 35.124 | 2 von 443 |  |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2022

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der****[Präambel](#)**

| IQM Indikatoren                                                                                                                   | IQM<br>Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> | IQM<br>Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert<br><a href="#">SMR</a> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   |                                           |                                                      |                                                |                                                      |
| Behandlung auf einer Stroke Unit                                                                                                  |                                           |                                                      |                                                |                                                      |
| Behandlungsfälle mit neurologischer oder anderer<br>Komplexbehandlung                                                             | Mengeninformation<br>2                    | 465,1 (460)<br>102.778                               | 1.161                                          |                                                      |
| Hirnfarkte mit neurologischer oder anderer<br>Komplexbehandlung                                                                   | Information<br>1                          | 73,8%<br>69.165 von 93.757                           | 90,4%<br>639 von 707                           |                                                      |
| TIA mit neurologischer oder anderer<br>Komplexbehandlung                                                                          | Information<br>1                          | 67,0%<br>23.550 von 35.124                           | 85,8%<br>380 von 443                           |                                                      |
| Hirnfarkt oder TIA mit neurologischer oder<br>anderer Komplexbehandlung ohne Zuverlegungen<br>(in Anlehnung Schlaganfallregister) | Information<br>1                          | 73,3%<br>88.991 von 121.439                          | 90,2%<br>970 von 1.075                         |                                                      |
| Hirnfarkt oder TIA mit neurologischer oder<br>anderer Komplexbehandlung nur Zuverlegungen (in<br>Anlehnung Schlaganfallregister)  | Information<br>1                          | 50,0%<br>3.724 von 7.442                             | 65,3%<br>49 von 75                             |                                                      |
| Epilepsie                                                                                                                         |                                           |                                                      |                                                |                                                      |
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Epilepsie<br>Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                     | Mengeninformation<br>2                    | 110,7 (35)<br>40.505                                 | 270                                            |                                                      |
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Epilepsie<br>Alle Patient:innen < 20 Jahre                                                     | Mengeninformation<br>2                    | 51,0 (16)<br>11.010                                  | 53                                             |                                                      |
| Multiple Sklerose                                                                                                                 |                                           |                                                      |                                                |                                                      |
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Multiple<br>Sklerose                                                                           | Mengeninformation<br>2                    | 39,1 (27)<br>9.657                                   | 87                                             |                                                      |

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | <div>IQM Zielwert</div> <div><a href="#">Quelle</a></div> | <div>IQM Durchschnittswert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik Ist-Wert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik Erwartungs-wert</div> <div><a href="#">SMR</a></div> |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                           |                                                                      |                                                                |                                                                  |

Altersmedizin

Geriatrische Frührehabilitation

|                                                       |                                           |                                          |                |  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--|
| Behandlungsfälle mit geriatrischer Frührehabilitation | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div> | <div>410,3 (328)</div> <div>99.293</div> | <div>457</div> |  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--|

Mangelernährung bei Älteren

|                                                                                        |                                     |                                                  |                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| Behandlungsfälle mit erheblicher Mangelernährung, >= 65 Jahre und ohne Tumorerkrankung | <div>Information</div> <div>1</div> | <div>0,94%</div> <div>22.614 von 2.406.736</div> | <div>0,52%</div> <div>45 von 8.678</div> |  |
| Behandlungsfälle mit Sondenernährung/Infusionsernährung                                | <div>Information</div> <div>1</div> | <div>2,0%</div> <div>448 von 22.614</div>        | <div>2,2%</div> <div>1 von 45</div>      |  |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2022

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der****[Präambel](#)**

IQM Indikatoren

IQM  
Zielwert[Quelle](#)IQM  
Durchschnittswert[Fallzahl](#)Klinik  
Ist-Wert[Fallzahl](#)Klinik  
Erwartungs-  
wert[SMR](#)

## Lungenerkrankungen

### Lungenentzündung (Pneumonie)

|                                                                                                |                  |                    |            |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------|-------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung                                                  | < Erwartungswert | 15,3%              | 14,8%      | 16,3% |
| alle Altersgruppen                                                                             | 1                | 20.967 von 137.340 | 80 von 539 |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung ohne Zuverlegung, Tumor, Mukoviszidose           | < Erwartungswert | 14,1%              | 13,7%      | 15,5% |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                  | 1                | 11.884 von 84.192  | 51 von 373 |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung ohne Zuverlegung, Tumor, Mukoviszidose, COVID-19 | < Erwartungswert | 10,9%              | 16,8%      | 12,8% |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                  | 1                | 5.654 von 51.812   | 27 von 161 | 1,31  |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung ohne Zuverlegung, Tumor, Mukoviszidose           | Beobachtungswert | 0,44%              | 0,0%       |       |
| Alle Patient:innen < 20 Jahre                                                                  | 1                | 47 von 10.734      | 0 von 48   |       |
| Todesfälle bei Lungenentzündung durch Aspiration von Nahrungsmitteln oder Mageninhalt          | Beobachtungswert | 29,9%              | 32,0%      |       |
|                                                                                                | 1                | 3.776 von 12.646   | 8 von 25   |       |
| Todesfälle bei Bronchitis oder Bronchiolitis ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose          | < Erwartungswert | 2,2%               | 2,1%       | 2,3%  |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                  | 1                | 236 von 10.758     | 1 von 47   |       |

### COPD (Chronisch obstruktive Lungenerkrankung)

|                               |                  |                  |            |      |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------|------|
| Todesfälle bei COPD           | < Erwartungswert | 5,3%             | 4,7%       | 5,2% |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre | 1                | 3.285 von 61.769 | 12 von 256 | 0,90 |

### Lungenkrebs

|                                                |                   |            |     |  |
|------------------------------------------------|-------------------|------------|-----|--|
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Lungenkrebs | Mengeninformation | 182,0 (47) | 462 |  |
|                                                | 2                 | 69.723     |     |  |

### Operationen an der Lunge

|                                                                                         |                  |                |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------|--|
| Todesfälle bei größeren operativen Entfernungen von Lunge/Bronchien                     | Beobachtungswert | 2,5%           | 2,1%     |  |
|                                                                                         | 1                | 317 von 12.920 | 2 von 94 |  |
| Todesfälle bei operativer Entfernung eines Lungenflügels bei Lungenkrebs                | Beobachtungswert | 8,7%           | n.a.     |  |
|                                                                                         | 1                | 22 von 252     | <4       |  |
| Todesfälle bei operativer Teilentfernung eines Lungenflügels bei Lungenkrebs            | <2,0%            | 2,1%           | 0,0%     |  |
|                                                                                         | 1                | 121 von 5.698  | 0 von 36 |  |
| Anteil der operativen Entfernungen eines Lungenflügels bei Lungenkrebsbehandlungsfällen | <20%             | 4,2%           | 2,7%     |  |
|                                                                                         | 1 / 3            | 252 von 5.950  | 1 von 37 |  |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2022

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                                                       | <div>IQM<br/>Zielwert</div> <div><a href="#">Quelle</a></div> | <div>IQM<br/>Durchschnittswert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Ist-Wert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Erwartungs-<br/>wert</div> <div><a href="#">SMR</a></div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                       |                                                               |                                                                          |                                                                    |                                                                           |
| Anteil der bronchioangioplastischen Entfernungen eines Lungenflügels bei Lungenkrebsbehandlungsfällen | <div>Beobachtungswert</div> <div>1</div>                      | <div>7,6%</div> <div>435 von 5.698</div>                                 | <div>0,0%</div> <div>0 von 36</div>                                |                                                                           |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2022

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

IQM Indikatoren

 IQM  
Zielwert

[Quelle](#)

 IQM  
Durchschnittswert

[Fallzahl](#)

 Klinik  
Ist-Wert

[Fallzahl](#)

 Klinik  
Erwartungs-  
wert

[SMR](#)

## Erkrankungen der Bauchorgane

### Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen

|                                                                    |                  |                   |             |  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|--|
| Anteil laparoskopische Operationen                                 | >95,1%           | 95,1%             | 85,6%       |  |
|                                                                    | 1                | 48.890 von 51.424 | 172 von 201 |  |
| Anteil Umsteiger auf offene Operationen                            | Beobachtungswert | 2,9%              | 9,5%        |  |
|                                                                    | 1                | 1.508 von 51.424  | 19 von 201  |  |
| Anteil Todesfälle bei Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen | <0,6%            | 0,5853%           | 0,4975%     |  |
|                                                                    | 1                | 301 von 51.424    | 1 von 201   |  |

### Operation von Leisten-, Schenkel- und Nabelbrüchen (Hernien)

|                                                               |                  |                   |             |  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|--|
| Todesfälle bei Bruchoperationen ohne anteilige Darmentfernung | <0,12%           | 0,1279%           | 1,3274%     |  |
|                                                               | 1                | 87 von 68.044     | 3 von 226   |  |
| Todesfälle bei Bruchoperationen mit anteiliger Darmentfernung | Beobachtungswert | 2,3%              | 6,9%        |  |
|                                                               | 1                | 157 von 6.797     | 2 von 29    |  |
| Anteil Leistenbruchoperationen mit Netz                       | Information      | 10,4%             | 5,9%        |  |
| Alle Patient:innen < 20 Jahre                                 | 1                | 282 von 2.714     | 1 von 17    |  |
| Anteil Leistenbruchoperationen mit Netz                       | Information      | 98,1%             | 98,5%       |  |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                 | 1                | 46.312 von 47.185 | 130 von 132 |  |

### Eingriffe an der Schilddrüse

|                                                                      |                   |               |          |  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------|--|
| Operative Entfernung der Schilddrüse                                 | Mengeninformation | 55,6 (20)     | 102      |  |
|                                                                      | 2                 | 17.020        |          |  |
| davon operative Entfernung der Schilddrüse bei Schilddrüsenkrebs     | Mengeninformation | 11,0 (4)      | 14       |  |
|                                                                      | 2                 | 2.437         |          |  |
| davon operative Entfernung der Schilddrüse bei gutartiger Erkrankung | Mengeninformation | 47,1 (20)     | 81       |  |
|                                                                      | 2                 | 13.673        |          |  |
| Anteil der Beatmungsfälle (> 24 Std.) nach Schilddrüseneingriff      | Information       | 0,54%         | 2,13%    |  |
|                                                                      | 1                 | 87 von 16.082 | 2 von 94 |  |
| Behandlungsfälle mit Radiojodtherapie                                | Mengeninformation | 199,8 (174)   | 400      |  |
|                                                                      | 2                 | 8.393         |          |  |

### Große Operationen am Dick- und Enddarm (Kolon und Rektum)

|                                                         |                   |            |     |  |
|---------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----|--|
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Dick-/Enddarmkrebs   | Mengeninformation | 123,9 (85) | 282 |  |
|                                                         | 2                 | 47.195     |     |  |
| Behandlungsfälle mit Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn | Mengeninformation | 90,4 (58)  | 132 |  |
|                                                         | 2                 | 37.321     |     |  |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2022

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                                                              | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    |                  | Klinik Ist-Wert          |            | Klinik Erwartungs-wert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------|------------------------|
|                                                                                                              | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> |                  | <a href="#">Fallzahl</a> |            | <a href="#">SMR</a>    |
| Todesfälle bei operativer Entfernung des Dick-/Enddarms                                                      | Beobachtungswert<br>1  | 8,1%                     | 2.983 von 36.751 | 13,0%                    | 28 von 215 |                        |
| Todesfälle bei operativer Dickdarmentfernung bei Krebs, ohne komplizierende Diagnose                         | <4,1%<br>1             | 4,1%                     | 377 von 9.128    | 8,0%                     | 4 von 50   |                        |
| Todesfälle bei operativer Dickdarmentfernung bei Krebs, mit komplizierender Diagnose                         | Beobachtungswert<br>1  | 11,2%                    | 308 von 2.740    | 0,0%                     | 0 von 11   |                        |
| Todesfälle bei operativer Enddarmentfernung bei Krebs                                                        | <3,2%<br>1             | 2,8%                     | 119 von 4.274    | 8,3%                     | 2 von 24   |                        |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Divertikel, ohne Abszess/Perforation               | <0,72%<br>1            | 0,4585%                  | 9 von 1.963      | 0,0%                     | 0 von 14   |                        |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Divertikel, mit Abszess/Perforation                | Beobachtungswert<br>1  | 5,5%                     | 266 von 4.870    | 3,4%                     | 1 von 29   |                        |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Darmischämie                                       | Information<br>1       | 45,0%                    | 978 von 2.172    | 81,3%                    | 13 von 16  |                        |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Colitis oder Crohn                                 | Beobachtungswert<br>1  | 3,1%                     | 58 von 1.881     | 14,3%                    | 1 von 7    |                        |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei anderen Diagnosen                                  | Information<br>1       | 8,9%                     | 868 von 9.723    | 10,9%                    | 7 von 64   |                        |
| Anteil operative Leberentfernung bei Entfernung des Dick-/Enddarms bei Dick- und Enddarmkrebs                | Information<br>1       | 4,8%                     | 777 von 16.142   | 8,2%                     | 7 von 85   |                        |
| Erkrankungen des Magens                                                                                      |                        |                          |                  |                          |            |                        |
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Magenkrebs (mit und ohne Magenoperation)                                  | Mengeninformation<br>2 | 44,3 (25)                | 16.000           | 106                      |            |                        |
| Todesfälle bei Geschwüren an Magen, Zwölffingerdarm oder Dünndarm als Hauptdiagnose (mit und ohne Operation) | Beobachtungswert<br>1  | 5,7%                     | 1.101 von 19.463 | 9,9%                     | 7 von 71   |                        |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2022

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                                       | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                                                                                       | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |
| Magenentfernungen                                                                     | Mengeninformation<br>2 | 32,5 (11)<br>9.945       | 21                       |                               |
| Todesfälle bei operativer Magenentfernung bei Magenkrebs (exkl. Speiseröhre)          | Beobachtungswert<br>1  | 5,6%<br>116 von 2.072    | 0,0%<br>0 von 9          |                               |
| Todesfälle bei operativer Magenentfernung kombiniert mit Speiseröhreneingriff         | Beobachtungswert<br>1  | 17,7%<br>41 von 232      | 40,0%<br>2 von 5         |                               |
| Todesfälle bei partieller und totaler operativer Magenentfernung bei anderer Diagnose | Beobachtungswert<br>1  | 3,7%<br>280 von 7.641    | 42,9%<br>3 von 7         |                               |
| Adipositaschirurgie                                                                   |                        |                          |                          |                               |
| Todesfälle im Rahmen der Adipositaschirurgie                                          | Beobachtungswert<br>1  | 0,0561%<br>6 von 10.701  | n.a.<br><4               |                               |
| Eingriffe an der Speiseröhre (Ösophagus)                                              |                        |                          |                          |                               |
| Todesfälle bei komplexen Eingriffen an der Speiseröhre                                | Beobachtungswert<br>1  | 8,1%<br>139 von 1.706    | 15,0%<br>3 von 20        |                               |
| Eingriffe an der Bauchspeicheldrüse (Pankreas)                                        |                        |                          |                          |                               |
| Todesfälle bei Eingriffen an der Bauchspeicheldrüse ohne Transplantation              | Beobachtungswert<br>1  | 8,8%<br>426 von 4.827    | 16,7%<br>5 von 30        |                               |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                         |                        |                          |                          |                               |
| Todesfälle bei operativer Bauchspeicheldrüsenentfernung bei Bauchspeicheldrüsenkrebs  | Beobachtungswert<br>1  | 7,2%<br>200 von 2.793    | 18,2%<br>2 von 11        |                               |
| Anatomische Leberentfernung, Anteil Todesfälle                                        | Beobachtungswert<br>1  | 7,1%<br>192 von 2.723    | 5,9%<br>1 von 17         |                               |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                         |                        |                          |                          |                               |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2022

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der**
**[Präambel](#)**

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert |  | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--|--------------------------|-------------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> |  | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |

## Gefäßoperationen

### Operationen der Halsschlagader (Carotis)

|                                                                                                                        |                   |           |           |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|----------|--|
| Todesfälle bei Operation der Halsschlagader, nur extrakranielle Operationen                                            | <1,09%            | 1,1%      |           | 3,85%    |  |
|                                                                                                                        | 1                 | 100       | von 9.073 | 2 von 52 |  |
| Todesfälle bei Implantation von Stents in die Halsschlagader, nur extrakranielle Gefäße                                | <2,2%             | 2,6%      |           | 10,0%    |  |
|                                                                                                                        | 1                 | 60        | von 2.325 | 1 von 10 |  |
| Todesfälle bei extrakraniellen Gefäßoperationen bei Herz-, Aorten- oder Beinarterienoperationen, Trauma oder HNO-Tumor | Beobachtungswert  | 15,2%     |           | 42,9%    |  |
|                                                                                                                        | 1                 | 237       | von 1.557 | 3 von 7  |  |
| Intrakranielle perkutan-transluminale Gefäßinterventionen                                                              | Mengeninformation | 90,2 (42) |           | 73       |  |
|                                                                                                                        | 2                 | 13.897    |           |          |  |

### Eingriffe an der Hauptschlagader

|                                                                                                |                   |           |           |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|----------|--|
| Operationen an der Hauptschlagader (Aorta)                                                     | Mengeninformation | 48,4 (27) |           | 35       |  |
|                                                                                                | 2                 | 9.532     |           |          |  |
| Operationen Ersatz der Baucha Schlagader                                                       | Mengeninformation | 26,3 (23) |           | 35       |  |
|                                                                                                | 2                 | 5.071     |           |          |  |
| Todesfälle bei offener Operation eines nicht rupturierten Bauchaortenaneurysmas                | <7,6%             | 6,2%      |           | 16,7%    |  |
|                                                                                                | 1                 | 46        | von 740   | 1 von 6  |  |
| Todesfälle bei endovaskulärer Stentimplantation eines nicht rupturierten Bauchaortenaneurysmas | <1,4%             | 1,5%      |           | 5,3%     |  |
|                                                                                                | 1                 | 44        | von 2.906 | 1 von 19 |  |
| Todesfälle bei Operation der Bauchaorta, nicht bei Aneurysma                                   | Beobachtungswert  | 8,7%      |           | 16,7%    |  |
|                                                                                                | 1                 | 44        | von 508   | 1 von 6  |  |
| Todesfälle bei endovaskulärer Stentimplantation der Bauchaorta, nicht bei Aneurysma            | Beobachtungswert  | 6,7%      |           | n.a.     |  |
|                                                                                                | 1                 | 24        | von 357   | <4       |  |
| Todesfälle bei rupturiertem Aortenaneurysma                                                    | Information       | 42,2%     |           | 50,0%    |  |
|                                                                                                | 1                 | 761       | von 1.804 | 2 von 4  |  |
| davon Todesfälle bei Operation eines rupturierten Aortenaneurysmas                             | Information       | 32,6%     |           | n.a.     |  |
|                                                                                                | 1                 | 305       | von 937   | <4       |  |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2022

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

| IQM Indikatoren                                                                                             | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                             | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |
| Operationen der Becken-/Bein-Arterien                                                                       |                        |                          |                          |                               |
| Todesfälle bei Operationen der Becken-/Beinarterien                                                         | Information<br>1       | 6,2%<br>1.717 von 27.918 | 10,8%<br>16 von 148      |                               |
| davon Todesfälle bei Schaufensterkrankheit (Claudicatio)                                                    | <0,33%<br>1            | 0,2376%<br>13 von 5.472  | 4,5455%<br>1 von 22      |                               |
| davon Todesfälle bei Ruheschmerz                                                                            | <2,3%<br>1             | 1,8%<br>40 von 2.163     | 0,0%<br>0 von 7          |                               |
| davon Todesfälle bei Ulzeration/Gangrän                                                                     | <4,5%<br>1             | 3,9%<br>135 von 3.479    | 0,0%<br>0 von 8          |                               |
| PTA (Perkutan transluminale Gefäßinterventionen)                                                            |                        |                          |                          |                               |
| Behandlungsfälle mit Wiedereröffnung eines verschlossenen Gefäßes mittels Ballonkatheter, Anteil Todesfälle | Beobachtungswert<br>1  | 3,1%<br>1.770 von 57.458 | 6,2%<br>12 von 194       |                               |
| PTA Abdomen/Beinarterien mit arterieller Operation im gleichen stationären Aufenthalt                       | Mengeninformation<br>2 | 43,9 (37)<br>9.835       | 34                       |                               |
| Arteriovenöser Shunt                                                                                        |                        |                          |                          |                               |
| Anlegen eines arteriovenösen Shunts                                                                         | Mengeninformation<br>2 | 30,2 (18)<br>5.976       | 13                       |                               |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2022

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der**
**[Präambel](#)**

IQM Indikatoren

 IQM  
Zielwert

[Quelle](#)

 IQM  
Durchschnittswert

[Fallzahl](#)

 Klinik  
Ist-Wert

[Fallzahl](#)

 Klinik  
Erwartungs-  
wert

[SMR](#)

## Frauenheilkunde und Geburtshilfe

### Geburtshilfe

|                                                                                             |                  |                             |                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|--|
| Mütterliche Todesfälle bei der Geburt                                                       | <0,005%<br>1     | 0,005%<br>13 von 258.566    | 0,0%<br>0 von 1.268    |  |
| Anteil vaginale Geburten mit Dammriss 3. und 4. Grades                                      | <2,0%<br>1       | 1,9%<br>3.340 von 174.150   | 1,7%<br>13 von 779     |  |
| Anteil vaginale Geburten mit Dammschnitt                                                    | Information<br>1 | 10,5%<br>18.240 von 174.150 | 13,2%<br>103 von 779   |  |
| Kaiserschnitttrate, Anteil an allen Geburten                                                | Information<br>1 | 32,6%<br>84.416 von 258.566 | 38,6%<br>489 von 1.268 |  |
| Anteil sanfter Kaiserschnitt (nach Misgav-Ladach), Anteil an allen Kaiserschnittoperationen | Information<br>1 | 77,6%<br>65.482 von 84.416  | 0,0%<br>0 von 489      |  |
| Anteil Kaiserschnitte bei risikoarmer Geburt                                                | Information<br>1 | 27,1%<br>61.272 von 225.689 | 33,2%<br>357 von 1.076 |  |
| davon Anteil Kaiserschnitte bei risikoarmer Geburt                                          | Information<br>1 | 25,1%<br>41.933 von 167.210 | 31,6%<br>261 von 825   |  |
| Alle Patient:innen < 35 Jahre                                                               |                  |                             |                        |  |
| davon Anteil Kaiserschnitte bei risikoarmer Geburt                                          | Information<br>1 | 33,1%<br>19.339 von 58.479  | 38,2%<br>96 von 251    |  |
| Alle Patient:innen > 34 Jahre                                                               |                  |                             |                        |  |

### Neugeborene

|                                                         |                        |                     |            |  |
|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------|--|
| Neugeborene mit Gewicht < 1.250 Gramm                   | Mengeninformation<br>2 | 24,8 (24)<br>2.475  | 16         |  |
| davon Neugeborene mit Gewicht < 500 Gramm               | Mengeninformation<br>2 | 3,7 (3)<br>265      | n.a.<br><4 |  |
| davon Neugeborene mit Gewicht von 500 bis 749 Gramm     | Mengeninformation<br>2 | 7,4 (7)<br>587      | 6          |  |
| davon Neugeborene mit Gewicht von 750 bis 999 Gramm     | Mengeninformation<br>2 | 9,7 (9)<br>770      | 5          |  |
| davon Neugeborene mit Gewicht von 1.000 bis 1.249 Gramm | Mengeninformation<br>2 | 9,2 (9)<br>853      | 4          |  |
| Neugeborene mit Gewicht von 1.250 bis 1.499 Gramm       | Mengeninformation<br>2 | 11,6 (9)<br>1.195   | 4          |  |
| Neugeborene mit Gewicht von 1.500 bis 2.499 Gramm       | Mengeninformation<br>2 | 73,6 (28)<br>16.113 | 79         |  |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2022

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

| IQM Indikatoren                                                                                                             | IQM<br>Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> | IQM<br>Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert<br><a href="#">SMR</a> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                             |                                           |                                                      |                                                |                                                      |
| Neugeborene mit Gewicht > 2.500 Gramm                                                                                       | Mengeninformation<br>2                    | 1124,0 (863)<br>256.276                              | 1.239                                          |                                                      |
| <b>Frauenheilkunde</b>                                                                                                      |                                           |                                                      |                                                |                                                      |
| Todesfälle bei operativer Entfernung der Gebärmutter bei gutartigen Erkrankungen                                            | <0,04%                                    | 0,0731%                                              | 1,1494%                                        |                                                      |
| Alle Patient:innen > 14 Jahre                                                                                               | 1                                         | 15 von 20.527                                        | 1 von 87                                       |                                                      |
| Anteil der Behandlungsfälle mit vaginaler/laparoskopischer Gebärmutterentfernung, ohne plastische Operation                 | >88,4%                                    | 88,6%                                                | 85,1%                                          |                                                      |
|                                                                                                                             | 1                                         | 18.069 von 20.383                                    | 74 von 87                                      |                                                      |
| Anteil der Behandlungsfälle mit vaginaler Gebärmutterentfernung, ohne plastische Operation                                  | Information                               | 30,0%                                                | 36,8%                                          |                                                      |
|                                                                                                                             | 1                                         | 6.108 von 20.383                                     | 32 von 87                                      |                                                      |
| Anteil der Behandlungsfälle mit vaginaler Entfernung durch Zerkleinerung der Gebärmutter                                    | Information                               | 6,1%                                                 | 6,3%                                           |                                                      |
|                                                                                                                             | 1                                         | 374 von 6.108                                        | 2 von 32                                       |                                                      |
| Anteil der Behandlungsfälle mit laparoskopischer Gebärmutterentfernung, ohne plastische Operation                           | Information                               | 58,7%                                                | 48,3%                                          |                                                      |
|                                                                                                                             | 1                                         | 11.961 von 20.383                                    | 42 von 87                                      |                                                      |
| Anteil der Behandlungsfälle mit laparoskopischer Entfernung durch Zerkleinerung der Gebärmutter                             | Information                               | 26,2%                                                | 26,2%                                          |                                                      |
|                                                                                                                             | 1                                         | 3.137 von 11.961                                     | 11 von 42                                      |                                                      |
| Anteil der Behandlungsfälle mit Gebärmutterentfernung und Eierstockentfernung bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose | Information                               | 6,5%                                                 | 10,0%                                          |                                                      |
| Alle Patient:innen < 50 Jahre                                                                                               | 1                                         | 444 von 6.799                                        | 2 von 20                                       |                                                      |
| Anteil der Behandlungsfälle mit Gebärmutterentfernung und Eierstockentfernung bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose | Information                               | 31,5%                                                | 53,8%                                          |                                                      |
| Alle Patient:innen > 49 Jahre                                                                                               | 1                                         | 2.506 von 7.964                                      | 21 von 39                                      |                                                      |
| <b>Bösartige Neubildungen der Brust und der weiblichen Geschlechtsorgane</b>                                                |                                           |                                                      |                                                |                                                      |
| Behandlungsfälle mit Krebserkrankung der Brust oder der Geschlechtsorgane als Hauptdiagnose                                 | Mengeninformation                         | 197,6 (62)                                           | 276                                            |                                                      |
|                                                                                                                             | 2                                         | 74.481                                               |                                                |                                                      |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2022

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                     | <div>IQM<br/>Zielwert</div> <div><a href="#">Quelle</a></div> | <div>IQM<br/>Durchschnittswert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Ist-Wert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Erwartungs-<br/>wert</div> <div><a href="#">SMR</a></div> |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |                                                               |                                                                          |                                                                    |                                                                           |
| Behandlungsfälle mit Eierstockkrebs als<br>Hauptdiagnose            | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div>                     | <div>29,7 (12)</div> <div>9.543</div>                                    | <div>52</div>                                                      |                                                                           |
| Todesfälle nach Eierstockentfernung bei<br>Eierstockkrebs           | <div>Beobachtungswert</div> <div>1</div>                      | <div>1,5%</div> <div>37 von 2.550</div>                                  | <div>0,0%</div> <div>0 von 15</div>                                |                                                                           |
| Behandlungsfälle mit Gebärmutterkrebs als<br>Hauptdiagnose          | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div>                     | <div>49,4 (29)</div> <div>15.355</div>                                   | <div>42</div>                                                      |                                                                           |
| Todesfälle nach Gebärmutterentfernung bei<br>Gebärmutterkrebs       | <div>Beobachtungswert</div> <div>1</div>                      | <div>0,75%</div> <div>45 von 5.973</div>                                 | <div>0,0%</div> <div>0 von 21</div>                                |                                                                           |
| Behandlungsfälle mit Brustkrebs als Hauptdiagnose                   | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div>                     | <div>124,8 (32)</div> <div>45.185</div>                                  | <div>162</div>                                                     |                                                                           |
| Eingriffe an der Brust                                              |                                                               |                                                                          |                                                                    |                                                                           |
| Eingriffe an der Brust                                              | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div>                     | <div>151,2 (108)</div> <div>39.303</div>                                 | <div>110</div>                                                     |                                                                           |
| Operationen der Brust bei Brustkrebs                                | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div>                     | <div>135,6 (113)</div> <div>29.027</div>                                 | <div>97</div>                                                      |                                                                           |
| Anteil brusterhaltender Operationen bei Brustkrebs                  | <div>Information</div> <div>1</div>                           | <div>72,4%</div> <div>21.021 von 29.027</div>                            | <div>57,7%</div> <div>56 von 97</div>                              |                                                                           |
| Eingriffe am Beckenboden bei der Frau                               |                                                               |                                                                          |                                                                    |                                                                           |
| Beckenbodenoperationen mit und ohne plastische<br>Operation, gesamt | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div>                     | <div>61,3 (43)</div> <div>17.175</div>                                   | <div>58</div>                                                      |                                                                           |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2022

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungswert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>   |

## Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe

### Bösartige Neubildungen des Bewegungsapparates

Behandlungsfälle mit bösartiger Neubildung an Knochen, Gelenkknorpel, peripheren Nerven, Retroperitoneum, Bindegewebe, Weichteilen

|                   |          |   |  |
|-------------------|----------|---|--|
| Mengeninformation | 42,4 (5) | 7 |  |
| 2                 | 14.286   |   |  |

### Gelenkersatz (Endoprothetik)

Todesfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung

|        |               |           |  |
|--------|---------------|-----------|--|
| <0,13% | 0,1393%       | 0,0%      |  |
| 1      | 78 von 55.998 | 0 von 121 |  |

Todesfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei hüftgelenksnahen Frakturen

|                  |                  |          |  |
|------------------|------------------|----------|--|
| Beobachtungswert | 5,8%             | 7,1%     |  |
| 1                | 1.217 von 21.083 | 6 von 84 |  |

Todesfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei anderen Diagnosen

|                  |               |          |  |
|------------------|---------------|----------|--|
| Beobachtungswert | 5,8%          | 0,0%     |  |
| 1                | 371 von 6.372 | 0 von 14 |  |

Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung

|                  |                  |           |  |
|------------------|------------------|-----------|--|
| Beobachtungswert | 2,4%             | 1,7%      |  |
| 1                | 1.358 von 55.998 | 2 von 121 |  |

Todesfälle bei Wechsel Hüftgelenkersatz ohne Fraktur oder Infektion bei Aufnahme

|        |              |         |  |
|--------|--------------|---------|--|
| <1,38% | 1,21%        | 0%      |  |
| 1      | 58 von 4.802 | 0 von 9 |  |

davon Todesfälle bei Wechsel Hüftgelenkersatz mit Sonderprothesen

|             |            |      |  |
|-------------|------------|------|--|
| Information | 1,3%       | n.a. |  |
| 1           | 12 von 935 | <4   |  |

Todesfälle bei Wechsel Hüftgelenkersatz wegen Fraktur oder Infektion

|                  |               |         |  |
|------------------|---------------|---------|--|
| Beobachtungswert | 4,7%          | 0,0%    |  |
| 1                | 173 von 3.718 | 0 von 8 |  |

Todesfälle bei Kniegelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung

|        |               |          |  |
|--------|---------------|----------|--|
| <0,06% | 0,0605%       | 1,0417%  |  |
| 1      | 32 von 52.899 | 1 von 96 |  |

Todesfälle bei Kniegelenkersatz (Erstimplantation) bei anderen Diagnosen

|                  |              |         |  |
|------------------|--------------|---------|--|
| Beobachtungswert | 0,7376%      | 0,0%    |  |
| 1                | 24 von 3.254 | 0 von 8 |  |

Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei Kniegelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung

|                  |                |          |  |
|------------------|----------------|----------|--|
| Beobachtungswert | 1,7%           | 1,0%     |  |
| 1                | 905 von 52.899 | 1 von 96 |  |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2022

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

| IQM Indikatoren                                                                                                                 | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    |            | Klinik Ist-Wert          |        | Klinik Erwartungs-wert |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|--------|------------------------|
|                                                                                                                                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> |            | <a href="#">Fallzahl</a> |        | <a href="#">SMR</a>    |
| Todesfälle bei Wechsel Kniegelenkersatz oder -teilersatz bei Aufnahme                                                           | <0,16%                 | 0,3172%                  |            | 0,0%                     |        |                        |
|                                                                                                                                 | 1                      | 14                       | von 4.413  | 0                        | von 11 |                        |
| davon Todesfälle bei Wechsel Kniegelenkersatz mit Sonderprothesen                                                               | Information            | 0,1455%                  |            | 0,0%                     |        |                        |
|                                                                                                                                 | 1                      | 2                        | von 1.375  | 0                        | von 8  |                        |
| Todesfälle bei Wechsel Kniegelenkersatz wegen Fraktur oder Infektion                                                            | Beobachtungswert       | 3,1%                     |            | 0,0%                     |        |                        |
|                                                                                                                                 | 1                      | 60                       | von 1.945  | 0                        | von 6  |                        |
| Todesfälle bei Hüft- oder Kniegelenkersatz bei Tumorerkrankung                                                                  | Beobachtungswert       | 7,1%                     |            | 0,0%                     |        |                        |
|                                                                                                                                 | 1                      | 160                      | von 2.244  | 0                        | von 7  |                        |
| Todesfälle bei kombiniertem Hüft- oder Kniegelenkersatz                                                                         | Beobachtungswert       | 2,0%                     |            | n.a.                     |        |                        |
|                                                                                                                                 | 1                      | 2                        | von 100    |                          | <4     |                        |
| <b>Hüftgelenknahe Frakturen</b>                                                                                                 |                        |                          |            |                          |        |                        |
| Todesfälle nach operativer Versorgung einer Schenkelhalsfraktur                                                                 | < Erwartungswert       | 5,2%                     |            | 6,5%                     |        | 5,0%                   |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                                                   | 1                      | 1.212                    | von 23.337 | 6                        | von 93 | 1,28                   |
| Todesfälle nach Gelenkersatz bei Schenkelhalsfraktur                                                                            | Beobachtungswert       | 5,7%                     |            | 7,2%                     |        |                        |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                                                   | 1                      | 1.180                    | von 20.617 | 6                        | von 83 |                        |
| Todesfälle nach Osteosynthese (Verbindung der Knochenfragmente durch Platten, Schrauben oder Nägel) bei Schenkelhalsfraktur     | Beobachtungswert       | 1,2%                     |            | 0,0%                     |        |                        |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                                                   | 1                      | 32                       | von 2.720  | 0                        | von 10 |                        |
| Todesfälle nach operativer Versorgung einer pertrochantären Fraktur                                                             | < Erwartungswert       | 5,3%                     |            | 10,3%                    |        | 6,3%                   |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                                                   | 1                      | 1.020                    | von 19.295 | 6                        | von 58 | 1,63                   |
| Todesfälle nach Gelenkersatz bei pertrochantärer Fraktur                                                                        | Beobachtungswert       | 7,6%                     |            | n.a.                     |        |                        |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                                                   | 1                      | 32                       | von 423    |                          | <4     |                        |
| Todesfälle nach Osteosynthese (Verbindung der Knochenfragmente durch Platten, Schrauben oder Nägel) bei pertrochantärer Fraktur | Beobachtungswert       | 5,2%                     |            | 10,5%                    |        |                        |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                                                   | 1                      | 988                      | von 18.872 | 6                        | von 57 |                        |
| <b>Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark</b>                                                                         |                        |                          |            |                          |        |                        |
| Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark (ohne lokale Schmerztherapien)                                                 | Mengeninformation      | 300,2 (179)              |            | 367                      |        |                        |
|                                                                                                                                 | 2                      | 108.384                  |            |                          |        |                        |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2022

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

| IQM Indikatoren                                                                                                                    | IQM Zielwert               | IQM Durchschnittswert        |  |  | Klinik Ist-Wert         |  |  | Klinik Erwartungs-wert |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|--|-------------------------|--|--|------------------------|
|                                                                                                                                    | Quelle                     | Fallzahl                     |  |  | Fallzahl                |  |  | SMR                    |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder Wirbelkörper-Ersatz bei Tumor (inkl. komplexe Rekonstruktionen)                       | Beobachtungswert<br><br>1  | 8,0%<br><br>264 von 3.299    |  |  | 16,7%<br><br>2 von 12   |  |  |                        |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder Wirbelkörper-Ersatz bei Trauma (inkl. komplexe Rekonstruktionen, Rückenmarkoperation) | Beobachtungswert<br><br>1  | 3,9%<br><br>554 von 14.172   |  |  | 0,0%<br><br>0 von 47    |  |  |                        |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Operation bei Entzündung der Bandscheibe oder des Rückenmarks                                          | Beobachtungswert<br><br>1  | 8,6%<br><br>204 von 2.363    |  |  | 14,3%<br><br>1 von 7    |  |  |                        |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder 1 Wirbelkörper-Ersatz (ohne Tumor, Trauma oder kompl. Rekonstruktionen)               | Beobachtungswert<br><br>1  | 0,0709%<br><br>9 von 12.690  |  |  | 0,0%<br><br>0 von 53    |  |  |                        |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder 2 Wirbelkörper-Ersatz (ohne Tumor, Trauma oder kompl. Rekonstruktionen)               | Beobachtungswert<br><br>1  | 0,3454%<br><br>22 von 6.369  |  |  | 0,0%<br><br>0 von 28    |  |  |                        |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder 3 oder mehr Wirbelkörper-Ersatz (ohne Tumor, Trauma oder kompl. Rekonstruktionen)     | Beobachtungswert<br><br>1  | 0,6663%<br><br>32 von 4.803  |  |  | 0,0%<br><br>0 von 15    |  |  |                        |
| Todesfälle bei alleiniger 'Entlastung' (Dekompression) der Wirbelsäule                                                             | Beobachtungswert<br><br>1  | 0,0519%<br><br>11 von 21.178 |  |  | 0,0%<br><br>0 von 67    |  |  |                        |
| Todesfälle bei 'einfachen' Bandscheibenentfernungen                                                                                | <0,03%<br><br>1            | 0,0251%<br><br>4 von 15.948  |  |  | 0,0%<br><br>0 von 90    |  |  |                        |
| Todesfälle bei Vertebro-/Kyphoplastie (ohne Tumor, kompl. Rekonstruktion, Versteifung, WK-Ersatz oder Bandscheibeneingriffe)       | <0,53%<br><br>1            | 0,3975%<br><br>26 von 6.541  |  |  | 0,0%<br><br>0 von 7     |  |  |                        |
| Todesfälle bei anderen Operationen an der Wirbelsäule oder am Rückenmark                                                           | Beobachtungswert<br><br>1  | 1,8%<br><br>357 von 20.304   |  |  | 7,3%<br><br>3 von 41    |  |  |                        |
| Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei 'einfachen' Bandscheibenentfernungen                                         | Beobachtungswert<br><br>1  | 0,5518%<br><br>88 von 15.948 |  |  | 1,1111%<br><br>1 von 90 |  |  |                        |
| Lokale Schmerztherapie an der Wirbelsäule (ohne andere Wirbelsäulenoperation)                                                      | Mengeninformation<br><br>2 | 80,3 (35)<br><br>27.216      |  |  | 31                      |  |  |                        |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2022

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                                                                           | <div>IQM<br/>Zielwert</div> <div><a href="#">Quelle</a></div> | <div>IQM<br/>Durchschnittswert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Ist-Wert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Erwartungs-<br/>wert</div> <div><a href="#">SMR</a></div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           |                                                               |                                                                          |                                                                    |                                                                           |
| Behandlungsfälle mit Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen als Hauptdiagnose ohne Operation oder lokale Schmerztherapie | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div>                     | <div>123,5 (103)</div> <div>50.008</div>                                 | <div>272</div>                                                     |                                                                           |
| Operationen am Bewegungsapparat inkl. Endoprothetik                                                                       |                                                               |                                                                          |                                                                    |                                                                           |
| Gelenkersatz am Schulter-/ Ellenbogengelenk                                                                               | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div>                     | <div>31,1 (23)</div> <div>11.199</div>                                   | <div>21</div>                                                      |                                                                           |
| Mehrfachverletzungen - Polytraumen                                                                                        |                                                               |                                                                          |                                                                    |                                                                           |
| Mehrfachverletzungen (Polytraumen) im Sinne der DRG-Definition                                                            | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div>                     | <div>21,2 (7)</div> <div>7.351</div>                                     | <div>32</div>                                                      |                                                                           |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2022

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |

## Urologie

### Operationen der Niere

|                                                                                             |                  |                 |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|--|
| Todesfälle bei Totalentfernung der Niere bei bösartiger Neubildung                          | <1,8%            | 1,7%            | 0,0%      |  |
|                                                                                             | 1                | 56 von 3.390    | 0 von 15  |  |
| Anteil laparoskopischer Operationen bei Totalentfernung der Niere bei bösartiger Neubildung | Information      | 41,9%           | 86,7%     |  |
|                                                                                             | 1                | 1.422 von 3.390 | 13 von 15 |  |
| Todesfälle bei Teilentfernung der Niere bei bösartiger Neubildung                           | <0,35%           | 0,1308%         | 0,0%      |  |
|                                                                                             | 1                | 4 von 3.059     | 0 von 12  |  |
| Anteil laparoskopischer Operationen bei Teilentfernung der Niere bei bösartiger Neubildung  | Information      | 52,8%           | 75,0%     |  |
|                                                                                             | 1                | 1.616 von 3.059 | 9 von 12  |  |
| Anteil der Teilentfernungen der Niere bei bösartiger Neubildung                             | Information      | 47,4%           | 44,4%     |  |
|                                                                                             | 1                | 3.059 von 6.449 | 12 von 27 |  |
| Todesfälle bei Totalentfernung der Niere bei anderer Diagnose                               | Beobachtungswert | 3,6%            | 0,0%      |  |
|                                                                                             | 1                | 74 von 2.046    | 0 von 8   |  |
| Todesfälle bei Teilentfernung der Niere bei anderer Diagnose                                | Beobachtungswert | 0,8101%         | 0,0%      |  |
|                                                                                             | 1                | 9 von 1.111     | 0 von 6   |  |

### Harnblase

|                                                                                             |                   |                  |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------|--|
| Behandlungsfälle mit Blasenkrebs als Hauptdiagnose                                          | Mengeninformation | 129,8 (40)       | 331        |  |
|                                                                                             | 2                 | 41.790           |            |  |
| Operationen an der Harnblase durch die Harnröhre                                            | Mengeninformation | 201,8 (197)      | 290        |  |
|                                                                                             | 2                 | 42.790           |            |  |
| davon Entfernung des Tumorgewebes durch die Harnröhre                                       | Mengeninformation | 160,6 (147)      | 206        |  |
|                                                                                             | 2                 | 30.031           |            |  |
| Anteil Entfernung des Tumorgewebes durch die Harnröhre mit Einbringen von Chemotherapeutika | Beobachtungswert  | 18,8%            | 23,8%      |  |
|                                                                                             | 1                 | 5.650 von 30.031 | 49 von 206 |  |
| Todesfälle bei Entfernung der Harnblase                                                     | <4,8%             | 4,4%             | 3,4%       |  |
|                                                                                             | 1                 | 128 von 2.903    | 1 von 29   |  |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2022

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

| IQM Indikatoren                                                                                                        | <b>IQM<br/>Zielwert</b>    | <b>IQM<br/>Durchschnittswert</b> | <b>Klinik<br/>Ist-Wert</b> | <b>Klinik<br/>Erwartungs-<br/>wert</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                        | <a href="#">Quelle</a>     | <a href="#">Fallzahl</a>         | <a href="#">Fallzahl</a>   | <a href="#">SMR</a>                    |
| Todesfälle bei vollständiger Entnahme aller Organe des kleinen Beckens bei Mann oder Frau                              | Beobachtungswert<br><br>1  | 5,7%<br><br>31 von 547           | n.a.<br><br><4             |                                        |
| <b>Prostata</b>                                                                                                        |                            |                                  |                            |                                        |
| Todesfälle bei Operationen der Prostata durch die Harnröhre                                                            | <0,2%<br><br>1             | 0,2218%<br><br>51 von 22.995     | 0,0%<br><br>0 von 108      |                                        |
| Todesfälle bei Operationen der Prostata durch die Harnröhre bei bösartigen Erkrankungen                                | Beobachtungswert<br><br>1  | 0,657%<br><br>43 von 6.545       | 0,0%<br><br>0 von 37       |                                        |
| Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei Behandlungsfällen mit Operation der Prostata durch die Harnröhre | Beobachtungswert<br><br>1  | 3,5%<br><br>1.040 von 29.540     | 1,4%<br><br>2 von 145      |                                        |
| Behandlungsfälle mit Prostatakrebs als Hauptdiagnose                                                                   | Mengeninformation<br><br>2 | 92,6 (20)<br><br>32.401          | 152                        |                                        |
| Todesfälle bei radikaler Prostataentfernung                                                                            | <0,16%<br><br>1            | 0,1395%<br><br>16 von 11.470     | 0,0%<br><br>0 von 53       |                                        |
| <b>Nierensteine</b>                                                                                                    |                            |                                  |                            |                                        |
| Behandlungsfälle mit Nierensteinen als Hauptdiagnose                                                                   | Mengeninformation<br><br>2 | 185,6 (36)<br><br>68.659         | 513                        |                                        |
| Anteil der Behandlungsfälle mit Intervention zur Steinentfernung                                                       | Information<br><br>1       | 53,6%<br><br>36.818 von 68.659   | 50,1%<br><br>257 von 513   |                                        |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2022

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | <div>IQM<br/>Zielwert</div> <div><a href="#">Quelle</a></div> | <div>IQM<br/>Durchschnittswert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Ist-Wert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Erwartungs-<br/>wert</div> <div><a href="#">SMR</a></div> |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

Hautkrankheiten

Hautkrankheiten

|                                                        |                                           |                                       |                                  |  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| Behandlungsfälle mit Melanom als Hauptdiagnose         | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div> | <div>44,9 (4)</div> <div>12.441</div> | <div>n.a.</div> <div>&lt;4</div> |  |
| Behandlungsfälle mit Schuppenflechte als Hauptdiagnose | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div> | <div>28,4 (2)</div> <div>4.255</div>  | <div>n.a.</div> <div>&lt;4</div> |  |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2022

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |

## Intensivmedizin

### Intensivmedizin

|                                                                                                              |                        |                            |                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| Todesfälle bei Beatmung > 24 Stunden ohne Neugeborene                                                        | Beobachtungswert<br>1  | 37,2%<br>34.176 von 91.971 | 44,6%<br>165 von 370 |               |
| ECLS/ECMO - Herz- / Herz-Lungenunterstützung                                                                 | Mengeninformation<br>2 | 28,4 (14)<br>2.385         | 6                    |               |
| ECMO - Lungenunterstützung                                                                                   | Mengeninformation<br>2 | 18,0 (5)<br>2.072          | 28                   |               |
| Todesfälle bei Beatmung > 24 Stunden ohne Neugeborene und ohne COVID-19 Fälle                                | <35,9%<br>1            | 36,4%<br>28.652 von 78.807 | 44,4%<br>146 von 329 |               |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) als Hauptdiagnose                                                     | < Erwartungswert<br>1  | 34,0%<br>9.552 von 28.070  | 37,5%<br>42 von 112  | 34,9%<br>1,08 |
| davon Todesfälle bei Sepsis mit Organversagen/Schock (als Hauptdiagnose)                                     | Beobachtungswert<br>1  | 36,8%<br>9.099 von 24.733  | 43,3%<br>42 von 97   |               |
| davon Todesfälle bei Sepsis ohne Organversagen/Schock (als Hauptdiagnose)                                    | Beobachtungswert<br>1  | 13,6%<br>453 von 3.337     | 0,0%<br>0 von 15     |               |
| Todesfälle bei Sepsis (als Nebendiagnose)                                                                    | Beobachtungswert<br>1  | 40,7%<br>25.779 von 63.283 | 50,7%<br>110 von 217 |               |
| davon Todesfälle bei Sepsis mit Organversagen/Schock (als Nebendiagnose)                                     | Beobachtungswert<br>1  | 42,3%<br>25.171 von 59.484 | 54,2%<br>109 von 201 |               |
| Anteil Todesfälle bei generalisierter Entzündungsreaktion des gesamten Körpers ohne Organkomplikation (SIRS) | Information<br>1       | 8,8%<br>3.631 von 41.083   | 10,0%<br>20 von 200  |               |

### Angeborene Gerinnungsstörung

|                                                                        |                        |                     |    |  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----|--|
| Behandlungsfälle mit angeborenen Gerinnungsstörungen                   | Mengeninformation<br>2 | 29,6 (15)<br>11.813 | 20 |  |
| davon operierte Behandlungsfälle (mit angeborenen Gerinnungsstörungen) | Mengeninformation<br>2 | 19,7 (10)<br>7.505  | 8  |  |

### Obduktionen

|                |                  |                            |                    |  |
|----------------|------------------|----------------------------|--------------------|--|
| Obduktionsrate | Information<br>1 | 0,81%<br>1.405 von 173.680 | 0,59%<br>5 von 848 |  |
|----------------|------------------|----------------------------|--------------------|--|

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2022

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                         | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                                         | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |
| Palliativmedizin                        |                        |                          |                          |                               |
| Palliativmedizin                        |                        |                          |                          |                               |
| Palliativmedizinische Komplexbehandlung | Mengeninformation      | 182,6 (120)              | 259                      |                               |
|                                         | 2                      | 42.178                   |                          |                               |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2022

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                | <div>IQM<br/>Zielwert</div> <div><a href="#">Quelle</a></div> | <div>IQM<br/>Durchschnittswert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Ist-Wert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Erwartungs-<br/>wert</div> <div><a href="#">SMR</a></div> |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                                                               |                                                                          |                                                                    |                                                                           |
| Roboterassistierte Eingriffe                   |                                                               |                                                                          |                                                                    |                                                                           |
| Roboterassistierte Eingriffe                   |                                                               |                                                                          |                                                                    |                                                                           |
| Urologische Eingriffe mittels Roboterchirurgie | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div>                     | <div>126,1 (98)</div> <div>10.091</div>                                  | <div>97</div>                                                      |                                                                           |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2022

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

IQM Indikatoren

IQM  
Zielwert

[Quelle](#)

IQM  
Durchschnittswert

[Fallzahl](#)

Klinik  
Ist-Wert

[Fallzahl](#)

Klinik  
Erwartungs-  
wert

[SMR](#)

## COVID-19 Kennzahlen

### COVID-19 Kennzahlen

|                                                                                        |                  |                                  |                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------|--|
| Behandlungsfälle mit Testung auf COVID-19-Infektion                                    | Information<br>1 | 89,7%<br>5.418.059 von 6.040.148 | 92,1%<br>22.735 von 24.698 |  |
| Anteil positiver Virusnachweis auf COVID-19 von allen getesteten Behandlungsfällen     | Information<br>1 | 5,6%<br>304.475 von 5.418.059    | 5,3%<br>1.202 von 22.735   |  |
| COVID-19 positiver Virusnachweis von allen Behandlungsfällen                           | Information<br>1 | 5,0%<br>304.475 von 6.040.149    | 4,9%<br>1.202 von 24.698   |  |
| COVID-19 - Anteil von Behandlungsfällen ohne Virusnachweis                             | Information<br>1 | 0,4%<br>22.953 von 6.040.149     | 0,5%<br>130 von 24.698     |  |
| COVID-19 - Behandlungsfälle mit Virusnachweis und schweren akuten Atemwegserkrankungen | Information<br>1 | 26,8%<br>81.684 von 304.475      | 31,5%<br>379 von 1.202     |  |
| COVID-19 - Behandlungsfälle mit Virusnachweis und ausgewählten Vorerkrankungen         | Information<br>1 | 71,9%<br>219.032 von 304.475     | 72,9%<br>876 von 1.202     |  |
| COVID-19 - Mortalität bei Virusnachweis                                                | Information<br>1 | 8,2%<br>24.947 von 304.475       | 8,2%<br>98 von 1.202       |  |

# Leseanleitung zu den IQM-Indikatoren

## Lesebeispiel

Beim nachfolgenden Indikator „Todesfälle bei Hauptdiagnose Herzinfarkt (Alle Patient:innen > 19 Jahre)“ liegt der Wert der durchschnittlichen Krankenhaussterblichkeit in der Bundesrepublik bei 8,2 % (Quelle: Statistisches Bundesamt). Daraus ergibt sich rechnerisch für das Beispielkrankenhaus, aufgrund des Alters und Geschlechts der Patientinnen und Patienten des ausgewerteten Jahres, eine zu erwartende Krankenhaussterblichkeit von 7,7 % <sup>4</sup> als Erwartungswert. Ziel der IQM-Mitgliedskrankenhäuser ist es, im Ergebnis unter diesem Erwartungswert zu liegen <sup>1</sup>. Der für das Beispielkrankenhaus tatsächlich gemessene Ist-Wert betrug in diesem Jahr 11,5 % <sup>3</sup> und lag damit über dem Krankenhaus-Erwartungswert für den Qualitätsindikator „Todesfälle bei Hauptdiagnose Herzinfarkt“. Der Durchschnittswert aller IQM-Mitgliedskrankenhäuser liegt bei diesem Indikator bei 7,6 % <sup>2</sup>.

|                                                                                                          |                  |                       |                 |                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--|
| G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024                                                                     |                  | Jahr:                 |                 | 2023                  |  |
| Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der Präambel |                  |                       |                 |                       |  |
| IQM Indikatoren                                                                                          | IQM Zielwert     | IQM Durchschnittswert | Klinik Ist-Wert | Klinik Erwartungswert |  |
|                                                                                                          | Quelle           | Fallzahl              | Fallzahl        | SMR                   |  |
| Herzerkrankungen                                                                                         | 1                | 2                     | 3               | 4                     |  |
| Herzinfarkt                                                                                              |                  |                       |                 |                       |  |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Herzinfarkt                                                                 | < Erwartungswert | 7,6%                  | 11,5%           | 7,7%                  |  |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                            |                  | 5.744 von 75.253      | 165 von 1.436   | 1,50                  |  |

## Die Indikatoren

Die von IQM verwendeten German/Swiss Inpatient Quality Indicators (G-IQI/CH-IQI) sind so ausgewählt, dass sie sowohl häufige und wichtige Krankheitsbilder als auch wichtige Verfahren abbilden. Alle Indikatoren werden aus den Routinedaten des Krankenhauses ohne zusätzliche Dokumentation abgeleitet, wodurch kein weiterer Dokumentationsaufwand entsteht.

## Was wird gemessen?

Hierbei unterscheiden wir **absolute Mengeninformati- onen**, bei denen z.B. ein Anteil bestimmter Operationsverfahren ausgewiesen wird.

Wesentlicher Messwert ist die **Sterblichkeit** bei verschiedenen Krankheitsbildern, auch wenn wir uns bewusst sind, dass Sterblichkeit im Krankenhaus auch bei bester Medizin nicht vermeidbar ist. Deswegen vergleichen wir die Sterblichkeiten, wo verfügbar, mit bundesdurchschnittlichen Werten. Diese werden entweder aus Daten des **Statistischen Bundesamtes** oder aus Daten **des Forschungsdatenzentrums der statistischen Ämter des Bundes und der Länder** berechnet. Mit den Daten des Statistischen Bundesamtes wird eine **Risikogewichtung** für das **Alter** und das **Geschlecht** der Behandelten ermöglicht. Krankenhäuser mit einem hohen Anteil sehr alter Patient:innen weisen in der Regel eine andere Sterblichkeit auf als solche mit vergleichsweise jungen Patientinnen und Patienten.

Als wesentliche Orientierungshilfe zur Einordnung der Ergebnisse dient der **Erwartungswert**, da er besagt, welche Sterblichkeit bei einer Patientengruppe gleicher Alters- und Geschlechtsverteilung im Bundesdurchschnitt zu erwarten wäre. Insofern ergeben sich für unterschiedliche Krankenhäuser individuelle Erwartungswerte, da Unterschiede in der Alters- und Geschlechtsszusammensetzung der Behandelten bestehen. Ziel der IQM Krankenhäuser ist es, „bessere“ als die erwarteten Werte zu erreichen.

Die Beziehung zwischen erwarteter Sterblichkeit und dem tatsächlichen Wert des Krankenhauses nennt man wissenschaftlich „**standardized mortality rate**“ oder kurz „**SMR**“. Liegt diese Quote unter 1, dann ist die tatsächliche Sterblichkeit im Krankenhaus für den gemessenen Indikator geringer als die zu erwartende, liegt sie über 1, ist die Sterblichkeit höher als eigentlich erwartet. Ein solcher Wert ist lediglich bei den Indikatoren errechenbar, bei denen die zu erwartende Sterblichkeit aus den Daten des Statistischen Bundesamtes ermittelt werden kann.

Liegen keine alters- und geschlechtsgewichteten Werte für einen Indikator vor, kann auch kein Erwartungswert errechnet werden. Wir sind uns ebenso bewusst, dass die Sterblichkeit bei manchen Indikatoren ein ausgesprochen seltenes Ereignis ist und nicht als alleiniger Nachweis der medizinischen Qualität gelten darf. Die im „low risk“-Bereich gemessene Sterblichkeit ermöglicht in nachfolgenden Analysen dieser seltenen Ereignisse, wichtige Verbesserungspotentiale zu heben.

## Glossar

### **IQM-Zielwert - Quellen:**

Die Quellen, aus denen sich die Referenz- bzw. Zielwerte ableiten, sind bei jedem Indikator durch die Zahl unter dem IQM-Zielwert angegeben.

Die Referenzwerte bzw. Zielwerte leiten sich aus den folgenden Quellen ab:

1: Forschungsdatenzentren der statistischen Ämter des Bundes und der Länder, DRG-Statistik 2022. Eigene Berechnungen. Diese Daten bilden auch die Grundlage für die Berechnung der nach Alter und Geschlecht standardisierten klinikindividuellen Erwartungswerte.

2: Gleiche Quelle wie 1; bei den Mengenindikatoren handelt es sich um die mittlere Fallzahl (in Klammern: den Median) bezogen auf diejenigen IQM-Mitgliedskrankenhäuser, die die Leistung im Jahr 2022 erbracht haben.

3: Der Zielwert ist hier nicht identisch mit dem Bundeswert und wurde entnommen aus: Kaiser D (2007) Mindestmengen aus thoraxchirurgischer Sicht. Chirurg, 78(11): 1012-1017

### **IQM-Durchschnittswert - Fallzahl:**

Darstellung der Durchschnittsergebnisse über alle Patient:innen, die im Beobachtungszeitraum in IQM Mitgliedskrankenhäusern (D) versorgt wurden. Die IQM-Mengeninformation (Gesamt) wird als Durchschnittswert und in Klammern als Median angegeben.

### **Krankenhaus Erwartungswert:**

Der Erwartungswert beinhaltet die erwartete Sterblichkeit der Patient:innen aufgrund ihrer Alters- und Geschlechtsverteilung und ist nur bei den Indikatoren angegeben, bei denen Vergleichszahlen des Bundesdurchschnitts die Berechnung erlauben.

**SMR:**

Die SMR (standardized mortality ratio) ist der Quotient aus beobachteter Sterblichkeit (Durchschnittswert) und dem Erwartungswert.

**Hinweis zum Indikator „Obduktionsrate“:**

Die Anzahl der ausgewiesenen Obduktionen wird von den Krankenhäusern möglicherweise nicht vollständig angegeben, da eine komplette Kodierung nach Entlassung nicht von allen eingesetzten Krankenhaus-Dokumentationssystemen unterstützt wird.

**Fallzahlen:**

Wie im vergangenen Jahr 2023 erfolgt die Darstellung der Ergebnisse unter Berücksichtigung einer Mindestnennerfallzahl. So werden Ergebnisse einer Kennzahl nur dann im Detail dargestellt, wenn mindestens 4 oder mehr Fälle im Nenner aufgetreten sind. Bei Unterschreiten dieser Grenze wird dann die Angabe „<4“ ausgewiesen. Ergebnisse, die sich auf sehr seltene Ereignisse beziehen, werden mit bis zu 4 Nachkommastellen ausgewiesen, um bei hohen Grundgesamtheiten ein Ergebnis zwischen 0 und 1 ausweisen zu können.