

## **Ergebnisdarstellung und Nutzung der Indikatoren-Sets**

Gerne möchten wir Ihnen an dieser Stelle Informationen mitgeben, die Ihnen eine Orientierung und Analyse der im Folgenden dargestellten Ergebnisse erleichtern sollen.

### Auswirkungen der COVID-19 Pandemie

Analysen der Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf das Leistungsgeschehen der IQM-Mitgliedskliniken mit dem Schwerpunkt auf die Zielwertindikatoren haben gezeigt, dass sich zwar die Fallpopulationen in den Kennzahlen verändern, jedoch die beobachtete Rate in der Tendenz überwiegend stabil bleibt. Lediglich in den Kennzahlen G-IQI 14.2 (Pneumonie ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose, Alter>19, Anteil Todesfälle) und G-IQI 56.1 (Beatmung > 24 Stunden (ohne Neugeborene), Anteil Todesfälle) lässt sich der „COVID-Effekt“ auch in der Rate deutlich erkennen. Nach wie vor wird für die beiden Kennzahlen zur Sterblichkeit bei Pneumonie und Sterblichkeit bei Beatmung > 24 Stunden der Status „Zielwert“ auf jeweils alternative Kennzahlen ohne COVID-19-Fälle gewechselt. Für alle weiteren Zielwertindikatoren wurde die Darstellung der Ziel- und Erwartungswerte seit vergangem Jahr wieder eingesetzt.

### Wiedereinsetzen Zielwert bei Sepsis

Die Kennzahl G-IQI 57.1 „Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) als Hauptdiagnose“ war in den vergangenen zwei Jahren nicht als Zielwertindikator definiert. Grund war die geänderte Sepsis-Definition im Jahr 2020 und die dadurch bedingte „Ungleichheit“ der Kodierung in den Referenzwerten des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Vergleich zu den Auswertungsdaten der IQM-Mitgliedskliniken. Durch die bereits im Dezember 2023 vom Statistischen Bundesamt bereitgestellten Bundesreferenzwerte für das Jahr 2022 und die neue Sepsis-Kodierung ist die genannte Kennzahl nach Beschluss des IQM-Vorstandes ab der aktuellen Ergebnisveröffentlichung wieder ein Zielwertindikator mit dem Ziel „< Erwartungswert“.

### Kennzahlen zur Sterblichkeit bei Schlaganfall

Die Kennzahlen zur Sterblichkeit bei Schlaganfall und bei Hirninfarkt werden nicht mehr mit Zielwerten hinterlegt. Hintergrund ist, dass nach Einschätzung von Experten neurologischer Fachgesellschaften und der Arbeitsgemeinschaft Deutschsprachiger Schlaganfallregister (ADSR), durch verschiedene Einflussfaktoren wie die Zeit bis zur Aufnahme, Schweregrad des Hirninfarktes, Begleiterkrankungen, Erfolgsaussichten der Therapie oder Patientenverfügung u.v.m., die Behandlungsqualität in den aktuellen Kennzahlen nicht adäquat abgebildet werden kann. Da jedoch keine alternative Veröffentlichung der Schlaganfallsterblichkeit durch andere Institutionen erfolgt, soll die Darstellung - ohne Zielwerte - beibehalten werden und parallel neue geeignete Kennzahlen zu Schlaganfallbehandlung entwickelt werden.

### Kennzahl zur Sterblichkeit bei operativen Eingriffen/ Ereignissen

Bei Kennzahlen mit der Bezeichnung „Todesfälle bei [Eingriffsart]“ betrifft dies den gesamten Behandlungsfall, nicht allein ein intraoperatives Ereignis. Sie stellen also **nicht ausschließlich** den intraoperativen Tod dar. Dies ist anzuwenden auf alle Kennzahlen, die einen operativen Eingriff/ ein operatives Ereignis beschreiben.

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

## IQM Indikatoren

[Qualitätsbericht](#)

[QSR-Mehrjahresergebnisse](#)

### Inhaltsverzeichnis

|                                                    |                      |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Herzerkrankungen                                   | <a href="#">2023</a> | <a href="#">2022</a> |
| Erkrankungen des Nervensystems und Schlaganfall    | <a href="#">2023</a> | <a href="#">2022</a> |
| Altersmedizin                                      | <a href="#">2023</a> | <a href="#">2022</a> |
| Lungenerkrankungen                                 | <a href="#">2023</a> | <a href="#">2022</a> |
| Erkrankungen der Bauchorgane                       | <a href="#">2023</a> | <a href="#">2022</a> |
| Gefäßoperationen                                   | <a href="#">2023</a> | <a href="#">2022</a> |
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe                   | <a href="#">2023</a> | <a href="#">2022</a> |
| Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe | <a href="#">2023</a> | <a href="#">2022</a> |
| Urologie                                           | <a href="#">2023</a> | <a href="#">2022</a> |
| Hautkrankheiten                                    | <a href="#">2023</a> | <a href="#">2022</a> |
| Intensivmedizin                                    | <a href="#">2023</a> | <a href="#">2022</a> |
| Palliativmedizin                                   | <a href="#">2023</a> | <a href="#">2022</a> |
| Roboterassistierte Eingriffe                       | <a href="#">2023</a> | <a href="#">2022</a> |
| COVID-19 Kennzahlen                                | <a href="#">2023</a> | <a href="#">2022</a> |

[Lesehilfe](#)

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert |  | Klinik<br>Ist-Wert       |  | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--|-------------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> |  | <a href="#">Fallzahl</a> |  | <a href="#">SMR</a>           |

Herzerkrankungen

Herzinfarkt

|                                                            |                  |        |            |       |         |       |
|------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------|-------|---------|-------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Herzinfarkt                   | < Erwartungswert | 7,6%   |            | 8,6%  |         | 8,3%  |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                              | 1                | 5.744  | von 75.253 | 37    | von 429 | 1,05  |
| Anteil der Herzinfarkte mit Linksherzkatheter              | Information      | 85,8%  |            | 94,2% |         |       |
|                                                            | 1                | 64.604 | von 75.253 | 404   | von 429 |       |
| Todesfälle bei Direktaufnahme ohne Verlegung               | Beobachtungswert | 7,5%   |            | 8,7%  |         |       |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                              | 1                | 5.127  | von 68.298 | 37    | von 426 |       |
| Anteil Transmuraler Herzinfarkte (STEMI)                   | Information      | 33,7%  |            | 36,8% |         |       |
|                                                            | 1                | 25.362 | von 75.169 | 158   | von 429 |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Transmuraler Herzinfarkt      | < Erwartungswert | 11,7%  |            | 15,2% |         | 12,9% |
|                                                            | 1                | 2.962  | von 25.362 | 24    | von 158 |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Nichttransmuraler Herzinfarkt | < Erwartungswert | 5,1%   |            | 4,1%  |         | 5,6%  |
|                                                            | 1                | 2.527  | von 49.072 | 11    | von 269 |       |
| Todesfälle bei Nebendiagnose Herzinfarkt                   | Beobachtungswert | 17,9%  |            | 18,5% |         |       |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                              | 1                | 3.946  | von 22.059 | 17    | von 92  |       |

Herzinsuffizienz

|                                                                                |                  |        |             |       |           |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------------|-------|-----------|-------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Herzinsuffizienz                                  | < Erwartungswert | 8,3%   |             | 10,4% |           | 10,0% |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                  | 1                | 14.396 | von 174.125 | 131   | von 1.263 | 1,04  |
| Linksherzinsuffizienz, Anteil mit Beschwerden bereits im Ruhezustand (NYHA IV) | Information      | 47,7%  |             | 54,0% |           |       |
|                                                                                | 1                | 55.198 | von 115.810 | 154   | von 285   |       |

Linksherzkatheter

|                                                                                                                                                                          |                   |             |             |       |         |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------|---------|------|
| Anzahl aller Linksherzkatheter zur Koronardiagnostik                                                                                                                     | Mengeninformation | 827,2 (717) |             | 1.346 |         |      |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                                                                                            | 2                 | 285.391     |             |       |         |      |
| Todesfälle mit Linksherzkatheter bei Herzinfarkt, bezogen auf Behandlungsfälle mit Herzinfarkt und Linksherzkatheter                                                     | < Erwartungswert  | 6,1%        |             | 6,4%  |         | 6,6% |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                                                                                            | 1                 | 3.883       | von 63.325  | 26    | von 404 | 0,98 |
| Behandlungsfälle mit diagnostischem Linksherzkatheter bei allen Erkrankungen (oder Z.n. Reanimation), ohne Hauptdiagnose Herzinfarkt und ohne Herz-OP, Anteil Todesfälle | <1,6%             | 1,6%        |             | 1,3%  |         |      |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                                                                                            | 1                 | 1.999       | von 128.445 | 7     | von 527 |      |
| Behandlungsfälle mit therapeutischem Linksherzkatheter ohne Hauptdiagnose Herzinfarkt und ohne Herz-OP, Anteil Todesfälle                                                | Beobachtungswert  | 1,7%        |             | 1,7%  |         |      |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                                                                                            | 1                 | 1.361       | von 80.373  | 7     | von 410 |      |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2023

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

| IQM Indikatoren                                                                                                      | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert    | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                      | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a>    | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |
| <b>Anteil der Behandlungen mit therapeutischem Linksherzkatheter ohne Hauptdiagnose Herzinfarkt und ohne Herz-OP</b> |                        |                             |                          |                               |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                                        | Information<br>1       | 38,5%<br>80.373 von 208.818 | 43,8%<br>410 von 937     |                               |
| <b>Herzrhythmusstörungen</b>                                                                                         |                        |                             |                          |                               |
| Behandlungsfälle mit Herzrhythmusstörungen als Hauptdiagnose                                                         | Mengeninformation<br>2 | 482,7 (318)<br>189.203      | 1.075                    |                               |
| <b>Schrittmacher/Defibrillator Implantation</b>                                                                      |                        |                             |                          |                               |
| Implantation eines Herzschrittmachers/Defibrillators                                                                 | Mengeninformation<br>2 | 146,9 (104)<br>49.079       | 199                      |                               |
| davon Einsatz oder Wechsel von Defibrillatoren                                                                       | Mengeninformation<br>2 | 49,2 (35)<br>12.887         | 61                       |                               |
| <b>Ablative Therapie</b>                                                                                             |                        |                             |                          |                               |
| Behandlungsfälle mit kathetergestützter ablativer Therapie                                                           | Mengeninformation<br>2 | 297,8 (210)<br>54.502       | 195                      |                               |
| davon Vorhofablation bei Vorhofflimmern/-flattern, Anteil Todesfälle                                                 | Information<br>1       | 0,0766%<br>27 von 35.254    | 0,0%<br>0 von 132        |                               |
| <b>Operationen am Herzen</b>                                                                                         |                        |                             |                          |                               |
| Behandlungsfälle mit Herzoperationen                                                                                 | Mengeninformation<br>2 | 256,3 (14)<br>53.571        | 14                       |                               |
| davon Operation der Herzkranzgefäße                                                                                  | Mengeninformation<br>2 | 489,8 (442)<br>17.633       | n.a.<br><4               |                               |
| davon andere Operationen am Herzen                                                                                   | Mengeninformation<br>2 | 55,9 (3)<br>9.448           | 14                       |                               |
| darunter Behandlungsfälle mit kombinierten Operationen                                                               | Mengeninformation<br>2 | 230,1 (175)<br>9.203        | n.a.<br><4               |                               |
| Todesfälle bei alleiniger OP an den Koronargefäßen ohne Herzinfarkt                                                  | <1,9%<br>1             | 1,6%<br>152 von 9.530       | n.a.<br><4               |                               |
| Anteil Operationen nur an den Koronargefäßen ohne Herzinfarkt mit Operation an der Halsschlagader (Carotis)          | Information<br>1       | 0,47%<br>45 von 9.530       | n.a.<br><4               |                               |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                                        |                        |                             |                          |                               |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2023

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |

## Erkrankungen des Nervensystems und Schlaganfall

### Bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhaut

|                                                                         |                   |          |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----|--|
| Bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhäute als Hauptdiagnose | Mengeninformation | 32,4 (6) | 14 |  |
|                                                                         | 2                 | 9.285    |    |  |

### Todesfälle bei Hauptdiagnose Schlaganfall

|                                               |                  |                    |          |  |
|-----------------------------------------------|------------------|--------------------|----------|--|
| Todesfälle bei allen Formen des Schlaganfalls | Beobachtungswert | 10,3%              | 28,6%    |  |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                 | 1                | 11.457 von 111.650 | 8 von 28 |  |

### Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirninfarkt

|                               |                  |                  |          |  |
|-------------------------------|------------------|------------------|----------|--|
| Todesfälle bei Hirninfarkt    | Beobachtungswert | 7,6%             | 26,3%    |  |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre | 1                | 7.237 von 95.762 | 5 von 19 |  |

|                                                                                       |             |                   |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------|--|
| Anteil der Hirninfarkte mit medikamentöser Auflösung des Blutgerinnsels (Thrombolyse) | Information | 17,0%             | 0,0%     |  |
|                                                                                       | 1           | 16.257 von 95.762 | 0 von 19 |  |

|                                                                                          |             |                  |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|--|
| Anteil der Hirninfarkte mit Entfernung des Blutgerinnsels durch Katheter (Thrombektomie) | Information | 10,3%            | 0,0%     |  |
|                                                                                          | 1           | 9.856 von 95.762 | 0 von 19 |  |

|                                              |                  |                  |          |  |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|----------|--|
| Anteil der Hirninfarkte mit Lungenentzündung | Beobachtungswert | 9,9%             | 10,5%    |  |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                | 1                | 9.513 von 95.762 | 2 von 19 |  |

|                                                 |                  |                 |      |  |
|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|------|--|
| Todesfälle bei Hirninfarkt mit Lungenentzündung | Beobachtungswert | 29,9%           | n.a. |  |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                   | 1                | 2.846 von 9.513 | <4   |  |

### Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirnblutung

|                                            |                  |                  |         |  |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|---------|--|
| Todesfälle bei Hirnblutung (intrazerebral) | Beobachtungswert | 29,3%            | 33,3%   |  |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre              | 1                | 3.500 von 11.938 | 2 von 6 |  |

|                                             |                  |               |      |  |
|---------------------------------------------|------------------|---------------|------|--|
| Todesfälle bei Hirnblutung (subarachnoidal) | Beobachtungswert | 18,7%         | n.a. |  |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre               | 1                | 690 von 3.697 | <4   |  |

|                                              |        |                 |          |  |
|----------------------------------------------|--------|-----------------|----------|--|
| Anteil nicht näher bezeichneter Schlaganfall | <0,42% | 0,23%           | 0,0%     |  |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                | 1      | 253 von 111.650 | 0 von 28 |  |

|                    |                  |                |      |  |
|--------------------|------------------|----------------|------|--|
| Todesfälle bei TIA | Beobachtungswert | 0,3155%        | n.a. |  |
|                    | 1                | 117 von 37.086 | <4   |  |

### Behandlung auf einer Stroke Unit

|                                                                |             |                   |          |  |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------|--|
| Hirninfarkte mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung | Information | 75,0%             | 0,0%     |  |
|                                                                | 1           | 71.818 von 95.762 | 0 von 19 |  |

|                                                       |             |                   |      |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------|--|
| TIA mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung | Information | 69,3%             | n.a. |  |
|                                                       | 1           | 25.693 von 37.086 | <4   |  |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                                                                             | <div>IQM Zielwert</div> <div><a href="#">Quelle</a></div> | <div>IQM Durchschnittswert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik Ist-Wert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik Erwartungs-<br/>wert</div> <div><a href="#">SMR</a></div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                             |                                                           |                                                                      |                                                                |                                                                       |
| Hirnfarkt oder TIA mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung ohne Zuverlegungen (in Anlehnung Schlaganfallregister) | <div>Information</div> <div>1</div>                       | <div>75,0%</div> <div>93.593 von 124.869</div>                       | <div>0,0%</div> <div>0 von 19</div>                            |                                                                       |
| Hirnfarkt oder TIA mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung nur Zuverlegungen (in Anlehnung Schlaganfallregister)  | <div>Information</div> <div>1</div>                       | <div>49,1%</div> <div>3.918 von 7.979</div>                          | <div>n.a.</div> <div>&lt;4</div>                               |                                                                       |
| Epilepsie                                                                                                                   |                                                           |                                                                      |                                                                |                                                                       |
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Epilepsie                                                                                | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div>                 | <div>111,4 (33)</div> <div>41.091</div>                              | <div>10</div>                                                  |                                                                       |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                                               |                                                           |                                                                      |                                                                |                                                                       |
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Epilepsie                                                                                | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div>                 | <div>51,4 (14)</div> <div>11.247</div>                               | <div>30</div>                                                  |                                                                       |
| Alle Patient:innen < 20 Jahre                                                                                               |                                                           |                                                                      |                                                                |                                                                       |
| Multiple Sklerose                                                                                                           |                                                           |                                                                      |                                                                |                                                                       |
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Multiple Sklerose                                                                        | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div>                 | <div>37,2 (24)</div> <div>9.105</div>                                | <div>n.a.</div> <div>&lt;4</div>                               |                                                                       |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | <div>IQM Zielwert</div> <div><a href="#">Quelle</a></div> | <div>IQM Durchschnittswert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik Ist-Wert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik Erwartungs-wert</div> <div><a href="#">SMR</a></div> |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                           |                                                                      |                                                                |                                                                  |

Altersmedizin

Geriatrische Frührehabilitation

|                                                       |                   |             |    |  |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----|--|
| Behandlungsfälle mit geriatrischer Frührehabilitation | Mengeninformation | 489,1 (412) | 68 |  |
|                                                       | 2                 | 119.341     |    |  |

Mangelernährung bei Älteren

|                                                                                        |             |                      |               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|--|
| Behandlungsfälle mit erheblicher Mangelernährung, >= 65 Jahre und ohne Tumorerkrankung | Information | 0,94%                | 0,43%         |  |
|                                                                                        | 1           | 23.878 von 2.533.709 | 58 von 13.408 |  |
| Behandlungsfälle mit Sondenernährung/Infusionsernährung                                | Information | 2,2%                 | 1,7%          |  |
|                                                                                        | 1           | 515 von 23.878       | 1 von 58      |  |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2023

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der****[Präambel](#)**

IQM Indikatoren

IQM  
Zielwert[Quelle](#)IQM  
Durchschnittswert[Fallzahl](#)Klinik  
Ist-Wert[Fallzahl](#)Klinik  
Erwartungs-  
wert[SMR](#)

## Lungenerkrankungen

### Lungenentzündung (Pneumonie)

|                                                                                                |                  |                    |               |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------|-------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung                                                  | < Erwartungswert | 12,7%              | 10,5%         | 16,2% |
| alle Altersgruppen                                                                             | 1                | 18.561 von 145.659 | 199 von 1.901 |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung ohne Zuverlegung, Tumor, Mukoviszidose           | < Erwartungswert | 11,8%              | 9,4%          | 16,1% |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                  | 1                | 11.935 von 100.994 | 123 von 1.302 |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung ohne Zuverlegung, Tumor, Mukoviszidose, COVID-19 | < Erwartungswert | 10,3%              | 8,5%          | 12,9% |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                  | 1                | 8.283 von 80.634   | 91 von 1.072  | 0,66  |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung ohne Zuverlegung, Tumor, Mukoviszidose           | Beobachtungswert | 0,33%              | 0,0%          |       |
| Alle Patient:innen < 20 Jahre                                                                  | 1                | 41 von 12.607      | 0 von 187     |       |
| Todesfälle bei Lungenentzündung durch Aspiration von Nahrungsmitteln oder Mageninhalt          | Beobachtungswert | 28,9%              | 24,1%         |       |
|                                                                                                | 1                | 3.663 von 12.659   | 38 von 158    |       |
| Todesfälle bei Bronchitis oder Bronchiolitis ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose          | < Erwartungswert | 2,2%               | 0,7%          | 3,0%  |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                  | 1                | 297 von 13.204     | 1 von 134     |       |

### COPD (Chronisch obstruktive Lungenerkrankung)

|                               |                  |                  |            |      |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------|------|
| Todesfälle bei COPD           | < Erwartungswert | 4,7%             | 7,5%       | 5,6% |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre | 1                | 3.311 von 69.877 | 25 von 332 | 1,35 |

### Lungenkrebs

|                                                |                   |            |     |  |
|------------------------------------------------|-------------------|------------|-----|--|
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Lungenkrebs | Mengeninformation | 191,2 (56) | 290 |  |
|                                                | 2                 | 72.065     |     |  |

### Operationen an der Lunge

|                                                                                                       |                  |                |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------|--|
| Todesfälle bei größeren operativen Entfernungen von Lunge/Bronchien                                   | Beobachtungswert | 2,6%           | 1,3%     |  |
|                                                                                                       | 1                | 364 von 14.037 | 1 von 80 |  |
| Todesfälle bei operativer Teilentfernung eines Lungenflügels bei Lungenkrebs                          | <2,0%            | 2,1%           | 0,0%     |  |
|                                                                                                       | 1                | 136 von 6.532  | 0 von 26 |  |
| Anteil der operativen Entfernungen eines Lungenflügels bei Lungenkrebsbehandlungsfällen               | <20%             | 3,5%           | 0,0%     |  |
|                                                                                                       | 1 / 3            | 238 von 6.770  | 0 von 26 |  |
| Anteil der bronchioangioplastischen Entfernungen eines Lungenflügels bei Lungenkrebsbehandlungsfällen | Beobachtungswert | 7,2%           | 0,0%     |  |
|                                                                                                       | 1                | 469 von 6.532  | 0 von 26 |  |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2023

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der**
**[Präambel](#)**

IQM Indikatoren

 IQM  
Zielwert

[Quelle](#)

 IQM  
Durchschnittswert

[Fallzahl](#)

 Klinik  
Ist-Wert

[Fallzahl](#)

 Klinik  
Erwartungs-  
wert

[SMR](#)

## Erkrankungen der Bauchorgane

### Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen

|                                                                    |                  |                   |             |  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|--|
| Anteil laparoskopische Operationen                                 | >95,1%           | 95,7%             | 93,5%       |  |
|                                                                    | 1                | 52.365 von 54.722 | 304 von 325 |  |
| Anteil Umsteiger auf offene Operationen                            | Beobachtungswert | 2,6%              | 2,5%        |  |
|                                                                    | 1                | 1.429 von 54.722  | 8 von 325   |  |
| Anteil Todesfälle bei Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen | <0,6%            | 0,4678%           | 0,0%        |  |
|                                                                    | 1                | 256 von 54.722    | 0 von 325   |  |

### Operation von Leisten-, Schenkel- und Nabelbrüchen (Hernien)

|                                                               |                  |                   |             |  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|--|
| Todesfälle bei Bruchoperationen ohne anteilige Darmentfernung | <0,12%           | 0,1186%           | 0,0%        |  |
|                                                               | 1                | 81 von 68.284     | 0 von 492   |  |
| Todesfälle bei Bruchoperationen mit anteiliger Darmentfernung | Beobachtungswert | 2,1%              | 0,0%        |  |
|                                                               | 1                | 157 von 7.308     | 0 von 49    |  |
| Anteil Leistenbruchoperationen mit Netz                       | Information      | 8,9%              | 0,0%        |  |
| Alle Patient:innen < 20 Jahre                                 | 1                | 228 von 2.564     | 0 von 9     |  |
| Anteil Leistenbruchoperationen mit Netz                       | Information      | 98,3%             | 98,1%       |  |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                 | 1                | 45.877 von 46.685 | 362 von 369 |  |

### Eingriffe an der Schilddrüse

|                                                                      |                   |               |          |  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------|--|
| Operative Entfernung der Schilddrüse                                 | Mengeninformation | 61,3 (20)     | 44       |  |
|                                                                      | 2                 | 18.747        |          |  |
| davon operative Entfernung der Schilddrüse bei Schilddrüsenkrebs     | Mengeninformation | 12,7 (5)      | 4        |  |
|                                                                      | 2                 | 2.703         |          |  |
| davon operative Entfernung der Schilddrüse bei gutartiger Erkrankung | Mengeninformation | 50,9 (18)     | 37       |  |
|                                                                      | 2                 | 15.005        |          |  |
| Anteil der Beatmungsfälle (> 24 Std.) nach Schilddrüseneingriff      | Information       | 0,5%          | 2,44%    |  |
|                                                                      | 1                 | 89 von 17.685 | 1 von 41 |  |

### Große Operationen am Dick- und Enddarm (Kolon und Rektum)

|                                                         |                   |            |     |  |
|---------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----|--|
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Dick-/Enddarmkrebs   | Mengeninformation | 126,9 (85) | 248 |  |
|                                                         | 2                 | 47.850     |     |  |
| Behandlungsfälle mit Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn | Mengeninformation | 94,1 (61)  | 197 |  |
|                                                         | 2                 | 39.141     |     |  |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2023

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

| IQM Indikatoren                                                                                | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    |            | Klinik Ist-Wert          |         | Klinik Erwartungs-wert |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|---------|------------------------|
|                                                                                                | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> |            | <a href="#">Fallzahl</a> |         | <a href="#">SMR</a>    |
| Todesfälle bei operativer Entfernung des Dick-/Enddarms                                        | Beobachtungswert       | 7,8%                     |            | 6,5%                     |         |                        |
|                                                                                                | 1                      | 2.973                    | 37.902     | 21                       | von 324 |                        |
| Todesfälle bei operativer Dickdarmentfernung bei Krebs, ohne komplizierende Diagnose           | <4,1%                  | 3,9%                     |            | 1,4%                     |         |                        |
|                                                                                                | 1                      | 358                      | von 9.296  | 1                        | von 70  |                        |
| Todesfälle bei operativer Dickdarmentfernung bei Krebs, mit komplizierender Diagnose           | Beobachtungswert       | 11,6%                    |            | 4,3%                     |         |                        |
|                                                                                                | 1                      | 324                      | von 2.804  | 1                        | von 23  |                        |
| Todesfälle bei operativer Enddarmentfernung bei Krebs                                          | <3,2%                  | 2,7%                     |            | 6,7%                     |         |                        |
|                                                                                                | 1                      | 122                      | von 4.478  | 2                        | von 30  |                        |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Divertikel, ohne Abszess/Perforation | <0,72%                 | 0,7557%                  |            | 0,0%                     |         |                        |
|                                                                                                | 1                      | 15                       | von 1.985  | 0                        | von 19  |                        |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Divertikel, mit Abszess/Perforation  | Beobachtungswert       | 5,4%                     |            | 0,0%                     |         |                        |
|                                                                                                | 1                      | 274                      | von 5.071  | 0                        | von 43  |                        |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Darmischämie                         | Information            | 42,5%                    |            | 56,3%                    |         |                        |
|                                                                                                | 1                      | 934                      | von 2.198  | 9                        | von 16  |                        |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Colitis oder Crohn                   | Beobachtungswert       | 3,8%                     |            | 0,0%                     |         |                        |
|                                                                                                | 1                      | 76                       | von 2.000  | 0                        | von 15  |                        |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei anderen Diagnosen                    | Information            | 8,6%                     |            | 7,4%                     |         |                        |
|                                                                                                | 1                      | 870                      | von 10.070 | 8                        | von 108 |                        |
| Anteil operative Leberentfernung bei Entfernung des Dick-/Enddarms bei Dick- und Enddarmkrebs  | Information            | 4,3%                     |            | 4,9%                     |         |                        |
|                                                                                                | 1                      | 717                      | von 16.578 | 6                        | von 123 |                        |

### Erkrankungen des Magens

|                                                                                                              |                   |           |            |      |         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------|---------|--|
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Magenkrebs (mit und ohne Magenoperation)                                  | Mengeninformation | 45,7 (26) |            | 78   |         |  |
|                                                                                                              | 2                 | 16.139    |            |      |         |  |
| Todesfälle bei Geschwüren an Magen, Zwölffingerdarm oder Dünndarm als Hauptdiagnose (mit und ohne Operation) | Beobachtungswert  | 5,4%      |            | 7,8% |         |  |
|                                                                                                              | 1                 | 1.072     | von 20.006 | 8    | von 103 |  |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2023

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der**

**[Präambel](#)**

| IQM Indikatoren                                                                       | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungswert |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                                                       | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>   |
| Magenentfernungen                                                                     | Mengeninformation<br>2 | 36,4 (13)<br>10.624      | 35                       |                       |
| Todesfälle bei operativer Magenentfernung bei Magenkrebs (exkl. Speiseröhre)          | Beobachtungswert<br>1  | 5,4%<br>114 von 2.096    | 5,3%<br>1 von 19         |                       |
| Todesfälle bei operativer Magenentfernung kombiniert mit Speiseröhreneingriff         | Beobachtungswert<br>1  | 18,1%<br>47 von 259      | 16,7%<br>1 von 6         |                       |
| Todesfälle bei partieller und totaler operativer Magenentfernung bei anderer Diagnose | Beobachtungswert<br>1  | 2,9%<br>240 von 8.269    | 40,0%<br>4 von 10        |                       |
| Eingriffe an der Speiseröhre (Ösophagus)                                              |                        |                          |                          |                       |
| Todesfälle bei komplexen Eingriffen an der Speiseröhre                                | Beobachtungswert<br>1  | 8,9%<br>166 von 1.864    | 27,3%<br>3 von 11        |                       |
| Eingriffe an der Bauchspeicheldrüse (Pankreas)                                        |                        |                          |                          |                       |
| Todesfälle bei Eingriffen an der Bauchspeicheldrüse ohne Transplantation              | Beobachtungswert<br>1  | 9,3%<br>467 von 5.035    | 17,9%<br>7 von 39        |                       |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                         |                        |                          |                          |                       |
| Todesfälle bei operativer Bauchspeicheldrüsenentfernung bei Bauchspeicheldrüsenkrebs  | Beobachtungswert<br>1  | 7,7%<br>229 von 2.966    | 10,7%<br>3 von 28        |                       |
| Anatomische Leberentfernung, Anteil Todesfälle                                        | Beobachtungswert<br>1  | 5,8%<br>157 von 2.692    | 5,0%<br>1 von 20         |                       |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                         |                        |                          |                          |                       |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2023

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

| IQM Indikatoren                                                                                                        | IQM Zielwert      | IQM Durchschnittswert |     |        | Klinik Ist-Wert |     |     | Klinik Erwartungs-wert |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----|--------|-----------------|-----|-----|------------------------|
|                                                                                                                        | Quelle            | Fallzahl              |     |        | Fallzahl        |     |     | SMR                    |
| Gefäßoperationen                                                                                                       |                   |                       |     |        |                 |     |     |                        |
| Operationen der Halsschlagader (Carotis)                                                                               |                   |                       |     |        |                 |     |     |                        |
| Todesfälle bei Operation der Halsschlagader, nur extrakranielle Operationen                                            | <1,09%            | 1,05%                 |     |        | 1,43%           |     |     |                        |
|                                                                                                                        | 1                 | 101                   | von | 9.635  | 1               | von | 70  |                        |
| Todesfälle bei extrakraniellen Gefäßoperationen bei Herz-, Aorten- oder Beinarterienoperationen, Trauma oder HNO-Tumor | Beobachtungswert  | 15,2%                 |     |        | n.a.            |     |     |                        |
|                                                                                                                        | 1                 | 283                   | von | 1.863  | <4              |     |     |                        |
| Eingriffe an der Hauptschlagader                                                                                       |                   |                       |     |        |                 |     |     |                        |
| Operationen an der Hauptschlagader (Aorta)                                                                             | Mengeninformation | 56,1 (31)             |     |        | 44              |     |     |                        |
|                                                                                                                        | 2                 | 10.773                |     |        |                 |     |     |                        |
| Operationen Ersatz der Baucha Schlagader                                                                               | Mengeninformation | 30,4 (25)             |     |        | 36              |     |     |                        |
|                                                                                                                        | 2                 | 5.623                 |     |        |                 |     |     |                        |
| Todesfälle bei offener Operation eines nicht rupturierten Bauchaortenaneurysmas                                        | <7,6%             | 6,7%                  |     |        | n.a.            |     |     |                        |
|                                                                                                                        | 1                 | 57                    | von | 855    | <4              |     |     |                        |
| Todesfälle bei endovaskulärer Stentimplantation eines nicht rupturierten Bauchaortenaneurysmas                         | <1,4%             | 0,7%                  |     |        | 0,0%            |     |     |                        |
|                                                                                                                        | 1                 | 24                    | von | 3.341  | 0               | von | 28  |                        |
| Todesfälle bei Operation der Bauchaorta, nicht bei Aneurysma                                                           | Beobachtungswert  | 6,1%                  |     |        | n.a.            |     |     |                        |
|                                                                                                                        | 1                 | 30                    | von | 492    | <4              |     |     |                        |
| Todesfälle bei rupturiertem Aortenaneurysma                                                                            | Information       | 41,7%                 |     |        | 75,0%           |     |     |                        |
|                                                                                                                        | 1                 | 778                   | von | 1.867  | 6               | von | 8   |                        |
| davon Todesfälle bei Operation eines rupturierten Aortenaneurysmas                                                     | Information       | 34,5%                 |     |        | 71,4%           |     |     |                        |
|                                                                                                                        | 1                 | 345                   | von | 999    | 5               | von | 7   |                        |
| Operationen der Becken-/Bein-Arterien                                                                                  |                   |                       |     |        |                 |     |     |                        |
| Todesfälle bei Operationen der Becken-/Beinarterien                                                                    | Information       | 5,7%                  |     |        | 5,6%            |     |     |                        |
|                                                                                                                        | 1                 | 1.655                 | von | 29.140 | 12              | von | 213 |                        |
| davon Todesfälle bei Schaufensterkrankheit (Claudicatio)                                                               | <0,33%            | 0,2817%               |     |        | 0,0%            |     |     |                        |
|                                                                                                                        | 1                 | 17                    | von | 6.035  | 0               | von | 27  |                        |
| davon Todesfälle bei Ruheschmerz                                                                                       | <2,3%             | 1,3%                  |     |        | 0,0%            |     |     |                        |
|                                                                                                                        | 1                 | 27                    | von | 2.093  | 0               | von | 15  |                        |
| davon Todesfälle bei Ulzeration/Gangrän                                                                                | <4,5%             | 3,8%                  |     |        | 2,6%            |     |     |                        |
|                                                                                                                        | 1                 | 140                   | von | 3.698  | 1               | von | 38  |                        |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                                                             | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungs-wert |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                             | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>    |
| PTA (Perkutan transluminale Gefäßinterventionen)                                                            |                        |                          |                          |                        |
| Behandlungsfälle mit Wiedereröffnung eines verschlossenen Gefäßes mittels Ballonkatheter, Anteil Todesfälle | Beobachtungswert       | 2,9%                     | 2,9%                     |                        |
|                                                                                                             | 1                      | 1.767 von 61.041         | 19 von 656               |                        |
| PTA Abdomen/Beinarterien mit arterieller Operation im gleichen stationären Aufenthalt                       | Mengeninformation      | 45,9 (36)                | 77                       |                        |
|                                                                                                             | 2                      | 10.200                   |                          |                        |
| Arteriovenöser Shunt                                                                                        |                        |                          |                          |                        |
| Anlegen eines arteriovenösen Shunts                                                                         | Mengeninformation      | 29,3 (17)                | 40                       |                        |
|                                                                                                             | 2                      | 5.801                    |                          |                        |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2023

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der**
**[Präambel](#)**

IQM Indikatoren

 IQM  
Zielwert

[Quelle](#)

 IQM  
Durchschnittswert

[Fallzahl](#)

 Klinik  
Ist-Wert

[Fallzahl](#)

 Klinik  
Erwartungs-  
wert

[SMR](#)

## Frauenheilkunde und Geburtshilfe

### Geburtshilfe

|                                                                                             |                  |                             |                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|--|
| Mütterliche Todesfälle bei der Geburt                                                       | <0,005%<br>1     | 0,0049%<br>12 von 243.869   | 0,0%<br>0 von 1.697    |  |
| Anteil vaginale Geburten mit Dammriss 3. und 4. Grades                                      | <2,0%<br>1       | 2,1%<br>3.328 von 162.208   | 1,4%<br>15 von 1.108   |  |
| Anteil vaginale Geburten mit Dammschnitt                                                    | Information<br>1 | 9,6%<br>15.637 von 162.208  | 12,3%<br>136 von 1.108 |  |
| Kaiserschnitttrate, Anteil an allen Geburten                                                | Information<br>1 | 33,5%<br>81.661 von 243.869 | 34,7%<br>589 von 1.697 |  |
| Anteil sanfter Kaiserschnitt (nach Misgav-Ladach), Anteil an allen Kaiserschnittoperationen | Information<br>1 | 78,4%<br>64.042 von 81.661  | 87,6%<br>516 von 589   |  |
| Anteil Kaiserschnitte bei risikoarmer Geburt                                                | Information<br>1 | 28,1%<br>59.928 von 213.073 | 29,9%<br>456 von 1.525 |  |
| davon Anteil Kaiserschnitte bei risikoarmer Geburt                                          | Information<br>1 | 26,0%<br>40.688 von 156.630 | 28,8%<br>334 von 1.161 |  |
| Alle Patient:innen < 35 Jahre                                                               |                  |                             |                        |  |
| davon Anteil Kaiserschnitte bei risikoarmer Geburt                                          | Information<br>1 | 34,1%<br>19.240 von 56.443  | 33,5%<br>122 von 364   |  |
| Alle Patient:innen > 34 Jahre                                                               |                  |                             |                        |  |

### Neugeborene

|                                                         |                        |                         |            |  |
|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|--|
| Neugeborene mit Gewicht < 1.250 Gramm                   | Mengeninformation<br>2 | 23,7 (25)<br>2.398      | 4          |  |
| davon zuverlegte Neugeborene mit Gewicht < 1.250 Gramm  | Mengeninformation<br>2 | 4,4 (1)<br>132          | n.a.<br><4 |  |
| davon Neugeborene mit Gewicht < 500 Gramm               | Mengeninformation<br>2 | 3,5 (3)<br>242          | n.a.<br><4 |  |
| davon Neugeborene mit Gewicht von 1.000 bis 1.249 Gramm | Mengeninformation<br>2 | 10,4 (10)<br>875        | n.a.<br><4 |  |
| Neugeborene mit Gewicht von 1.250 bis 1.499 Gramm       | Mengeninformation<br>2 | 10,1 (8)<br>1.001       | 8          |  |
| Neugeborene mit Gewicht von 1.500 bis 2.499 Gramm       | Mengeninformation<br>2 | 69,9 (26)<br>14.885     | 94         |  |
| Neugeborene mit Gewicht > 2.500 Gramm                   | Mengeninformation<br>2 | 1057,1 (773)<br>242.078 | 1.717      |  |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                                                                             | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                             | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |
| <b>Frauenheilkunde</b>                                                                                                      |                        |                          |                          |                               |
| Todesfälle bei operativer Entfernung der Gebärmutter bei gutartigen Erkrankungen                                            | <0,04%                 | 0,0492%                  | 0,0%                     |                               |
| Alle Patient:innen > 14 Jahre                                                                                               | 1                      | 11 von 22.351            | 0 von 84                 |                               |
| Anteil der Behandlungsfälle mit vaginaler/laparoskopischer Gebärmutterentfernung, ohne plastische Operation                 | >88,4%                 | 89,3%                    | 84,5%                    |                               |
|                                                                                                                             | 1                      | 19.797 von 22.158        | 71 von 84                |                               |
| Anteil der Behandlungsfälle mit vaginaler Gebärmutterentfernung, ohne plastische Operation                                  | Information            | 29,1%                    | 31,0%                    |                               |
|                                                                                                                             | 1                      | 6.439 von 22.158         | 26 von 84                |                               |
| Anteil der Behandlungsfälle mit vaginaler Entfernung durch Zerkleinerung der Gebärmutter                                    | Information            | 5,7%                     | 3,8%                     |                               |
|                                                                                                                             | 1                      | 366 von 6.439            | 1 von 26                 |                               |
| Anteil der Behandlungsfälle mit laparoskopischer Gebärmutterentfernung, ohne plastische Operation                           | Information            | 60,3%                    | 53,6%                    |                               |
|                                                                                                                             | 1                      | 13.358 von 22.158        | 45 von 84                |                               |
| Anteil der Behandlungsfälle mit laparoskopischer Entfernung durch Zerkleinerung der Gebärmutter                             | Information            | 27,5%                    | 24,4%                    |                               |
|                                                                                                                             | 1                      | 3.667 von 13.358         | 11 von 45                |                               |
| Anteil der Behandlungsfälle mit Gebärmutterentfernung und Eierstockentfernung bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose | Information            | 5,7%                     | 0,0%                     |                               |
| Alle Patient:innen < 50 Jahre                                                                                               | 1                      | 420 von 7.325            | 0 von 24                 |                               |
| Anteil der Behandlungsfälle mit Gebärmutterentfernung und Eierstockentfernung bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose | Information            | 31,7%                    | 41,3%                    |                               |
| Alle Patient:innen > 49 Jahre                                                                                               | 1                      | 2.744 von 8.657          | 19 von 46                |                               |
| <b>Bösartige Neubildungen der Brust und der weiblichen Geschlechtsorgane</b>                                                |                        |                          |                          |                               |
| Behandlungsfälle mit Krebserkrankung der Brust oder der Geschlechtsorgane als Hauptdiagnose                                 | Mengeninformation      | 213,4 (67)               | 422                      |                               |
|                                                                                                                             | 2                      | 77.033                   |                          |                               |
| Behandlungsfälle mit Eierstockkrebs als Hauptdiagnose                                                                       | Mengeninformation      | 30,5 (13)                | 61                       |                               |
|                                                                                                                             | 2                      | 9.647                    |                          |                               |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2023

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

| IQM Indikatoren                                                  | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                                                                  | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |
| Todesfälle nach Eierstockentfernung bei Eierstockkrebs           |                        |                          |                          |                               |
|                                                                  | Beobachtungswert       | 1,4%                     | 0,0%                     |                               |
|                                                                  | 1                      | 36 von 2.641             | 0 von 19                 |                               |
| Behandlungsfälle mit Gebärmutterkrebs als Hauptdiagnose          |                        |                          |                          |                               |
|                                                                  | Mengeninformation      | 51,7 (29)                | 101                      |                               |
|                                                                  | 2                      | 15.677                   |                          |                               |
| Todesfälle nach Gebärmutterentfernung bei Gebärmutterkrebs       |                        |                          |                          |                               |
|                                                                  | Beobachtungswert       | 0,74%                    | 0,0%                     |                               |
|                                                                  | 1                      | 45 von 6.083             | 0 von 45                 |                               |
| Behandlungsfälle mit Brustkrebs als Hauptdiagnose                |                        |                          |                          |                               |
|                                                                  | Mengeninformation      | 136,0 (33)               | 244                      |                               |
|                                                                  | 2                      | 47.606                   |                          |                               |
| Eingriffe an der Brust                                           |                        |                          |                          |                               |
| Eingriffe an der Brust                                           |                        |                          |                          |                               |
|                                                                  | Mengeninformation      | 167,2 (121)              | 160                      |                               |
|                                                                  | 2                      | 42.291                   |                          |                               |
| Operationen der Brust bei Brustkrebs                             |                        |                          |                          |                               |
|                                                                  | Mengeninformation      | 149,9 (125)              | 140                      |                               |
|                                                                  | 2                      | 31.181                   |                          |                               |
| Anteil brusterhaltender Operationen bei Brustkrebs               |                        |                          |                          |                               |
|                                                                  | Information            | 72,1%                    | 72,1%                    |                               |
|                                                                  | 1                      | 22.484 von 31.181        | 101 von 140              |                               |
| Eingriffe am Beckenboden bei der Frau                            |                        |                          |                          |                               |
| Beckenbodenoperationen mit und ohne plastische Operation, gesamt |                        |                          |                          |                               |
|                                                                  | Mengeninformation      | 72,5 (54)                | 89                       |                               |
|                                                                  | 2                      | 20.359                   |                          |                               |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2023

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der****[Präambel](#)**

IQM Indikatoren

IQM  
Zielwert[Quelle](#)IQM  
Durchschnittswert[Fallzahl](#)Klinik  
Ist-Wert[Fallzahl](#)Klinik  
Erwartungs-  
wert[SMR](#)

## Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe

### Bösartige Neubildungen des Bewegungsapparates

Behandlungsfälle mit bösartiger Neubildung an  
Knochen, Gelenkknorpel, peripheren Nerven,  
Retroperitoneum, Bindegewebe, Weichteilen

Mengeninformation

2

43,1 (5)

14.443

17

### Gelenkersatz (Endoprothetik)

Todesfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation)  
bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung

&lt;0,13%

1

0,0845%

51 von 60.341

0,463%

1 von 216

Todesfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation)  
bei hüftgelenksnahen Frakturen

Beobachtungswert

1

5,2%

1.115 von 21.648

8,2%

14 von 171

Todesfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation)  
bei anderen Diagnosen

Beobachtungswert

1

5,7%

382 von 6.712

11,1%

5 von 45

Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle  
bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei  
Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung

Beobachtungswert

1

2,4%

1.442 von 60.341

6,9%

15 von 216

Todesfälle bei Wechsel Hüftgelenkersatz ohne  
Fraktur oder Infektion bei Aufnahme

&lt;1,38%

1

1,35%

66 von 4.881

5,88%

1 von 17

davon Todesfälle bei Wechsel Hüftgelenkersatz mit  
Sonderprothesen

Information

1

1,0%

9 von 933

n.a.

&lt;4

Todesfälle bei Wechsel Hüftgelenkersatz wegen  
Fraktur oder Infektion

Beobachtungswert

1

4,6%

187 von 4.097

0,0%

0 von 24

Todesfälle bei Kniegelenkersatz (Erstimplantation)  
bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung

&lt;0,06%

1

0,0442%

27 von 61.154

0,0%

0 von 190

Todesfälle bei Kniegelenkersatz (Erstimplantation)  
bei anderen Diagnosen

Beobachtungswert

1

0,3313%

12 von 3.622

n.a.

&lt;4

Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle  
bei Kniegelenkersatz (Erstimplantation) bei  
Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung

Beobachtungswert

1

1,6%

975 von 61.154

2,1%

4 von 190

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2023

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

| IQM Indikatoren                                                                                                                 | IQM Zielwert      | IQM Durchschnittswert |     |        | Klinik Ist-Wert |     |     | Klinik Erwartungs-wert |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----|--------|-----------------|-----|-----|------------------------|
|                                                                                                                                 | Quelle            | Fallzahl              |     |        | Fallzahl        |     |     | SMR                    |
| Todesfälle bei Wechsel Kniegelenkersatz oder -teilersatz bei Aufnahme                                                           | <0,16%            | 0,3995%               |     |        | 0,0%            |     |     |                        |
|                                                                                                                                 | 1                 | 20                    | von | 5.006  | 0               | von | 16  |                        |
| davon Todesfälle bei Wechsel Kniegelenkersatz mit Sonderprothesen                                                               | Information       | 0,456%                |     |        | n.a.            |     |     |                        |
|                                                                                                                                 | 1                 | 7                     | von | 1.535  | <4              |     |     |                        |
| Todesfälle bei Wechsel Kniegelenkersatz wegen Fraktur oder Infektion                                                            | Beobachtungswert  | 3,2%                  |     |        | 5,6%            |     |     |                        |
|                                                                                                                                 | 1                 | 66                    | von | 2.092  | 1               | von | 18  |                        |
| Todesfälle bei Hüft- oder Kniegelenkersatz bei Tumorerkrankung                                                                  | Beobachtungswert  | 7,4%                  |     |        | 8,3%            |     |     |                        |
|                                                                                                                                 | 1                 | 178                   | von | 2.404  | 1               | von | 12  |                        |
| Hüftgelenknahe Frakturen                                                                                                        |                   |                       |     |        |                 |     |     |                        |
| Todesfälle nach operativer Versorgung einer Schenkelhalsfraktur                                                                 | < Erwartungswert  | 4,7%                  |     |        | 8,2%            |     |     | 5,5%                   |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                                                   | 1                 | 1.118                 | von | 23.922 | 14              | von | 170 | 1,49                   |
| Todesfälle nach Gelenkersatz bei Schenkelhalsfraktur                                                                            | Beobachtungswert  | 5,1%                  |     |        | 8,5%            |     |     |                        |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                                                   | 1                 | 1.075                 | von | 21.194 | 14              | von | 165 |                        |
| Todesfälle nach Osteosynthese (Verbindung der Knochenfragmente durch Platten, Schrauben oder Nägel) bei Schenkelhalsfraktur     | Beobachtungswert  | 1,6%                  |     |        | 0,0%            |     |     |                        |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                                                   | 1                 | 43                    | von | 2.728  | 0               | von | 5   |                        |
| Todesfälle nach operativer Versorgung einer pertrochantären Fraktur                                                             | < Erwartungswert  | 4,8%                  |     |        | 2,8%            |     |     | 6,1%                   |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                                                   | 1                 | 957                   | von | 19.901 | 4               | von | 145 | 0,45                   |
| Todesfälle nach Gelenkersatz bei pertrochantärer Fraktur                                                                        | Beobachtungswert  | 9,0%                  |     |        | 0,0%            |     |     |                        |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                                                   | 1                 | 38                    | von | 422    | 0               | von | 6   |                        |
| Todesfälle nach Osteosynthese (Verbindung der Knochenfragmente durch Platten, Schrauben oder Nägel) bei pertrochantärer Fraktur | Beobachtungswert  | 4,7%                  |     |        | 2,9%            |     |     |                        |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                                                   | 1                 | 919                   | von | 19.479 | 4               | von | 139 |                        |
| Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark                                                                                |                   |                       |     |        |                 |     |     |                        |
| Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark (ohne lokale Schmerztherapien)                                                 | Mengeninformation | 320,5 (208)           |     |        | 415             |     |     |                        |
|                                                                                                                                 | 2                 | 113.450               |     |        |                 |     |     |                        |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder Wirbelkörper-Ersatz bei Tumor (inkl. komplexe Rekonstruktionen)                    | Beobachtungswert  | 7,9%                  |     |        | 2,8%            |     |     |                        |
|                                                                                                                                 | 1                 | 265                   | von | 3.351  | 1               | von | 36  |                        |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2023

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

| IQM Indikatoren                                                                                                                    | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    |            | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungswert |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                    | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> |            | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>   |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder Wirbelkörper-Ersatz bei Trauma (inkl. komplexe Rekonstruktionen, Rückenmarkoperation) | Beobachtungswert<br>1  | 514                      | von 14.514 | 12                       | von 177               |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Operation bei Entzündung der Bandscheibe oder des Rückenmarks                                          | Beobachtungswert<br>1  | 193                      | von 2.439  | 3                        | von 14                |
| Todesfälle bei komplexen Rekonstruktionen der Wirbelsäule (ohne Tumor oder Trauma)                                                 | Beobachtungswert<br>1  | 0,7134%<br>6             | von 841    | n.a.                     | <4                    |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder 1 Wirbelkörper-Ersatz (ohne Tumor, Trauma oder kompl. Rekonstruktionen)               | Beobachtungswert<br>1  | 22                       | von 13.018 | 0                        | von 16                |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder 2 Wirbelkörper-Ersatz (ohne Tumor, Trauma oder kompl. Rekonstruktionen)               | Beobachtungswert<br>1  | 14                       | von 6.867  | 0                        | von 14                |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder 3 oder mehr Wirbelkörper-Ersatz (ohne Tumor, Trauma oder kompl. Rekonstruktionen)     | Beobachtungswert<br>1  | 39                       | von 5.254  | 0                        | von 4                 |
| Todesfälle bei alleiniger 'Entlastung' (Dekompression) der Wirbelsäule                                                             | Beobachtungswert<br>1  | 17                       | von 23.310 | 0                        | von 16                |
| Todesfälle bei 'einfachen' Bandscheibenentfernungen                                                                                | <0,03%<br>1            | 2                        | von 16.176 | 0                        | von 41                |
| Todesfälle bei Vertebro-/Kyphoplastie (ohne Tumor, kompl. Rekonstruktion, Versteifung, WK-Ersatz oder Bandscheibeneingriffe)       | <0,53%<br>1            | 34                       | von 6.450  | 0                        | von 48                |
| Todesfälle bei anderen Operationen an der Wirbelsäule oder am Rückenmark                                                           | Beobachtungswert<br>1  | 394                      | von 21.230 | 0                        | von 48                |
| Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei 'einfachen' Bandscheibenentfernungen                                         | Beobachtungswert<br>1  | 83                       | von 16.176 | 0                        | von 41                |
| Lokale Schmerztherapie an der Wirbelsäule (ohne andere Wirbelsäulenoperation)                                                      | Mengeninformation<br>2 | 81,0 (33)                | 27.774     | 53                       |                       |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                                                                           | <div>IQM<br/>Zielwert</div> <div><a href="#">Quelle</a></div> | <div>IQM<br/>Durchschnittswert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Ist-Wert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Erwartungs-<br/>wert</div> <div><a href="#">SMR</a></div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           |                                                               |                                                                          |                                                                    |                                                                           |
| Behandlungsfälle mit Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen als Hauptdiagnose ohne Operation oder lokale Schmerztherapie | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div>                     | <div>129,7 (109)</div> <div>53.308</div>                                 | <div>107</div>                                                     |                                                                           |
| Operationen am Bewegungsapparat inkl. Endoprothetik                                                                       |                                                               |                                                                          |                                                                    |                                                                           |
| Gelenkersatz am Schulter-/ Ellenbogengelenk                                                                               | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div>                     | <div>35,7 (26)</div> <div>12.571</div>                                   | <div>124</div>                                                     |                                                                           |
| Mehrfachverletzungen - Polytraumen                                                                                        |                                                               |                                                                          |                                                                    |                                                                           |
| Mehrfachverletzungen (Polytraumen) im Sinne der DRG-Definition                                                            | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div>                     | <div>21,4 (8)</div> <div>7.373</div>                                     | <div>62</div>                                                      |                                                                           |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2023

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |

## Urologie

### Operationen der Niere

|                                                                                             |                       |                          |                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--|
| Todesfälle bei Totalentfernung der Niere bei bösartiger Neubildung                          | <1,8%<br>1            | 1,3%<br>43 von 3.384     | 0,0%<br>0 von 11    |  |
| Anteil laparoskopischer Operationen bei Totalentfernung der Niere bei bösartiger Neubildung | Information<br>1      | 46,1%<br>1.559 von 3.384 | 100,0%<br>11 von 11 |  |
| Todesfälle bei Teilentfernung der Niere bei bösartiger Neubildung                           | <0,35%<br>1           | 0,2538%<br>9 von 3.546   | 0,0%<br>0 von 12    |  |
| Anteil laparoskopischer Operationen bei Teilentfernung der Niere bei bösartiger Neubildung  | Information<br>1      | 59,1%<br>2.096 von 3.546 | 100,0%<br>12 von 12 |  |
| Anteil der Teilentfernungen der Niere bei bösartiger Neubildung                             | Information<br>1      | 51,2%<br>3.546 von 6.930 | 52,2%<br>12 von 23  |  |
| Todesfälle bei Totalentfernung der Niere bei anderer Diagnose                               | Beobachtungswert<br>1 | 3,9%<br>82 von 2.086     | 0,0%<br>0 von 4     |  |
| Todesfälle bei Teilentfernung der Niere bei anderer Diagnose                                | Beobachtungswert<br>1 | 0,1654%<br>2 von 1.209   | 0,0%<br>0 von 7     |  |

## Harnblase

|                                                                                             |                        |                           |                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|--|
| Behandlungsfälle mit Blasenkrebs als Hauptdiagnose                                          | Mengeninformation<br>2 | 136,3 (46)<br>44.148      | 240                 |  |
| Operationen an der Harnblase durch die Harnröhre                                            | Mengeninformation<br>2 | 214,2 (207)<br>44.556     | 296                 |  |
| davon Entfernung des Tumorgewebes durch die Harnröhre                                       | Mengeninformation<br>2 | 168,7 (151)<br>31.552     | 217                 |  |
| Anteil Entfernung des Tumorgewebes durch die Harnröhre mit Einbringen von Chemotherapeutika | Beobachtungswert<br>1  | 18,1%<br>5.716 von 31.552 | 39,2%<br>85 von 217 |  |
| Todesfälle bei vollständiger Entnahme aller Organe des kleinen Beckens bei Mann oder Frau   | Beobachtungswert<br>1  | 6,0%<br>32 von 536        | n.a.<br><4          |  |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2023

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

| IQM Indikatoren                                                                                                        | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungs-wert |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                                        | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>    |
| <b>Prostata</b>                                                                                                        |                        |                          |                          |                        |
| Todesfälle bei Operationen der Prostata durch die Harnröhre                                                            | <0,2%                  | 0,1542%                  | 0,0%                     |                        |
|                                                                                                                        | 1                      | 39 von 25.286            | 0 von 113                |                        |
| Todesfälle bei Operationen der Prostata durch die Harnröhre bei bösartigen Erkrankungen                                | Beobachtungswert       | 0,6955%                  | 0,0%                     |                        |
|                                                                                                                        | 1                      | 49 von 7.045             | 0 von 35                 |                        |
| Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei Behandlungsfällen mit Operation der Prostata durch die Harnröhre | Beobachtungswert       | 3,5%                     | 3,4%                     |                        |
|                                                                                                                        | 1                      | 1.129 von 32.331         | 5 von 148                |                        |
| Behandlungsfälle mit Prostatakrebs als Hauptdiagnose                                                                   | Mengeninformation      | 101,8 (23)               | 174                      |                        |
|                                                                                                                        | 2                      | 34.829                   |                          |                        |
| Todesfälle bei radikaler Prostataentfernung                                                                            | <0,16%                 | 0,1882%                  | 0,0%                     |                        |
|                                                                                                                        | 1                      | 24 von 12.755            | 0 von 101                |                        |
| <b>Nierensteine</b>                                                                                                    |                        |                          |                          |                        |
| Behandlungsfälle mit Nierensteinen als Hauptdiagnose                                                                   | Mengeninformation      | 193,8 (47)               | 281                      |                        |
|                                                                                                                        | 2                      | 70.929                   |                          |                        |
| Anteil der Behandlungsfälle mit Intervention zur Steinentfernung                                                       | Information            | 53,4%                    | 59,1%                    |                        |
|                                                                                                                        | 1                      | 37.870 von 70.929        | 166 von 281              |                        |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | <div>IQM<br/>Zielwert</div> <div><a href="#">Quelle</a></div> | <div>IQM<br/>Durchschnittswert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Ist-Wert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Erwartungs-<br/>wert</div> <div><a href="#">SMR</a></div> |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

Hautkrankheiten

Hautkrankheiten

|                                                             |                                           |                                       |               |  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--|
| Behandlungsfälle mit Melanom als Hauptdiagnose              | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div> | <div>46,1 (5)</div> <div>13.053</div> | <div>15</div> |  |
| Behandlungsfälle mit Dermatitis und Ekzem als Hauptdiagnose | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div> | <div>33,2 (5)</div> <div>11.493</div> | <div>17</div> |  |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2023

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

| IQM Indikatoren                                                                                              | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert      | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungswert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                                                                              | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a>   | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>   |
| <b>Intensivmedizin</b>                                                                                       |                        |                            |                          |                       |
| <b>Intensivmedizin</b>                                                                                       |                        |                            |                          |                       |
| Todesfälle bei Beatmung > 24 Stunden ohne Neugeborene                                                        | Beobachtungswert<br>1  | 35,6%<br>33.011 von 92.799 | 39,7%<br>156 von 393     |                       |
| Todesfälle bei Beatmung > 24 Stunden ohne Neugeborene und ohne COVID-19 Fälle                                | <35,9%<br>1            | 35,0%<br>29.849 von 85.353 | 37,6%<br>136 von 362     |                       |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) als Hauptdiagnose                                                     | < Erwartungswert<br>1  | 33,3%<br>10.295 von 30.870 | 36,3%<br>87 von 240      | 34,1%<br>1,06         |
| davon Todesfälle bei Sepsis mit Organversagen/Schock (als Hauptdiagnose)                                     | Beobachtungswert<br>1  | 35,6%<br>9.781 von 27.479  | 37,9%<br>81 von 214      |                       |
| davon Todesfälle bei Sepsis ohne Organversagen/Schock (als Hauptdiagnose)                                    | Beobachtungswert<br>1  | 15,2%<br>514 von 3.391     | 23,1%<br>6 von 26        |                       |
| Todesfälle bei Sepsis (als Nebendiagnose)                                                                    | Beobachtungswert<br>1  | 37,9%<br>24.199 von 63.870 | 33,5%<br>151 von 451     |                       |
| davon Todesfälle bei Sepsis mit Organversagen/Schock (als Nebendiagnose)                                     | Beobachtungswert<br>1  | 39,2%<br>23.621 von 60.313 | 34,3%<br>145 von 423     |                       |
| Anteil Todesfälle bei generalisierter Entzündungsreaktion des gesamten Körpers ohne Organkomplikation (SIRS) | Information<br>1       | 7,3%<br>3.659 von 49.942   | 7,3%<br>82 von 1.120     |                       |
| <b>Angeborene Gerinnungsstörung</b>                                                                          |                        |                            |                          |                       |
| Behandlungsfälle mit angeborenen Gerinnungsstörungen                                                         | Mengeninformation<br>2 | 28,1 (14)<br>11.231        | 43                       |                       |
| davon operierte Behandlungsfälle (mit angeborenen Gerinnungsstörungen)                                       | Mengeninformation<br>2 | 18,8 (9)<br>7.177          | 19                       |                       |
| <b>Obduktionen</b>                                                                                           |                        |                            |                          |                       |
| Obduktionsrate                                                                                               | Information<br>1       | 0,81%<br>1.377 von 169.507 | 0,0%<br>0 von 1.095      |                       |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                         | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                                         | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |
| Palliativmedizin                        |                        |                          |                          |                               |
| Palliativmedizin                        |                        |                          |                          |                               |
| Palliativmedizinische Komplexbehandlung | Mengeninformation      | 202,0 (133)              | 251                      |                               |
|                                         | 2                      | 46.252                   |                          |                               |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                | <div>IQM<br/>Zielwert</div> <div><a href="#">Quelle</a></div> | <div>IQM<br/>Durchschnittswert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Ist-Wert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Erwartungs-<br/>wert</div> <div><a href="#">SMR</a></div> |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                                                               |                                                                          |                                                                    |                                                                           |
| Roboterassistierte Eingriffe                   |                                                               |                                                                          |                                                                    |                                                                           |
| Roboterassistierte Eingriffe                   |                                                               |                                                                          |                                                                    |                                                                           |
| Urologische Eingriffe mittels Roboterchirurgie | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div>                     | <div>142 (116)</div> <div>12.922</div>                                   | <div>124</div>                                                     |                                                                           |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

Präambel

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |

## COVID-19 Kennzahlen

### COVID-19 Kennzahlen

|                                                                                        |                  |                                  |                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------|--|
| Behandlungsfälle mit Testung auf COVID-19-Infektion                                    | Information<br>1 | 31,0%<br>1.932.638 von 6.234.399 | 24,8%<br>7.221 von 29.160 |  |
| Anteil positiver Virusnachweis auf COVID-19 von allen getesteten Behandlungsfällen     | Information<br>1 | 8,7%<br>168.657 von 1.932.638    | 12,6%<br>913 von 7.221    |  |
| COVID-19 positiver Virusnachweis von allen Behandlungsfällen                           | Information<br>1 | 2,7%<br>168.657 von 6.234.399    | 3,1%<br>913 von 29.160    |  |
| COVID-19 - Anteil von Behandlungsfällen ohne Virusnachweis                             | Information<br>1 | 0,3%<br>15.596 von 6.234.399     | 0,1%<br>18 von 29.160     |  |
| COVID-19 - Behandlungsfälle mit Virusnachweis und schweren akuten Atemwegserkrankungen | Information<br>1 | 33,8%<br>57.036 von 168.657      | 51,7%<br>472 von 913      |  |
| COVID-19 - Behandlungsfälle mit Virusnachweis und ausgewählten Vorerkrankungen         | Information<br>1 | 80,3%<br>135.474 von 168.657     | 82,8%<br>756 von 913      |  |
| COVID-19 - Mortalität bei Virusnachweis                                                | Information<br>1 | 8,7%<br>14.592 von 168.657       | 10,5%<br>96 von 913       |  |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2022

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der**

**[Präambel](#)**

IQM Indikatoren

IQM  
Zielwert

[Quelle](#)

IQM  
Durchschnittswert

[Fallzahl](#)

Klinik  
Ist-Wert

[Fallzahl](#)

Klinik  
Erwartungs-  
wert

[SMR](#)

## Herzerkrankungen

### Herzinfarkt

|                                                            |                  |                   |             |       |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|-------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Herzinfarkt                   | < Erwartungswert | 7,9%              | 10,7%       | 8,2%  |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                              | 1                | 5.985 von 75.638  | 44 von 410  | 1,30  |
| Anteil der Herzinfarkte mit Linksherzkatheter              | Information      | 85,1%             | 91,5%       |       |
|                                                            | 1                | 64.391 von 75.638 | 375 von 410 |       |
| Todesfälle bei Direktaufnahme ohne Verlegung               | Beobachtungswert | 7,8%              | 10,8%       |       |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                              | 1                | 5.373 von 68.448  | 44 von 406  |       |
| Anteil Transmuraler Herzinfarkte (STEMI)                   | Information      | 33,7%             | 40,5%       |       |
|                                                            | 1                | 25.485 von 75.551 | 166 von 410 |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Transmuraler Herzinfarkt      | < Erwartungswert | 11,8%             | 17,5%       | 11,4% |
|                                                            | 1                | 3.015 von 25.485  | 29 von 166  |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Nichttransmuraler Herzinfarkt | < Erwartungswert | 5,4%              | 5,8%        | 6,3%  |
|                                                            | 1                | 2.685 von 49.354  | 14 von 243  |       |
| Todesfälle bei Nebendiagnose Herzinfarkt                   | Beobachtungswert | 19,8%             | 21,5%       |       |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                              | 1                | 4.314 von 21.826  | 14 von 65   |       |

### Herzinsuffizienz

|                                                                                |                  |                    |               |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------|------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Herzinsuffizienz                                  | < Erwartungswert | 8,5%               | 9,2%          | 9,9% |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                  | 1                | 13.946 von 163.930 | 100 von 1.091 | 0,93 |
| Linksherzinsuffizienz, Anteil mit Beschwerden bereits im Ruhezustand (NYHA IV) | Information      | 49,1%              | 47,4%         |      |
|                                                                                | 1                | 53.024 von 107.883 | 127 von 268   |      |

### Linksherzkatheter

|                                                                                                                                                                          |                   |                   |            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------|
| Anzahl aller Linksherzkatheter zur Koronardiagnostik                                                                                                                     | Mengeninformation | 823,8 (670)       | 1.366      |      |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                                                                                            | 2                 | 281.748           |            |      |
| Todesfälle mit Linksherzkatheter bei Herzinfarkt, bezogen auf Behandlungsfälle mit Herzinfarkt und Linksherzkatheter                                                     | < Erwartungswert  | 6,3%              | 8,5%       | 6,4% |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                                                                                            | 1                 | 3.997 von 63.021  | 32 von 375 | 1,34 |
| Behandlungsfälle mit diagnostischem Linksherzkatheter bei allen Erkrankungen (oder Z.n. Reanimation), ohne Hauptdiagnose Herzinfarkt und ohne Herz-OP, Anteil Todesfälle | <1,6%             | 1,7%              | 1,3%       |      |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                                                                                            | 1                 | 2.173 von 129.883 | 7 von 528  |      |
| Behandlungsfälle mit therapeutischem Linksherzkatheter ohne Hauptdiagnose Herzinfarkt und ohne Herz-OP, Anteil Todesfälle                                                | Beobachtungswert  | 1,9%              | 2,6%       |      |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                                                                                            | 1                 | 1.454 von 75.776  | 12 von 456 |      |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2022

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

| IQM Indikatoren                                                                                                      | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert    | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                      | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a>    | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |
| <b>Anteil der Behandlungen mit therapeutischem Linksherzkatheter ohne Hauptdiagnose Herzinfarkt und ohne Herz-OP</b> |                        |                             |                          |                               |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                                        | Information<br>1       | 36,8%<br>75.776 von 205.659 | 46,3%<br>456 von 984     |                               |
| <b>Linksherzkatheterfälle bei Kindern und Jugendlichen</b>                                                           |                        |                             |                          |                               |
| Alle Patient:innen < 20 Jahre                                                                                        | Mengeninformation<br>2 | 22,0 (2)<br>2.509           | n.a.<br><4               |                               |
| <b>Herzrhythmusstörungen</b>                                                                                         |                        |                             |                          |                               |
| Behandlungsfälle mit Herzrhythmusstörungen als Hauptdiagnose                                                         | Mengeninformation<br>2 | 440,0 (291)<br>173.349      | 979                      |                               |
| <b>Schrittmacher/Defibrillator Implantation</b>                                                                      |                        |                             |                          |                               |
| Implantation eines Herzschrittmachers/Defibrillators                                                                 | Mengeninformation<br>2 | 145,8 (101)<br>49.587       | 201                      |                               |
| davon Einsatz oder Wechsel von Defibrillatoren                                                                       | Mengeninformation<br>2 | 51,7 (34)<br>13.491         | 60                       |                               |
| <b>Ablative Therapie</b>                                                                                             |                        |                             |                          |                               |
| Behandlungsfälle mit kathetergestützter ablativer Therapie                                                           | Mengeninformation<br>2 | 243,3 (167)<br>46.966       | 165                      |                               |
| davon Vorhofablation bei Vorhofflimmern/-flattern, Anteil Todesfälle                                                 | Information<br>1       | 0,0988%<br>29 von 29.358    | 0,0%<br>0 von 109        |                               |
| <b>Operationen am Herzen</b>                                                                                         |                        |                             |                          |                               |
| Behandlungsfälle mit Herzoperationen                                                                                 | Mengeninformation<br>2 | 237,9 (11)<br>47.827        | 4                        |                               |
| davon andere Operationen am Herzen                                                                                   | Mengeninformation<br>2 | 49,1 (3)<br>8.389           | 4                        |                               |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2022

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |

## Erkrankungen des Nervensystems und Schlaganfall

### Bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhaut

|                                                                         |                   |          |   |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---|--|
| Bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhäute als Hauptdiagnose | Mengeninformation | 32,9 (7) | 9 |  |
|                                                                         | 2                 | 9.175    |   |  |

### Todesfälle bei Hauptdiagnose Schlaganfall

|                                               |                  |                    |           |  |
|-----------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------|--|
| Todesfälle bei allen Formen des Schlaganfalls | Beobachtungswert | 10,5%              | 32,4%     |  |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                 | 1                | 11.413 von 108.989 | 11 von 34 |  |

### Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirninfarkt

|                               |                  |                  |          |  |
|-------------------------------|------------------|------------------|----------|--|
| Todesfälle bei Hirninfarkt    | Beobachtungswert | 7,8%             | 14,3%    |  |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre | 1                | 7.299 von 93.757 | 2 von 14 |  |

|                                                                                       |             |                   |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------|--|
| Anteil der Hirninfarkte mit medikamentöser Auflösung des Blutgerinnsels (Thrombolyse) | Information | 16,0%             | 0,0%     |  |
|                                                                                       | 1           | 14.996 von 93.757 | 0 von 14 |  |

|                                                                                          |             |                  |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|--|
| Anteil der Hirninfarkte mit Entfernung des Blutgerinnsels durch Katheter (Thrombektomie) | Information | 9,5%             | 0,0%     |  |
|                                                                                          | 1           | 8.900 von 93.757 | 0 von 14 |  |

|                                              |                  |                  |          |  |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|----------|--|
| Anteil der Hirninfarkte mit Lungenentzündung | Beobachtungswert | 9,9%             | 0,0%     |  |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                | 1                | 9.318 von 93.757 | 0 von 14 |  |

### Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirnblutung

|                                            |                  |                  |          |  |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|----------|--|
| Todesfälle bei Hirnblutung (intrazerebral) | Beobachtungswert | 29,6%            | 53,3%    |  |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre              | 1                | 3.402 von 11.485 | 8 von 15 |  |

|                                             |                  |               |         |  |
|---------------------------------------------|------------------|---------------|---------|--|
| Todesfälle bei Hirnblutung (subarachnoidal) | Beobachtungswert | 19,6%         | 20,0%   |  |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre               | 1                | 682 von 3.480 | 1 von 5 |  |

|                                              |        |                 |          |  |
|----------------------------------------------|--------|-----------------|----------|--|
| Anteil nicht näher bezeichneter Schlaganfall | <0,42% | 0,24%           | 0,0%     |  |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                | 1      | 267 von 108.989 | 0 von 34 |  |

### Behandlung auf einer Stroke Unit

|                                                                |             |                   |          |  |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------|--|
| Hirninfarkte mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung | Information | 73,8%             | 0,0%     |  |
|                                                                | 1           | 69.165 von 93.757 | 0 von 14 |  |

|                                                                                                                               |             |                    |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|----------|--|
| Hirninfarkt oder TIA mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung ohne Zuverlegungen (in Anlehnung Schlaganfallregister) | Information | 73,3%              | 0,0%     |  |
|                                                                                                                               | 1           | 88.991 von 121.439 | 0 von 14 |  |

### Epilepsie

|                                              |                   |            |    |  |
|----------------------------------------------|-------------------|------------|----|--|
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Epilepsie | Mengeninformation | 110,7 (35) | 11 |  |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                | 2                 | 40.505     |    |  |
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Epilepsie | Mengeninformation | 51,0 (16)  | 10 |  |
| Alle Patient:innen < 20 Jahre                | 2                 | 11.010     |    |  |

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | <div>IQM Zielwert</div> <div><a href="#">Quelle</a></div> | <div>IQM Durchschnittswert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik Ist-Wert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik Erwartungs-wert</div> <div><a href="#">SMR</a></div> |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

Altersmedizin

Geriatrische Frührehabilitation

|                                                       |                                           |                                          |                |  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--|
| Behandlungsfälle mit geriatrischer Frührehabilitation | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div> | <div>410,3 (328)</div> <div>99.293</div> | <div>164</div> |  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--|

Mangelernährung bei Älteren

|                                                                                        |                                     |                                                  |                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Behandlungsfälle mit erheblicher Mangelernährung, >= 65 Jahre und ohne Tumorerkrankung | <div>Information</div> <div>1</div> | <div>0,94%</div> <div>22.614 von 2.406.736</div> | <div>0,47%</div> <div>61 von 12.923</div> |  |
| Behandlungsfälle mit Sondenernährung/Infusionsernährung                                | <div>Information</div> <div>1</div> | <div>2,0%</div> <div>448 von 22.614</div>        | <div>0,0%</div> <div>0 von 61</div>       |  |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2022

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der****[Präambel](#)**

IQM Indikatoren

IQM  
Zielwert[Quelle](#)IQM  
Durchschnittswert[Fallzahl](#)Klinik  
Ist-Wert[Fallzahl](#)Klinik  
Erwartungs-  
wert[SMR](#)

## Lungenerkrankungen

### Lungenentzündung (Pneumonie)

|                                                                                                |                  |                    |               |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------|-------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung                                                  | < Erwartungswert | 15,3%              | 13,9%         | 16,7% |
| alle Altersgruppen                                                                             | 1                | 20.967 von 137.340 | 215 von 1.544 |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung ohne Zuverlegung, Tumor, Mukoviszidose           | < Erwartungswert | 14,1%              | 14,2%         | 16,3% |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                  | 1                | 11.884 von 84.192  | 111 von 781   |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung ohne Zuverlegung, Tumor, Mukoviszidose, COVID-19 | < Erwartungswert | 10,9%              | 11,1%         | 13,5% |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                  | 1                | 5.654 von 51.812   | 62 von 557    | 0,82  |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung ohne Zuverlegung, Tumor, Mukoviszidose           | Beobachtungswert | 0,44%              | 0,0%          |       |
| Alle Patient:innen < 20 Jahre                                                                  | 1                | 47 von 10.734      | 0 von 138     |       |
| Todesfälle bei Lungenentzündung durch Aspiration von Nahrungsmitteln oder Mageninhalt          | Beobachtungswert | 29,9%              | 18,8%         |       |
|                                                                                                | 1                | 3.776 von 12.646   | 35 von 186    |       |
| Todesfälle bei Bronchitis oder Bronchiolitis ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose          | < Erwartungswert | 2,2%               | 1,6%          | 3,1%  |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                  | 1                | 236 von 10.758     | 2 von 122     |       |

### COPD (Chronisch obstruktive Lungenerkrankung)

|                               |                  |                  |            |      |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------|------|
| Todesfälle bei COPD           | < Erwartungswert | 5,3%             | 4,2%       | 5,5% |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre | 1                | 3.285 von 61.769 | 14 von 337 | 0,76 |

### Lungenkrebs

|                                                |                   |            |     |  |
|------------------------------------------------|-------------------|------------|-----|--|
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Lungenkrebs | Mengeninformation | 182,0 (47) | 372 |  |
|                                                | 2                 | 69.723     |     |  |

### Operationen an der Lunge

|                                                                                                       |                  |                |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------|--|
| Todesfälle bei größeren operativen Entfernungen von Lunge/Bronchien                                   | Beobachtungswert | 2,5%           | 1,3%     |  |
|                                                                                                       | 1                | 317 von 12.920 | 1 von 78 |  |
| Todesfälle bei operativer Teilentfernung eines Lungenflügels bei Lungenkrebs                          | <2,0%            | 2,1%           | 3,0%     |  |
|                                                                                                       | 1                | 121 von 5.698  | 1 von 33 |  |
| Anteil der operativen Entfernungen eines Lungenflügels bei Lungenkrebsbehandlungsfällen               | <20%             | 4,2%           | 0,0%     |  |
|                                                                                                       | 1 / 3            | 252 von 5.950  | 0 von 33 |  |
| Anteil der bronchioangioplastischen Entfernungen eines Lungenflügels bei Lungenkrebsbehandlungsfällen | Beobachtungswert | 7,6%           | 12,1%    |  |
|                                                                                                       | 1                | 435 von 5.698  | 4 von 33 |  |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2022

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der**
**[Präambel](#)**

IQM Indikatoren

 IQM  
Zielwert

[Quelle](#)

 IQM  
Durchschnittswert

[Fallzahl](#)

 Klinik  
Ist-Wert

[Fallzahl](#)

 Klinik  
Erwartungs-  
wert

[SMR](#)

## Erkrankungen der Bauchorgane

### Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen

|                                                                    |                  |                   |             |  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|--|
| Anteil laparoskopische Operationen                                 | >95,1%           | 95,1%             | 91,8%       |  |
|                                                                    | 1                | 48.890 von 51.424 | 268 von 292 |  |
| Anteil Umsteiger auf offene Operationen                            | Beobachtungswert | 2,9%              | 4,8%        |  |
|                                                                    | 1                | 1.508 von 51.424  | 14 von 292  |  |
| Anteil Todesfälle bei Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen | <0,6%            | 0,5853%           | 0,0%        |  |
|                                                                    | 1                | 301 von 51.424    | 0 von 292   |  |

### Operation von Leisten-, Schenkel- und Nabelbrüchen (Hernien)

|                                                               |                  |                   |             |  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|--|
| Todesfälle bei Bruchoperationen ohne anteilige Darmentfernung | <0,12%           | 0,1279%           | 0,0%        |  |
|                                                               | 1                | 87 von 68.044     | 0 von 361   |  |
| Todesfälle bei Bruchoperationen mit anteiliger Darmentfernung | Beobachtungswert | 2,3%              | 2,4%        |  |
|                                                               | 1                | 157 von 6.797     | 1 von 42    |  |
| Anteil Leistenbruchoperationen mit Netz                       | Information      | 10,4%             | n.a.        |  |
| Alle Patient:innen < 20 Jahre                                 | 1                | 282 von 2.714     | <4          |  |
| Anteil Leistenbruchoperationen mit Netz                       | Information      | 98,1%             | 98,4%       |  |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                 | 1                | 46.312 von 47.185 | 250 von 254 |  |

### Eingriffe an der Schilddrüse

|                                                                      |                   |               |          |  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------|--|
| Operative Entfernung der Schilddrüse                                 | Mengeninformation | 55,6 (20)     | 50       |  |
|                                                                      | 2                 | 17.020        |          |  |
| davon operative Entfernung der Schilddrüse bei Schilddrüsenkrebs     | Mengeninformation | 11,0 (4)      | 10       |  |
|                                                                      | 2                 | 2.437         |          |  |
| davon operative Entfernung der Schilddrüse bei gutartiger Erkrankung | Mengeninformation | 47,1 (20)     | 39       |  |
|                                                                      | 2                 | 13.673        |          |  |
| Anteil der Beatmungsfälle (> 24 Std.) nach Schilddrüseneingriff      | Information       | 0,54%         | 0,0%     |  |
|                                                                      | 1                 | 87 von 16.082 | 0 von 49 |  |

### Große Operationen am Dick- und Enddarm (Kolon und Rektum)

|                                                         |                   |            |     |  |
|---------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----|--|
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Dick-/Enddarmkrebs   | Mengeninformation | 123,9 (85) | 230 |  |
|                                                         | 2                 | 47.195     |     |  |
| Behandlungsfälle mit Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn | Mengeninformation | 90,4 (58)  | 191 |  |
|                                                         | 2                 | 37.321     |     |  |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2022

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                                                              | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    |                  | Klinik Ist-Wert          |            | Klinik Erwartungs-wert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------|------------------------|
|                                                                                                              | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> |                  | <a href="#">Fallzahl</a> |            | <a href="#">SMR</a>    |
| Todesfälle bei operativer Entfernung des Dick-/Enddarms                                                      | Beobachtungswert<br>1  | 8,1%                     | 2.983 von 36.751 | 5,7%                     | 17 von 299 |                        |
| Todesfälle bei operativer Dickdarmentfernung bei Krebs, ohne komplizierende Diagnose                         | <4,1%<br>1             | 4,1%                     | 377 von 9.128    | 3,2%                     | 2 von 62   |                        |
| Todesfälle bei operativer Dickdarmentfernung bei Krebs, mit komplizierender Diagnose                         | Beobachtungswert<br>1  | 11,2%                    | 308 von 2.740    | 11,1%                    | 2 von 18   |                        |
| Todesfälle bei operativer Enddarmentfernung bei Krebs                                                        | <3,2%<br>1             | 2,8%                     | 119 von 4.274    | 2,6%                     | 1 von 39   |                        |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Divertikel, ohne Abszess/Perforation               | <0,72%<br>1            | 0,4585%                  | 9 von 1.963      | 0,0%                     | 0 von 24   |                        |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Divertikel, mit Abszess/Perforation                | Beobachtungswert<br>1  | 5,5%                     | 266 von 4.870    | 8,8%                     | 3 von 34   |                        |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Darmischämie                                       | Information<br>1       | 45,0%                    | 978 von 2.172    | 23,1%                    | 3 von 13   |                        |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Colitis oder Crohn                                 | Beobachtungswert<br>1  | 3,1%                     | 58 von 1.881     | 0,0%                     | 0 von 14   |                        |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei anderen Diagnosen                                  | Information<br>1       | 8,9%                     | 868 von 9.723    | 6,3%                     | 6 von 95   |                        |
| Anteil operative Leberentfernung bei Entfernung des Dick-/Enddarms bei Dick- und Enddarmkrebs                | Information<br>1       | 4,8%                     | 777 von 16.142   | 5,9%                     | 7 von 119  |                        |
| Erkrankungen des Magens                                                                                      |                        |                          |                  |                          |            |                        |
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Magenkrebs (mit und ohne Magenoperation)                                  | Mengeninformation<br>2 | 44,3 (25)                | 16.000           | 112                      |            |                        |
| Todesfälle bei Geschwüren an Magen, Zwölffingerdarm oder Dünndarm als Hauptdiagnose (mit und ohne Operation) | Beobachtungswert<br>1  | 5,7%                     | 1.101 von 19.463 | 7,7%                     | 7 von 91   |                        |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2022

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                                       | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungswert |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                                                       | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>   |
| Magenentfernungen                                                                     | Mengeninformation<br>2 | 32,5 (11)<br>9.945       | 26                       |                       |
| Todesfälle bei operativer Magenentfernung bei Magenkrebs (exkl. Speiseröhre)          | Beobachtungswert<br>1  | 5,6%<br>116 von 2.072    | 5,6%<br>1 von 18         |                       |
| Todesfälle bei operativer Magenentfernung kombiniert mit Speiseröhreneingriff         | Beobachtungswert<br>1  | 17,7%<br>41 von 232      | n.a.<br><4               |                       |
| Todesfälle bei partieller und totaler operativer Magenentfernung bei anderer Diagnose | Beobachtungswert<br>1  | 3,7%<br>280 von 7.641    | 16,7%<br>1 von 6         |                       |
| Eingriffe an der Speiseröhre (Ösophagus)                                              |                        |                          |                          |                       |
| Todesfälle bei komplexen Eingriffen an der Speiseröhre                                | Beobachtungswert<br>1  | 8,1%<br>139 von 1.706    | 22,2%<br>2 von 9         |                       |
| Eingriffe an der Bauchspeicheldrüse (Pankreas)                                        |                        |                          |                          |                       |
| Todesfälle bei Eingriffen an der Bauchspeicheldrüse ohne Transplantation              | Beobachtungswert<br>1  | 8,8%<br>426 von 4.827    | 11,4%<br>5 von 44        |                       |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                         |                        |                          |                          |                       |
| Todesfälle bei operativer Bauchspeicheldrüsenentfernung bei Bauchspeicheldrüsenkrebs  | Beobachtungswert<br>1  | 7,2%<br>200 von 2.793    | 12,5%<br>4 von 32        |                       |
| Anatomische Leberentfernung, Anteil Todesfälle                                        | Beobachtungswert<br>1  | 7,1%<br>192 von 2.723    | 0,0%<br>0 von 14         |                       |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                         |                        |                          |                          |                       |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2022

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert |  | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--|--------------------------|-------------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> |  | <a href="#">Fallzahl</a> |                               |

## Gefäßoperationen

### Operationen der Halsschlagader (Carotis)

|                                                                                         |        |      |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|----------|--|
| Todesfälle bei Operation der Halsschlagader, nur extrakranielle Operationen             | <1,09% | 1,1% |           | 1,79%    |  |
|                                                                                         | 1      | 100  | von 9.073 | 1 von 56 |  |
| Todesfälle bei Implantation von Stents in die Halsschlagader, nur extrakranielle Gefäße | <2,2%  | 2,6% |           | n.a.     |  |
|                                                                                         | 1      | 60   | von 2.325 | <4       |  |

### Eingriffe an der Hauptschlagader

|                                                                                                |                   |           |           |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|----------|--|
| Operationen an der Hauptschlagader (Aorta)                                                     | Mengeninformation | 48,4 (27) |           | 57       |  |
|                                                                                                | 2                 | 9.532     |           |          |  |
| Operationen Ersatz der Bauchschlagader                                                         | Mengeninformation | 26,3 (23) |           | 49       |  |
|                                                                                                | 2                 | 5.071     |           |          |  |
| Todesfälle bei endovaskulärer Stentimplantation eines nicht rupturierten Bauchaortenaneurysmas | <1,4%             | 1,5%      |           | 0,0%     |  |
|                                                                                                | 1                 | 44        | von 2.906 | 0 von 34 |  |
| Todesfälle bei Operation der Bauchaorta, nicht bei Aneurysma                                   | Beobachtungswert  | 8,7%      |           | n.a.     |  |
|                                                                                                | 1                 | 44        | von 508   | <4       |  |
| Todesfälle bei endovaskulärer Stentimplantation der Bauchaorta, nicht bei Aneurysma            | Beobachtungswert  | 6,7%      |           | 0,0%     |  |
|                                                                                                | 1                 | 24        | von 357   | 0 von 7  |  |
| Todesfälle bei Operation der Bauch- oder Brustaorta, nicht bei Aneurysma                       | Beobachtungswert  | 20,2%     |           | n.a.     |  |
|                                                                                                | 1                 | 68        | von 337   | <4       |  |
| Todesfälle bei rupturiertem Aortenaneurysma                                                    | Information       | 42,2%     |           | 40,0%    |  |
|                                                                                                | 1                 | 761       | von 1.804 | 4 von 10 |  |
| davon Todesfälle bei Operation eines rupturierten Aortenaneurysmas                             | Information       | 32,6%     |           | 33,3%    |  |
|                                                                                                | 1                 | 305       | von 937   | 2 von 6  |  |

### Operationen der Becken-/Bein-Arterien

|                                                          |             |         |            |            |  |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|------------|--|
| Todesfälle bei Operationen der Becken-/Beinarterien      | Information | 6,2%    |            | 5,4%       |  |
|                                                          | 1           | 1.717   | von 27.918 | 11 von 204 |  |
| davon Todesfälle bei Schaufensterkrankheit (Claudicatio) | <0,33%      | 0,2376% |            | 0,0%       |  |
|                                                          | 1           | 13      | von 5.472  | 0 von 25   |  |
| davon Todesfälle bei Ruheschmerz                         | <2,3%       | 1,8%    |            | 0,0%       |  |
|                                                          | 1           | 40      | von 2.163  | 0 von 12   |  |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2022

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                                                             | <div>IQM Zielwert</div> <div><a href="#">Quelle</a></div> | <div>IQM Durchschnittswert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik Ist-Wert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik Erwartungs-<br/>wert</div> <div><a href="#">SMR</a></div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             |                                                           |                                                                      |                                                                |                                                                       |
| davon Todesfälle bei Ulzeration/Gangrän                                                                     | <div>&lt;4,5%</div> <div>1</div>                          | <div>3,9%</div> <div>135 von 3.479</div>                             | <div>5,9%</div> <div>1 von 17</div>                            |                                                                       |
| PTA (Perkutan transluminale Gefäßinterventionen)                                                            |                                                           |                                                                      |                                                                |                                                                       |
| Behandlungsfälle mit Wiedereröffnung eines verschlossenen Gefäßes mittels Ballonkatheter, Anteil Todesfälle | <div>Beobachtungswert</div> <div>1</div>                  | <div>3,1%</div> <div>1.770 von 57.458</div>                          | <div>2,6%</div> <div>16 von 609</div>                          |                                                                       |
| PTA Abdomen/Beinarterien mit arterieller Operation im gleichen stationären Aufenthalt                       | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div>                 | <div>43,9 (37)</div> <div>9.835</div>                                | <div>69</div>                                                  |                                                                       |
| Arteriovenöser Shunt                                                                                        |                                                           |                                                                      |                                                                |                                                                       |
| Anlegen eines arteriovenösen Shunts                                                                         | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div>                 | <div>30,2 (18)</div> <div>5.976</div>                                | <div>52</div>                                                  |                                                                       |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2022

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der**
**[Präambel](#)**

IQM Indikatoren

 IQM  
Zielwert

[Quelle](#)

 IQM  
Durchschnittswert

[Fallzahl](#)

 Klinik  
Ist-Wert

[Fallzahl](#)

 Klinik  
Erwartungs-  
wert

[SMR](#)

## Frauenheilkunde und Geburtshilfe

### Geburtshilfe

|                                                                                             |                  |                             |                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|--|
| Mütterliche Todesfälle bei der Geburt                                                       | <0,005%<br>1     | 0,005%<br>13 von 258.566    | 0,0%<br>0 von 1.723    |  |
| Anteil vaginale Geburten mit Dammriss 3. und 4. Grades                                      | <2,0%<br>1       | 1,9%<br>3.340 von 174.150   | 2,5%<br>28 von 1.122   |  |
| Anteil vaginale Geburten mit Dammschnitt                                                    | Information<br>1 | 10,5%<br>18.240 von 174.150 | 14,3%<br>160 von 1.122 |  |
| Kaiserschnitttrate, Anteil an allen Geburten                                                | Information<br>1 | 32,6%<br>84.416 von 258.566 | 34,9%<br>601 von 1.723 |  |
| Anteil sanfter Kaiserschnitt (nach Misgav-Ladach), Anteil an allen Kaiserschnittoperationen | Information<br>1 | 77,6%<br>65.482 von 84.416  | 91,7%<br>551 von 601   |  |
| Anteil Kaiserschnitte bei risikoarmer Geburt                                                | Information<br>1 | 27,1%<br>61.272 von 225.689 | 29,2%<br>446 von 1.526 |  |
| davon Anteil Kaiserschnitte bei risikoarmer Geburt                                          | Information<br>1 | 25,1%<br>41.933 von 167.210 | 26,7%<br>311 von 1.167 |  |
| Alle Patient:innen < 35 Jahre                                                               |                  |                             |                        |  |
| davon Anteil Kaiserschnitte bei risikoarmer Geburt                                          | Information<br>1 | 33,1%<br>19.339 von 58.479  | 37,6%<br>135 von 359   |  |
| Alle Patient:innen > 34 Jahre                                                               |                  |                             |                        |  |

### Neugeborene

|                                                         |                        |                         |            |  |
|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|--|
| Neugeborene mit Gewicht < 1.250 Gramm                   | Mengeninformation<br>2 | 24,8 (24)<br>2.475      | 4          |  |
| davon zuverlegte Neugeborene mit Gewicht < 1.250 Gramm  | Mengeninformation<br>2 | 5,4 (2)<br>201          | n.a.<br><4 |  |
| davon Neugeborene mit Gewicht von 750 bis 999 Gramm     | Mengeninformation<br>2 | 9,7 (9)<br>770          | n.a.<br><4 |  |
| davon Neugeborene mit Gewicht von 1.000 bis 1.249 Gramm | Mengeninformation<br>2 | 9,2 (9)<br>853          | n.a.<br><4 |  |
| Neugeborene mit Gewicht von 1.250 bis 1.499 Gramm       | Mengeninformation<br>2 | 11,6 (9)<br>1.195       | 7          |  |
| Neugeborene mit Gewicht von 1.500 bis 2.499 Gramm       | Mengeninformation<br>2 | 73,6 (28)<br>16.113     | 98         |  |
| Neugeborene mit Gewicht > 2.500 Gramm                   | Mengeninformation<br>2 | 1124,0 (863)<br>256.276 | 1.724      |  |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2022

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der**

**[Präambel](#)**

| IQM Indikatoren                                                                                                             | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                             | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |
| <b>Frauenheilkunde</b>                                                                                                      |                        |                          |                          |                               |
| Todesfälle bei operativer Entfernung der Gebärmutter bei gutartigen Erkrankungen                                            | <0,04%                 | 0,0731%                  | 0,0%                     |                               |
| Alle Patient:innen > 14 Jahre                                                                                               | 1                      | 15 von 20.527            | 0 von 86                 |                               |
| Anteil der Behandlungsfälle mit vaginaler/laparoskopischer Gebärmutterentfernung, ohne plastische Operation                 | >88,4%                 | 88,6%                    | 83,7%                    |                               |
|                                                                                                                             | 1                      | 18.069 von 20.383        | 72 von 86                |                               |
| Anteil der Behandlungsfälle mit vaginaler Gebärmutterentfernung, ohne plastische Operation                                  | Information            | 30,0%                    | 26,7%                    |                               |
|                                                                                                                             | 1                      | 6.108 von 20.383         | 23 von 86                |                               |
| Anteil der Behandlungsfälle mit vaginaler Entfernung durch Zerkleinerung der Gebärmutter                                    | Information            | 6,1%                     | 4,3%                     |                               |
|                                                                                                                             | 1                      | 374 von 6.108            | 1 von 23                 |                               |
| Anteil der Behandlungsfälle mit laparoskopischer Gebärmutterentfernung, ohne plastische Operation                           | Information            | 58,7%                    | 57,0%                    |                               |
|                                                                                                                             | 1                      | 11.961 von 20.383        | 49 von 86                |                               |
| Anteil der Behandlungsfälle mit laparoskopischer Entfernung durch Zerkleinerung der Gebärmutter                             | Information            | 26,2%                    | 20,4%                    |                               |
|                                                                                                                             | 1                      | 3.137 von 11.961         | 10 von 49                |                               |
| Anteil der Behandlungsfälle mit Gebärmutterentfernung und Eierstockentfernung bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose | Information            | 6,5%                     | 4,3%                     |                               |
| Alle Patient:innen < 50 Jahre                                                                                               | 1                      | 444 von 6.799            | 1 von 23                 |                               |
| Anteil der Behandlungsfälle mit Gebärmutterentfernung und Eierstockentfernung bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose | Information            | 31,5%                    | 34,1%                    |                               |
| Alle Patient:innen > 49 Jahre                                                                                               | 1                      | 2.506 von 7.964          | 15 von 44                |                               |
| <b>Bösartige Neubildungen der Brust und der weiblichen Geschlechtsorgane</b>                                                |                        |                          |                          |                               |
| Behandlungsfälle mit Krebserkrankung der Brust oder der Geschlechtsorgane als Hauptdiagnose                                 | Mengeninformation      | 197,6 (62)               | 403                      |                               |
|                                                                                                                             | 2                      | 74.481                   |                          |                               |
| Behandlungsfälle mit Eierstockkrebs als Hauptdiagnose                                                                       | Mengeninformation      | 29,7 (12)                | 43                       |                               |
|                                                                                                                             | 2                      | 9.543                    |                          |                               |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2022

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der****[Präambel](#)**

| IQM Indikatoren                                                  | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                                                                  | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |
| Todesfälle nach Eierstockentfernung bei Eierstockkrebs           |                        |                          |                          |                               |
|                                                                  | Beobachtungswert       | 1,5%                     | 0,0%                     |                               |
|                                                                  | 1                      | 37 von 2.550             | 0 von 14                 |                               |
| Behandlungsfälle mit Gebärmutterkrebs als Hauptdiagnose          |                        |                          |                          |                               |
|                                                                  | Mengeninformation      | 49,4 (29)                | 111                      |                               |
|                                                                  | 2                      | 15.355                   |                          |                               |
| Todesfälle nach Gebärmutterentfernung bei Gebärmutterkrebs       |                        |                          |                          |                               |
|                                                                  | Beobachtungswert       | 0,75%                    | 0,0%                     |                               |
|                                                                  | 1                      | 45 von 5.973             | 0 von 33                 |                               |
| Behandlungsfälle mit Brustkrebs als Hauptdiagnose                |                        |                          |                          |                               |
|                                                                  | Mengeninformation      | 124,8 (32)               | 219                      |                               |
|                                                                  | 2                      | 45.185                   |                          |                               |
| Eingriffe an der Brust                                           |                        |                          |                          |                               |
| Eingriffe an der Brust                                           |                        |                          |                          |                               |
|                                                                  | Mengeninformation      | 151,2 (108)              | 135                      |                               |
|                                                                  | 2                      | 39.303                   |                          |                               |
| Operationen der Brust bei Brustkrebs                             |                        |                          |                          |                               |
|                                                                  | Mengeninformation      | 135,6 (113)              | 119                      |                               |
|                                                                  | 2                      | 29.027                   |                          |                               |
| Anteil brusterhaltender Operationen bei Brustkrebs               |                        |                          |                          |                               |
|                                                                  | Information            | 72,4%                    | 58,8%                    |                               |
|                                                                  | 1                      | 21.021 von 29.027        | 70 von 119               |                               |
| Eingriffe am Beckenboden bei der Frau                            |                        |                          |                          |                               |
| Beckenbodenoperationen mit und ohne plastische Operation, gesamt |                        |                          |                          |                               |
|                                                                  | Mengeninformation      | 61,3 (43)                | 66                       |                               |
|                                                                  | 2                      | 17.175                   |                          |                               |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2022

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungswert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>   |

## Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe

### Bösartige Neubildungen des Bewegungsapparates

|                                                                                                                                    |                   |          |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----|--|
| Behandlungsfälle mit bösartiger Neubildung an Knochen, Gelenkknorpel, peripheren Nerven, Retroperitoneum, Bindegewebe, Weichteilen | Mengeninformation | 42,4 (5) | 31 |  |
|                                                                                                                                    | 2                 | 14.286   |    |  |

### Gelenkersatz (Endoprothetik)

|                                                                                                                                           |                  |                  |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|--|
| Todesfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung                                        | <0,13%           | 0,1393%          | 0,5%       |  |
|                                                                                                                                           | 1                | 78 von 55.998    | 1 von 200  |  |
| Todesfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei hüftgelenksnahen Frakturen                                                         | Beobachtungswert | 5,8%             | 3,8%       |  |
|                                                                                                                                           | 1                | 1.217 von 21.083 | 6 von 160  |  |
| Todesfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei anderen Diagnosen                                                                  | Beobachtungswert | 5,8%             | 6,3%       |  |
|                                                                                                                                           | 1                | 371 von 6.372    | 2 von 32   |  |
| Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung | Beobachtungswert | 2,4%             | 5,0%       |  |
|                                                                                                                                           | 1                | 1.358 von 55.998 | 10 von 200 |  |
| Todesfälle bei Wechsel Hüftgelenkersatz ohne Fraktur oder Infektion bei Aufnahme                                                          | <1,38%           | 1,21%            | 4,55%      |  |
|                                                                                                                                           | 1                | 58 von 4.802     | 1 von 22   |  |
| davon Todesfälle bei Wechsel Hüftgelenkersatz mit Sonderprothesen                                                                         | Information      | 1,3%             | n.a.       |  |
|                                                                                                                                           | 1                | 12 von 935       | <4         |  |
| Todesfälle bei Wechsel Hüftgelenkersatz wegen Fraktur oder Infektion                                                                      | Beobachtungswert | 4,7%             | 18,2%      |  |
|                                                                                                                                           | 1                | 173 von 3.718    | 4 von 22   |  |
| Todesfälle bei Kniegelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung                                        | <0,06%           | 0,0605%          | 0,0%       |  |
|                                                                                                                                           | 1                | 32 von 52.899    | 0 von 150  |  |
| Todesfälle bei Kniegelenkersatz (Erstimplantation) bei anderen Diagnosen                                                                  | Beobachtungswert | 0,7376%          | 0,0%       |  |
|                                                                                                                                           | 1                | 24 von 3.254     | 0 von 6    |  |
| Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei Kniegelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung | Beobachtungswert | 1,7%             | 4,7%       |  |
|                                                                                                                                           | 1                | 905 von 52.899   | 7 von 150  |  |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2022

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

| IQM Indikatoren                                                                                                                 | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    |            | Klinik Ist-Wert          |         | Klinik Erwartungs-wert |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|---------|------------------------|
|                                                                                                                                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> |            | <a href="#">Fallzahl</a> |         | <a href="#">SMR</a>    |
| Todesfälle bei Wechsel Kniegelenkersatz oder -teilersatz bei Aufnahme                                                           | <0,16%                 | 0,3172%                  |            | 0,0%                     |         |                        |
|                                                                                                                                 | 1                      | 14                       | von 4.413  | 0                        | von 6   |                        |
| davon Todesfälle bei Wechsel Kniegelenkersatz mit Sonderprothesen                                                               | Information            | 0,1455%                  |            | n.a.                     |         |                        |
|                                                                                                                                 | 1                      | 2                        | von 1.375  |                          | <4      |                        |
| Todesfälle bei Wechsel Kniegelenkersatz wegen Fraktur oder Infektion                                                            | Beobachtungswert       | 3,1%                     |            | 0,0%                     |         |                        |
|                                                                                                                                 | 1                      | 60                       | von 1.945  | 0                        | von 12  |                        |
| Todesfälle bei Hüft- oder Kniegelenkersatz bei Tumorerkrankung                                                                  | Beobachtungswert       | 7,1%                     |            | 0,0%                     |         |                        |
|                                                                                                                                 | 1                      | 160                      | von 2.244  | 0                        | von 11  |                        |
| Todesfälle bei kombiniertem Hüft- oder Kniegelenkersatz                                                                         | Beobachtungswert       | 2,0%                     |            | n.a.                     |         |                        |
|                                                                                                                                 | 1                      | 2                        | von 100    |                          | <4      |                        |
| <b>Hüftgelenknahe Frakturen</b>                                                                                                 |                        |                          |            |                          |         |                        |
| Todesfälle nach operativer Versorgung einer Schenkelhalsfraktur                                                                 | < Erwartungswert       | 5,2%                     |            | 3,7%                     |         | 4,9%                   |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                                                   | 1                      | 1.212                    | von 23.337 | 6                        | von 162 | 0,76                   |
| Todesfälle nach Gelenkersatz bei Schenkelhalsfraktur                                                                            | Beobachtungswert       | 5,7%                     |            | 3,8%                     |         |                        |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                                                   | 1                      | 1.180                    | von 20.617 | 6                        | von 159 |                        |
| Todesfälle nach Osteosynthese (Verbindung der Knochenfragmente durch Platten, Schrauben oder Nägel) bei Schenkelhalsfraktur     | Beobachtungswert       | 1,2%                     |            | n.a.                     |         |                        |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                                                   | 1                      | 32                       | von 2.720  |                          | <4      |                        |
| Todesfälle nach operativer Versorgung einer pertrochantären Fraktur                                                             | < Erwartungswert       | 5,3%                     |            | 3,0%                     |         | 5,2%                   |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                                                   | 1                      | 1.020                    | von 19.295 | 4                        | von 133 | 0,58                   |
| Todesfälle nach Gelenkersatz bei pertrochantärer Fraktur                                                                        | Beobachtungswert       | 7,6%                     |            | n.a.                     |         |                        |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                                                   | 1                      | 32                       | von 423    |                          | <4      |                        |
| Todesfälle nach Osteosynthese (Verbindung der Knochenfragmente durch Platten, Schrauben oder Nägel) bei pertrochantärer Fraktur | Beobachtungswert       | 5,2%                     |            | 3,0%                     |         |                        |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                                                   | 1                      | 988                      | von 18.872 | 4                        | von 132 |                        |
| <b>Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark</b>                                                                         |                        |                          |            |                          |         |                        |
| Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark (ohne lokale Schmerztherapien)                                                 | Mengeninformation      | 300,2 (179)              |            | 459                      |         |                        |
|                                                                                                                                 | 2                      | 108.384                  |            |                          |         |                        |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2022

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

| IQM Indikatoren                                                                                                                    | IQM Zielwert               | IQM Durchschnittswert        |  |  | Klinik Ist-Wert        |  |  | Klinik Erwartungs-wert |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|--|------------------------|--|--|------------------------|
|                                                                                                                                    | Quelle                     | Fallzahl                     |  |  | Fallzahl               |  |  | SMR                    |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder Wirbelkörper-Ersatz bei Tumor (inkl. komplexe Rekonstruktionen)                       | Beobachtungswert<br><br>1  | 8,0%<br><br>264 von 3.299    |  |  | 13,8%<br><br>4 von 29  |  |  |                        |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder Wirbelkörper-Ersatz bei Trauma (inkl. komplexe Rekonstruktionen, Rückenmarkoperation) | Beobachtungswert<br><br>1  | 3,9%<br><br>554 von 14.172   |  |  | 5,9%<br><br>12 von 203 |  |  |                        |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Operation bei Entzündung der Bandscheibe oder des Rückenmarks                                          | Beobachtungswert<br><br>1  | 8,6%<br><br>204 von 2.363    |  |  | 9,5%<br><br>2 von 21   |  |  |                        |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder 1 Wirbelkörper-Ersatz (ohne Tumor, Trauma oder kompl. Rekonstruktionen)               | Beobachtungswert<br><br>1  | 0,0709%<br><br>9 von 12.690  |  |  | 0,0%<br><br>0 von 29   |  |  |                        |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder 2 Wirbelkörper-Ersatz (ohne Tumor, Trauma oder kompl. Rekonstruktionen)               | Beobachtungswert<br><br>1  | 0,3454%<br><br>22 von 6.369  |  |  | 0,0%<br><br>0 von 11   |  |  |                        |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder 3 oder mehr Wirbelkörper-Ersatz (ohne Tumor, Trauma oder kompl. Rekonstruktionen)     | Beobachtungswert<br><br>1  | 0,6663%<br><br>32 von 4.803  |  |  | 0,0%<br><br>0 von 6    |  |  |                        |
| Todesfälle bei alleiniger 'Entlastung' (Dekompression) der Wirbelsäule                                                             | Beobachtungswert<br><br>1  | 0,0519%<br><br>11 von 21.178 |  |  | 0,0%<br><br>0 von 11   |  |  |                        |
| Todesfälle bei 'einfachen' Bandscheibenentfernungen                                                                                | <0,03%<br><br>1            | 0,0251%<br><br>4 von 15.948  |  |  | 0,0%<br><br>0 von 40   |  |  |                        |
| Todesfälle bei Vertebro-/Kyphoplastie (ohne Tumor, kompl. Rekonstruktion, Versteifung, WK-Ersatz oder Bandscheibeneingriffe)       | <0,53%<br><br>1            | 0,3975%<br><br>26 von 6.541  |  |  | 0,0%<br><br>0 von 62   |  |  |                        |
| Todesfälle bei anderen Operationen an der Wirbelsäule oder am Rückenmark                                                           | Beobachtungswert<br><br>1  | 1,8%<br><br>357 von 20.304   |  |  | 2,1%<br><br>1 von 47   |  |  |                        |
| Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei 'einfachen' Bandscheibenentfernungen                                         | Beobachtungswert<br><br>1  | 0,5518%<br><br>88 von 15.948 |  |  | 5,0%<br><br>2 von 40   |  |  |                        |
| Lokale Schmerztherapie an der Wirbelsäule (ohne andere Wirbelsäulenoperation)                                                      | Mengeninformation<br><br>2 | 80,3 (35)<br><br>27.216      |  |  | 95                     |  |  |                        |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2022

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                                                                           | <div>IQM<br/>Zielwert</div> <div><a href="#">Quelle</a></div> | <div>IQM<br/>Durchschnittswert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Ist-Wert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Erwartungs-<br/>wert</div> <div><a href="#">SMR</a></div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           |                                                               |                                                                          |                                                                    |                                                                           |
| Behandlungsfälle mit Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen als Hauptdiagnose ohne Operation oder lokale Schmerztherapie | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div>                     | <div>123,5 (103)</div> <div>50.008</div>                                 | <div>115</div>                                                     |                                                                           |
| Operationen am Bewegungsapparat inkl. Endoprothetik                                                                       |                                                               |                                                                          |                                                                    |                                                                           |
| Gelenkersatz am Schulter-/ Ellenbogengelenk                                                                               | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div>                     | <div>31,1 (23)</div> <div>11.199</div>                                   | <div>116</div>                                                     |                                                                           |
| Mehrfachverletzungen - Polytraumen                                                                                        |                                                               |                                                                          |                                                                    |                                                                           |
| Mehrfachverletzungen (Polytraumen) im Sinne der DRG-Definition                                                            | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div>                     | <div>21,2 (7)</div> <div>7.351</div>                                     | <div>59</div>                                                      |                                                                           |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2022

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der**

**[Präambel](#)**

IQM Indikatoren

IQM  
Zielwert

[Quelle](#)

IQM  
Durchschnittswert

[Fallzahl](#)

Klinik  
Ist-Wert

[Fallzahl](#)

Klinik  
Erwartungs-  
wert

[SMR](#)

## Urologie

### Operationen der Niere

|                                                                                             |                       |                          |                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|--|
| Todesfälle bei Totalentfernung der Niere bei bösartiger Neubildung                          | <1,8%<br>1            | 1,7%<br>56 von 3.390     | 0,0%<br>0 von 4    |  |
| Anteil laparoskopischer Operationen bei Totalentfernung der Niere bei bösartiger Neubildung | Information<br>1      | 41,9%<br>1.422 von 3.390 | 100,0%<br>4 von 4  |  |
| Todesfälle bei Teilentfernung der Niere bei bösartiger Neubildung                           | <0,35%<br>1           | 0,1308%<br>4 von 3.059   | 0,0%<br>0 von 16   |  |
| Anteil laparoskopischer Operationen bei Teilentfernung der Niere bei bösartiger Neubildung  | Information<br>1      | 52,8%<br>1.616 von 3.059 | 93,8%<br>15 von 16 |  |
| Anteil der Teilentfernungen der Niere bei bösartiger Neubildung                             | Information<br>1      | 47,4%<br>3.059 von 6.449 | 80,0%<br>16 von 20 |  |
| Todesfälle bei Totalentfernung der Niere bei anderer Diagnose                               | Beobachtungswert<br>1 | 3,6%<br>74 von 2.046     | n.a.<br><4         |  |
| Todesfälle bei Teilentfernung der Niere bei anderer Diagnose                                | Beobachtungswert<br>1 | 0,8101%<br>9 von 1.111   | 0,0%<br>0 von 6    |  |

### Harnblase

|                                                                                             |                        |                           |                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|--|
| Behandlungsfälle mit Blasenkrebs als Hauptdiagnose                                          | Mengeninformation<br>2 | 129,8 (40)<br>41.790      | 198                 |  |
| Operationen an der Harnblase durch die Harnröhre                                            | Mengeninformation<br>2 | 201,8 (197)<br>42.790     | 240                 |  |
| davon Entfernung des Tumorgewebes durch die Harnröhre                                       | Mengeninformation<br>2 | 160,6 (147)<br>30.031     | 176                 |  |
| Anteil Entfernung des Tumorgewebes durch die Harnröhre mit Einbringen von Chemotherapeutika | Beobachtungswert<br>1  | 18,8%<br>5.650 von 30.031 | 24,4%<br>43 von 176 |  |

### Prostata

|                                                             |            |                          |                   |  |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------|--|
| Todesfälle bei Operationen der Prostata durch die Harnröhre | <0,2%<br>1 | 0,2218%<br>51 von 22.995 | 0,0%<br>0 von 125 |  |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------|--|

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2022

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

| IQM Indikatoren                                                                                                        | IQM Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> | IQM Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik Erwartungs-wert<br><a href="#">SMR</a> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                        |                                        |                                                   |                                             |                                               |
| Todesfälle bei Operationen der Prostata durch die Harnröhre bei bösartigen Erkrankungen                                | Beobachtungswert<br>1                  | 0,657%<br>43 von 6.545                            | 0,0%<br>0 von 36                            |                                               |
| Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei Behandlungsfällen mit Operation der Prostata durch die Harnröhre | Beobachtungswert<br>1                  | 3,5%<br>1.040 von 29.540                          | 5,6%<br>9 von 161                           |                                               |
| Behandlungsfälle mit Prostatakrebs als Hauptdiagnose                                                                   | Mengeninformation<br>2                 | 92,6 (20)<br>32.401                               | 191                                         |                                               |
| Todesfälle bei radikaler Prostataentfernung                                                                            | <0,16%<br>1                            | 0,1395%<br>16 von 11.470                          | 0,0%<br>0 von 96                            |                                               |
| Nierensteine                                                                                                           |                                        |                                                   |                                             |                                               |
| Behandlungsfälle mit Nierensteinen als Hauptdiagnose                                                                   | Mengeninformation<br>2                 | 185,6 (36)<br>68.659                              | 279                                         |                                               |
| Anteil der Behandlungsfälle mit Intervention zur Steinentfernung                                                       | Information<br>1                       | 53,6%<br>36.818 von 68.659                        | 54,5%<br>152 von 279                        |                                               |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2022

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | <div>IQM<br/>Zielwert</div> <div><a href="#">Quelle</a></div> | <div>IQM<br/>Durchschnittswert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Ist-Wert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Erwartungs-<br/>wert</div> <div><a href="#">SMR</a></div> |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

Hautkrankheiten

Hautkrankheiten

|                                                             |                                           |                                       |               |  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--|
| Behandlungsfälle mit Melanom als Hauptdiagnose              | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div> | <div>44,9 (4)</div> <div>12.441</div> | <div>14</div> |  |
| Behandlungsfälle mit Dermatitis und Ekzem als Hauptdiagnose | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div> | <div>31,3 (5)</div> <div>10.671</div> | <div>8</div>  |  |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2022

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

| IQM Indikatoren                                                                                              | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert      | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungswert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                                                                              | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a>   | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>   |
| <b>Intensivmedizin</b>                                                                                       |                        |                            |                          |                       |
| <b>Intensivmedizin</b>                                                                                       |                        |                            |                          |                       |
| Todesfälle bei Beatmung > 24 Stunden ohne Neugeborene                                                        | Beobachtungswert<br>1  | 37,2%<br>34.176 von 91.971 | 37,3%<br>144 von 386     |                       |
| Todesfälle bei Beatmung > 24 Stunden ohne Neugeborene und ohne COVID-19 Fälle                                | <35,9%<br>1            | 36,4%<br>28.652 von 78.807 | 36,5%<br>120 von 329     |                       |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) als Hauptdiagnose                                                     | < Erwartungswert<br>1  | 34,0%<br>9.552 von 28.070  | 39,2%<br>78 von 199      | 34,7%<br>1,13         |
| davon Todesfälle bei Sepsis mit Organversagen/Schock (als Hauptdiagnose)                                     | Beobachtungswert<br>1  | 36,8%<br>9.099 von 24.733  | 39,2%<br>73 von 186      |                       |
| davon Todesfälle bei Sepsis ohne Organversagen/Schock (als Hauptdiagnose)                                    | Beobachtungswert<br>1  | 13,6%<br>453 von 3.337     | 38,5%<br>5 von 13        |                       |
| Todesfälle bei Sepsis (als Nebendiagnose)                                                                    | Beobachtungswert<br>1  | 40,7%<br>25.779 von 63.283 | 34,4%<br>152 von 442     |                       |
| davon Todesfälle bei Sepsis mit Organversagen/Schock (als Nebendiagnose)                                     | Beobachtungswert<br>1  | 42,3%<br>25.171 von 59.484 | 35,4%<br>151 von 426     |                       |
| Anteil Todesfälle bei generalisierter Entzündungsreaktion des gesamten Körpers ohne Organkomplikation (SIRS) | Information<br>1       | 8,8%<br>3.631 von 41.083   | 8,6%<br>48 von 556       |                       |
| <b>Angeborene Gerinnungsstörung</b>                                                                          |                        |                            |                          |                       |
| Behandlungsfälle mit angeborenen Gerinnungsstörungen                                                         | Mengeninformation<br>2 | 29,6 (15)<br>11.813        | 43                       |                       |
| davon operierte Behandlungsfälle (mit angeborenen Gerinnungsstörungen)                                       | Mengeninformation<br>2 | 19,7 (10)<br>7.505         | 20                       |                       |
| <b>Obduktionen</b>                                                                                           |                        |                            |                          |                       |
| Obduktionsrate                                                                                               | Information<br>1       | 0,81%<br>1.405 von 173.680 | 0,0%<br>0 von 1.181      |                       |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2022

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                         | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                                         | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |
| Palliativmedizin                        |                        |                          |                          |                               |
| Palliativmedizin                        |                        |                          |                          |                               |
| Palliativmedizinische Komplexbehandlung | Mengeninformation      | 182,6 (120)              | 244                      |                               |
|                                         | 2                      | 42.178                   |                          |                               |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2022

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                | <div>IQM<br/>Zielwert</div> <div><a href="#">Quelle</a></div> | <div>IQM<br/>Durchschnittswert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Ist-Wert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Erwartungs-<br/>wert</div> <div><a href="#">SMR</a></div> |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                                                               |                                                                          |                                                                    |                                                                           |
| Roboterassistierte Eingriffe                   |                                                               |                                                                          |                                                                    |                                                                           |
| Roboterassistierte Eingriffe                   |                                                               |                                                                          |                                                                    |                                                                           |
| Urologische Eingriffe mittels Roboterchirurgie | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div>                     | <div>126,1 (98)</div> <div>10.091</div>                                  | <div>115</div>                                                     |                                                                           |

G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024

Jahr:

2022

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

IQM Indikatoren

IQM  
Zielwert  
[Quelle](#)

IQM  
Durchschnittswert  
[Fallzahl](#)

Klinik  
Ist-Wert  
[Fallzahl](#)

Klinik  
Erwartungs-  
wert  
[SMR](#)

## COVID-19 Kennzahlen

### COVID-19 Kennzahlen

|                                                                                        |                  |                                  |                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------|--|
| Behandlungsfälle mit Testung auf COVID-19-Infektion                                    | Information<br>1 | 89,7%<br>5.418.059 von 6.040.148 | 90,7%<br>25.957 von 28.616 |  |
| Anteil positiver Virusnachweis auf COVID-19 von allen getesteten Behandlungsfällen     | Information<br>1 | 5,6%<br>304.475 von 5.418.059    | 6,0%<br>1.567 von 25.957   |  |
| COVID-19 positiver Virusnachweis von allen Behandlungsfällen                           | Information<br>1 | 5,0%<br>304.475 von 6.040.149    | 5,5%<br>1.567 von 28.616   |  |
| COVID-19 - Anteil von Behandlungsfällen ohne Virusnachweis                             | Information<br>1 | 0,4%<br>22.953 von 6.040.149     | 0,2%<br>47 von 28.616      |  |
| COVID-19 - Behandlungsfälle mit Virusnachweis und schweren akuten Atemwegserkrankungen | Information<br>1 | 26,8%<br>81.684 von 304.475      | 39,1%<br>612 von 1.567     |  |
| COVID-19 - Behandlungsfälle mit Virusnachweis und ausgewählten Vorerkrankungen         | Information<br>1 | 71,9%<br>219.032 von 304.475     | 71,7%<br>1.124 von 1.567   |  |
| COVID-19 - Mortalität bei Virusnachweis                                                | Information<br>1 | 8,2%<br>24.947 von 304.475       | 9,8%<br>153 von 1.567      |  |

# Leseanleitung zu den IQM-Indikatoren

## Lesebeispiel

Beim nachfolgenden Indikator „Todesfälle bei Hauptdiagnose Herzinfarkt (Alle Patient:innen > 19 Jahre)“ liegt der Wert der durchschnittlichen Krankenhaussterblichkeit in der Bundesrepublik bei 8,2 % (Quelle: Statistisches Bundesamt). Daraus ergibt sich rechnerisch für das Beispielkrankenhaus, aufgrund des Alters und Geschlechts der Patientinnen und Patienten des ausgewerteten Jahres, eine zu erwartende Krankenhaussterblichkeit von 7,7 % <sup>4</sup> als Erwartungswert. Ziel der IQM-Mitgliedskrankenhäuser ist es, im Ergebnis unter diesem Erwartungswert zu liegen <sup>1</sup>. Der für das Beispielkrankenhaus tatsächlich gemessene Ist-Wert betrug in diesem Jahr 11,5 % <sup>3</sup> und lag damit über dem Krankenhaus-Erwartungswert für den Qualitätsindikator „Todesfälle bei Hauptdiagnose Herzinfarkt“. Der Durchschnittswert aller IQM-Mitgliedskrankenhäuser liegt bei diesem Indikator bei 7,6 % <sup>2</sup>.

|                                                                                                          |                  |                       |                 |                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--|
| G-IQI / CH-IQI 5.4 Stand: 15.04.2024                                                                     |                  | Jahr:                 |                 | 2023                  |  |
| Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der Präambel |                  |                       |                 |                       |  |
| IQM Indikatoren                                                                                          | IQM Zielwert     | IQM Durchschnittswert | Klinik Ist-Wert | Klinik Erwartungswert |  |
|                                                                                                          | Quelle           | Fallzahl              | Fallzahl        | SMR                   |  |
| Herzerkrankungen                                                                                         | 1                | 2                     | 3               | 4                     |  |
| Herzinfarkt                                                                                              |                  |                       |                 |                       |  |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Herzinfarkt                                                                 | < Erwartungswert | 7,6%                  | 11,5%           | 7,7%                  |  |
| Alle Patient:innen > 19 Jahre                                                                            |                  | 5.744 von 75.253      | 165 von 1.436   | 1,50                  |  |

## Die Indikatoren

Die von IQM verwendeten German/Swiss Inpatient Quality Indicators (G-IQI/CH-IQI) sind so ausgewählt, dass sie sowohl häufige und wichtige Krankheitsbilder als auch wichtige Verfahren abbilden. Alle Indikatoren werden aus den Routinedaten des Krankenhauses ohne zusätzliche Dokumentation abgeleitet, wodurch kein weiterer Dokumentationsaufwand entsteht.

## Was wird gemessen?

Hierbei unterscheiden wir **absolute Mengeninformati- onen**, bei denen z.B. ein Anteil bestimmter Operationsverfahren ausgewiesen wird.

Wesentlicher Messwert ist die **Sterblichkeit** bei verschiedenen Krankheitsbildern, auch wenn wir uns bewusst sind, dass Sterblichkeit im Krankenhaus auch bei bester Medizin nicht vermeidbar ist. Deswegen vergleichen wir die Sterblichkeiten, wo verfügbar, mit bundesdurchschnittlichen Werten. Diese werden entweder aus Daten des **Statistischen Bundesamtes** oder aus Daten **des Forschungsdatenzentrums der statistischen Ämter des Bundes und der Länder** berechnet. Mit den Daten des Statistischen Bundesamtes wird eine **Risikogewichtung** für das **Alter** und das **Geschlecht** der Behandelten ermöglicht. Krankenhäuser mit einem hohen Anteil sehr alter Patient:innen weisen in der Regel eine andere Sterblichkeit auf als solche mit vergleichsweise jungen Patientinnen und Patienten.

Als wesentliche Orientierungshilfe zur Einordnung der Ergebnisse dient der **Erwartungswert**, da er besagt, welche Sterblichkeit bei einer Patientengruppe gleicher Alters- und Geschlechtsverteilung im Bundesdurchschnitt zu erwarten wäre. Insofern ergeben sich für unterschiedliche Krankenhäuser individuelle Erwartungswerte, da Unterschiede in der Alters- und Geschlechtsszusammensetzung der Behandelten bestehen. Ziel der IQM Krankenhäuser ist es, „bessere“ als die erwarteten Werte zu erreichen.

Die Beziehung zwischen erwarteter Sterblichkeit und dem tatsächlichen Wert des Krankenhauses nennt man wissenschaftlich „**standardized mortality rate**“ oder kurz „**SMR**“. Liegt diese Quote unter 1, dann ist die tatsächliche Sterblichkeit im Krankenhaus für den gemessenen Indikator geringer als die zu erwartende, liegt sie über 1, ist die Sterblichkeit höher als eigentlich erwartet. Ein solcher Wert ist lediglich bei den Indikatoren errechenbar, bei denen die zu erwartende Sterblichkeit aus den Daten des Statistischen Bundesamtes ermittelt werden kann.

Liegen keine alters- und geschlechtsgewichteten Werte für einen Indikator vor, kann auch kein Erwartungswert errechnet werden. Wir sind uns ebenso bewusst, dass die Sterblichkeit bei manchen Indikatoren ein ausgesprochen seltenes Ereignis ist und nicht als alleiniger Nachweis der medizinischen Qualität gelten darf. Die im „low risk“-Bereich gemessene Sterblichkeit ermöglicht in nachfolgenden Analysen dieser seltenen Ereignisse, wichtige Verbesserungspotentiale zu heben.

## Glossar

### **IQM-Zielwert - Quellen:**

Die Quellen, aus denen sich die Referenz- bzw. Zielwerte ableiten, sind bei jedem Indikator durch die Zahl unter dem IQM-Zielwert angegeben.

Die Referenzwerte bzw. Zielwerte leiten sich aus den folgenden Quellen ab:

1: Forschungsdatenzentren der statistischen Ämter des Bundes und der Länder, DRG-Statistik 2022. Eigene Berechnungen. Diese Daten bilden auch die Grundlage für die Berechnung der nach Alter und Geschlecht standardisierten klinikindividuellen Erwartungswerte.

2: Gleiche Quelle wie 1; bei den Mengenindikatoren handelt es sich um die mittlere Fallzahl (in Klammern: den Median) bezogen auf diejenigen IQM-Mitgliedskrankenhäuser, die die Leistung im Jahr 2022 erbracht haben.

3: Der Zielwert ist hier nicht identisch mit dem Bundeswert und wurde entnommen aus: Kaiser D (2007) Mindestmengen aus thoraxchirurgischer Sicht. Chirurg, 78(11): 1012-1017

### **IQM-Durchschnittswert - Fallzahl:**

Darstellung der Durchschnittsergebnisse über alle Patient:innen, die im Beobachtungszeitraum in IQM Mitgliedskrankenhäusern (D) versorgt wurden. Die IQM-Mengeninformation (Gesamt) wird als Durchschnittswert und in Klammern als Median angegeben.

### **Krankenhaus Erwartungswert:**

Der Erwartungswert beinhaltet die erwartete Sterblichkeit der Patient:innen aufgrund ihrer Alters- und Geschlechtsverteilung und ist nur bei den Indikatoren angegeben, bei denen Vergleichszahlen des Bundesdurchschnitts die Berechnung erlauben.

**SMR:**

Die SMR (standardized mortality ratio) ist der Quotient aus beobachteter Sterblichkeit (Durchschnittswert) und dem Erwartungswert.

**Hinweis zum Indikator „Obduktionsrate“:**

Die Anzahl der ausgewiesenen Obduktionen wird von den Krankenhäusern möglicherweise nicht vollständig angegeben, da eine komplette Kodierung nach Entlassung nicht von allen eingesetzten Krankenhaus-Dokumentationssystemen unterstützt wird.

**Fallzahlen:**

Wie im vergangenen Jahr 2023 erfolgt die Darstellung der Ergebnisse unter Berücksichtigung einer Mindestnennerfallzahl. So werden Ergebnisse einer Kennzahl nur dann im Detail dargestellt, wenn mindestens 4 oder mehr Fälle im Nenner aufgetreten sind. Bei Unterschreiten dieser Grenze wird dann die Angabe „<4“ ausgewiesen. Ergebnisse, die sich auf sehr seltene Ereignisse beziehen, werden mit bis zu 4 Nachkommastellen ausgewiesen, um bei hohen Grundgesamtheiten ein Ergebnis zwischen 0 und 1 ausweisen zu können.