

# Qualitätsergebnisse

Sana Kliniken Niederlausitz - Lauchhammer

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Präambel

[zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

## Ergebnisdarstellung und Nutzung der Indikatoren-Sets

Im Sinne einer transparenten und fundierten Qualitätsanalyse möchten wir Ihnen mit dieser Veröffentlichung eine strukturierte Orientierungshilfe zu den dargestellten Ergebnissen bieten. Die Nutzung der Indikatoren-Sets ermöglicht eine präzise Einordnung der Resultate und unterstützt eine gezielte Analyse.

Mit der Versionierung auf G-IQI/CH-IQI 5.5 wurden einige Indikatoren als **Sentinel Events** klassifiziert, um besonders kritische Ereignisse klar zu kennzeichnen. Diese sind in der Spalte „IQM Zielwert“ mit dem Zusatz „SE“ ausgewiesen.

Zudem wurde die **Bezeichnung der G-IQI/CH-IQI systematisch überarbeitet**, um eine bessere Verständlichkeit und Konsistenz zu gewährleisten. Die Anpassungen dieser Terminologie spiegeln sich auch in diesem Dokument wider.

Wir laden Sie ein, die Ergebnisse unter diesen Aspekten zu betrachten und für Ihre weiterführenden Analysen zu nutzen.

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

## IQM Indikatoren

[Qualitätsbericht](#)

[QSR-Mehrjahresergebnisse](#)

### Inhaltsverzeichnis

|                                                    |                      |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Herzerkrankungen                                   | <a href="#">2024</a> | <a href="#">2023</a> |
| Erkrankungen des Nervensystems und Schlaganfall    | <a href="#">2024</a> | <a href="#">2023</a> |
| Altersmedizin                                      | <a href="#">2024</a> | <a href="#">2023</a> |
| Lungenerkrankungen                                 | <a href="#">2024</a> | <a href="#">2023</a> |
| Erkrankungen der Bauchorgane                       | <a href="#">2024</a> | <a href="#">2023</a> |
| Gefäßoperationen                                   | <a href="#">2024</a> | <a href="#">2023</a> |
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe                   | <a href="#">2024</a> | <a href="#">2023</a> |
| Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe | <a href="#">2024</a> | <a href="#">2023</a> |
| Urologie                                           | <a href="#">2024</a> | <a href="#">2023</a> |
| Hautkrankheiten                                    | <a href="#">2024</a> | <a href="#">2023</a> |
| Intensivmedizin                                    | <a href="#">2024</a> | <a href="#">2023</a> |
| Palliativmedizin                                   | <a href="#">2024</a> | <a href="#">2023</a> |

[Lesehilfe](#)

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    |  | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungs-wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> |  | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>    |

Herzerkrankungen

Herzinfarkt

|                                                                      |                  |        |            |        |        |      |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------|--------|--------|------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Herzinfarkt                             | < Erwartungswert | 7,1%   |            | 6,3%   |        | 7,9% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | 1 / 5            | 5.037  | von 70.894 | 1      | von 16 | 0,79 |
| Anteil der Herzinfarkte mit Linksherzkatheter                        | Information      | 86,0%  |            | 100,0% |        |      |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | 1                | 60.951 | von 70.894 | 16     | von 16 |      |
| Todesfälle bei Direktaufnahme ohne Verlegung                         | Beobachtungswert | 7,1%   |            | 7,1%   |        |      |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | 1                | 4.544  | von 64.327 | 1      | von 14 |      |
| Anteil transmuraler Herzinfarkte (STEMI)                             | Information      | 33,8%  |            | 6,3%   |        |      |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | 1                | 23.934 | von 70.824 | 1      | von 16 |      |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Transmuraler Herzinfarkt                | < Erwartungswert | 11,0%  |            | n.a.   |        |      |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | 1                | 2.623  | von 23.934 | <4     |        |      |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Nicht-transmuraler Herzinfarkt (NSTEMI) | < Erwartungswert | 4,7%   |            | 6,7%   |        | 8,4% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | 1                | 2.188  | von 46.325 | 1      | von 15 |      |
| Todesfälle bei Nebendiagnose Herzinfarkt                             | Beobachtungswert | 17,3%  |            | 13,6%  |        |      |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | 1                | 3.490  | von 20.146 | 3      | von 22 |      |

Herzinsuffizienz

|                                                                                                     |                  |        |             |       |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------------|-------|--------|-------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Herzinsuffizienz                                                       | < Erwartungswert | 7,6%   |             | 16,0% |        | 11,1% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | 1 / 5            | 12.766 | von 166.959 | 15    | von 94 | 1,44  |
| Anteil Behandlungsfälle mit Beschwerden bei Linksherzinsuffizienz bereits im Ruhezustand (NYHA IV)  | Information      | 46,6%  |             | 56,1% |        |       |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | 1                | 53.334 | von 114.561 | 37    | von 66 |       |
| Anteil Behandlungsfälle mit Beschwerden bei Rechtsherzinsuffizienz bereits im Ruhezustand (NYHA IV) | Information      | 5,5%   |             | 12,0% |        |       |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | 1                | 2.710  | von 49.553  | 3     | von 25 |       |

Linksherzkatheter

|                                                                                                                                                                                    |                   |             |             |       |        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------|--------|-------|
| Anzahl aller Linksherzkatheter zur Koronardiagnostik                                                                                                                               | Mengeninformation | 847,3 (758) |             | 39    |        |       |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                                                     | 2                 | 271.132     |             |       |        |       |
| Todesfälle mit Linksherzkatheter bei Herzinfarkt ohne Zuverlegungen oder Herz-Kreislauf-Stillstand vor Krankenhaus-Aufnahme und ohne Herzoperation                                 | < Erwartungswert  | 4,2%        |             | 7,1%  |        | 8,0%  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                                                     | 1                 | 2.310       | von 54.643  | 1     | von 14 | 0,89  |
| Todesfälle bei diagnostischem Linksherzkatheter ohne Hauptdiagnose Herzinfarkt, ohne Zuverlegungen oder Herz-Kreislauf-Stillstand vor Krankenhaus-Aufnahme und ohne Herzoperation  | < Erwartungswert  | 1,0%        |             | 14,3% |        | 1,4%  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                                                     | 1                 | 1.215       | von 115.908 | 2     | von 14 | 10,30 |
| Todesfälle bei therapeutischem Linksherzkatheter ohne Hauptdiagnose Herzinfarkt, ohne Zuverlegungen oder Herz-Kreislauf-Stillstand vor Krankenhaus-Aufnahme und ohne Herzoperation | < Erwartungswert  | 1,3%        |             | 28,6% |        | 2,6%  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                                                     | 1                 | 1.010       | von 76.129  | 2     | von 7  |       |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                                                                     | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungs-wert |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                                     | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>    |
| Anteil der Behandlungen mit therapeutischem Linksherzkatheter ohne Hauptdiagnose Herzinfarkt und ohne Herzoperation | Information            | 39,4%                    | 33,3%                    |                        |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                      | 1                      | 78.048 von 198.022       | 7 von 21                 |                        |
| Herzrhythmusstörungen                                                                                               |                        |                          |                          |                        |
| Behandlungsfälle mit Herzrhythmusstörungen als Hauptdiagnose                                                        | Mengeninformation      | 515,0 (355)              | 9                        |                        |
|                                                                                                                     | 2                      | 186.941                  |                          |                        |
| Versorgung mit Schrittmacher oder Defibrillator                                                                     |                        |                          |                          |                        |
| Versorgung mit Herzschrittmacher oder Defibrillator                                                                 | Mengeninformation      | 152,3 (107)              | n.a.                     |                        |
|                                                                                                                     | 2                      | 47.357                   | <4                       |                        |
| Ablative Therapie                                                                                                   |                        |                          |                          |                        |
| Behandlungsfälle mit kathetergestützter ablativer Therapie                                                          | Mengeninformation      | 334,8 (248)              | n.a.                     |                        |
|                                                                                                                     | 2                      | 58.250                   | <4                       |                        |
| davon Vorhofablation bei Vorhofflimmern/-flattern, Anteil Todesfälle                                                | Information (SE)       | 0,0668%                  | n.a.                     |                        |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                      | 1 / 4                  | 26 von 38.921            | <4                       |                        |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

Präambel

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |

## Erkrankungen des Nervensystems und Schlaganfall

### Bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhaut

|                                                                         |                   |          |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------|--|
| Bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhäute als Hauptdiagnose | Mengeninformation | 35,1 (6) | n.a. |  |
|                                                                         | 2                 | 8.857    | <4   |  |

### Todesfälle bei allen Formen des Schlaganfalls

|                                           |                  |                    |          |       |
|-------------------------------------------|------------------|--------------------|----------|-------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Schlaganfall | < Erwartungswert | 9,7%               | 3,1%     | 13,1% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre            | 1                | 10.387 von 107.151 | 3 von 96 |       |

### Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirninfarkt

|                                          |                  |                  |          |       |
|------------------------------------------|------------------|------------------|----------|-------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirninfarkt | < Erwartungswert | 7,1%             | 3,4%     | 11,4% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre           | 1 / 5            | 6.511 von 92.264 | 3 von 89 |       |

|                                                                                                          |             |                   |           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------|--|
| Anteil der Hirninfarkte mit medikamentöser Auflösung des Blutgerinnsels (Thrombolyse) ohne Zuverlegungen | Information | 18,4%             | 27,6%     |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                           | 1           | 15.600 von 84.989 | 21 von 76 |  |

|                                                                                                                           |                  |                  |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|--|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirninfarkt mit medikamentöser Auflösung des Blutgerinnsels (Thrombolyse) ohne Zuverlegungen | Beobachtungswert | 6,8%             | 0,0%     |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                            | 1                | 1.061 von 15.600 | 0 von 21 |  |

|                                                                                                                        |             |                  |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|--|
| Anteil Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Hirninfarkt mit Entfernung des Blutgerinnsels durch Katheter (Thrombektomie) | Information | 10,7%            | 0,0%     |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                         | 1           | 9.955 von 93.342 | 0 von 90 |  |

|                                                                                    |                  |                  |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|--|
| davon Anteil der Hirninfarkte mit Lungenentzündung, die bei Aufnahme nicht bestand | Beobachtungswert | 4,9%             | 4,4%     |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                     | 1                | 4.566 von 93.342 | 4 von 90 |  |

|                                                                                               |                  |                 |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------|--|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirninfarkt mit Lungenentzündung, die bei Aufnahme nicht bestand | Beobachtungswert | 25,7%           | 25,0%   |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                | 1                | 1.174 von 4.566 | 1 von 4 |  |

|                                                          |                  |                  |         |  |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------|--|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirnblutung (intrazerebral) | Beobachtungswert | 28,8%            | 0,0%    |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                           | 1                | 3.227 von 11.199 | 0 von 6 |  |

|                                                           |                  |               |      |  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------|------|--|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirnblutung (subarachnoidal) | Beobachtungswert | 18,3%         | n.a. |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                            | 1                | 649 von 3.550 | <4   |  |

|                                                                 |        |                 |          |  |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------|--|
| Anteil nicht näher bezeichneter Schlaganfälle als Hauptdiagnose | <0,42% | 0,24%           | 0,0%     |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                  | 1      | 259 von 108.712 | 0 von 97 |  |

|                                                                         |                       |               |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------|--|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose TIA ohne Neubildungen und Kopfverletzungen | Beobachtungswert (SE) | 0,2763%       | n.a. |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                          | 1 / 4                 | 96 von 34.751 | <4   |  |

### Behandlung auf einer Stroke Unit

|                                                                    |                   |             |    |  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----|--|
| Behandlungsfälle mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung | Mengeninformation | 529,3 (530) | 95 |  |
|                                                                    | 2                 | 109.573     |    |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                                                                                                           | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungs-wert |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                           | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>    |
| Anteil Hauptdiagnose Hirninfarkte mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung                                                                       | Information            | 76,3%                    | 84,4%                    |                        |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                            | 1                      | 71.261 von 93.342        | 76 von 90                |                        |
| Anteil Hauptdiagnose TIA mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung                                                                                | Information            | 76,7%                    | n.a.                     |                        |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                            | 1                      | 26.855 von 34.991        | <4                       |                        |
| Anteil mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung ohne Zuverlegungen (in Anlehnung an Schlaganfallregister) bei Hauptdiagnose Hirninfarkt oder TIA | Beobachtungswert       | 78,2%                    | 96,1%                    |                        |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                            | 1                      | 94.089 von 120.268       | 74 von 77                |                        |
| Anteil mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung nur Zuverlegungen (in Anlehnung an Schlaganfallregister) bei Hauptdiagnose Hirninfarkt oder TIA  | Information            | 49,9%                    | 14,3%                    |                        |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                            | 1                      | 4.027 von 8.065          | 2 von 14                 |                        |
| Epilepsie                                                                                                                                                 |                        |                          |                          |                        |
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Epilepsie                                                                                                              | Mengeninformation      | 116,8 (44)               | 8                        |                        |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                            | 2                      | 39.466                   |                          |                        |
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Epilepsie                                                                                                              | Mengeninformation      | 51,5 (18)                | 4                        |                        |
| Alle Patient:innen < 20 Jahre                                                                                                                             | 2                      | 10.510                   |                          |                        |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |

Altersmedizin

Geriatrische Frührehabilitation

|                                                       |                   |             |     |  |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----|--|
| Behandlungsfälle mit geriatrischer Frührehabilitation | Mengeninformation | 532,4 (447) | 836 |  |
|                                                       | 2                 | 122.983     |     |  |

Mangelernährung bei Älteren

|                                                                                  |             |                      |              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|--|
| Anteil Behandlungsfälle mit erheblicher Mangelernährung und ohne Tumorerkrankung | Information | 0,88%                | 3,14%        |  |
| Alle Patient:innen >= 65 Jahre                                                   | 1           | 21.895 von 2.486.668 | 97 von 3.092 |  |

|                                                                                                                 |             |                |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------|--|
| Anteil Behandlungsfälle mit Sonden-/Infusionsernährung bei erheblicher Mangelernährung und ohne Tumorerkrankung | Information | 1,8%           | 1,0%     |  |
| Alle Patient:innen >= 65 Jahre                                                                                  | 1           | 387 von 21.895 | 1 von 97 |  |

Delir

|                                                                      |             |                      |              |  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|--|
| Anteil Behandlungsfälle mit aufgetretenem Delir an operierten Fällen | Information | 3,0%                 | 4,2%         |  |
| Alle Patient:innen >= 60 Jahre                                       | 1           | 40.039 von 1.327.814 | 64 von 1.524 |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    |  | Klinik Ist-Wert          |  | Klinik Erwartungs-wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--|------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> |  | <a href="#">Fallzahl</a> |  | <a href="#">SMR</a>    |

Lungenerkrankungen

Lungenentzündung (Pneumonie)

|                                                                                                     |                       |        |             |       |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-------------|-------|---------|-------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung                                                       | < Erwartungswert      | 10,0%  |             | 7,7%  |         | 14,3% |
| alle Altersgruppen                                                                                  | 1                     | 16.307 | von 162.332 | 15    | von 194 |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung ohne Zuverlegung, Tumor, Mukoviszidose                | < Erwartungswert      | 9,2%   |             | 7,6%  |         | 15,8% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | 1                     | 10.353 | von 112.464 | 8     | von 105 |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung ohne Zuverlegung, Tumor, Mukoviszidose, COVID-19      | < Erwartungswert      | 8,6%   |             | 8,4%  |         | 13,9% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | 1 / 5                 | 8.604  | von 100.621 | 8     | von 95  | 0,61  |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung ohne Zuverlegung, Tumor, Mukoviszidose                | Beobachtungswert (SE) | 0,15%  |             | 0,0%  |         |       |
| Alle Patient:innen 1 bis 19 Jahre                                                                   | 1 / 4                 | 28     | von 18.387  | 0     | von 43  |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung durch Aspiration von Nahrungsmitteln oder Mageninhalt | Beobachtungswert      | 27,8%  |             | 22,2% |         |       |
|                                                                                                     | 1                     | 3.446  | von 12.409  | 6     | von 27  |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Bronchitis oder Bronchiolitis ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose | < Erwartungswert      | 1,9%   |             | 0,0%  |         | 2,7%  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | 1                     | 244    | von 13.186  | 0     | von 20  |       |

COPD (Chronisch obstruktive Lungenkrankheit)

|                                   |                  |       |            |      |        |      |
|-----------------------------------|------------------|-------|------------|------|--------|------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose COPD | < Erwartungswert | 4,4%  |            | 2,8% |        | 6,7% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre    | 1                | 2.907 | von 66.452 | 1    | von 36 | 0,42 |

Lungenkrebs

|                                                |                   |            |  |    |  |  |
|------------------------------------------------|-------------------|------------|--|----|--|--|
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Lungenkrebs | Mengeninformation | 191,4 (52) |  | 16 |  |  |
|                                                | 2                 | 66.602     |  |    |  |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    |  |  | Klinik Ist-Wert          |  |  | Klinik Erwartungs-wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--|--|--------------------------|--|--|------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> |  |  | <a href="#">Fallzahl</a> |  |  | <a href="#">SMR</a>    |

Erkrankungen der Bauchorgane

Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen (ohne Tumor)

|                                                                                          |                  |         |     |        |       |     |     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----|--------|-------|-----|-----|--|
| Anteil laparoskopischer Operationen bei Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen     | >95,1%           | 96,0%   |     |        | 96,6% |     |     |  |
|                                                                                          | 1                | 50.963  | von | 53.069 | 142   | von | 147 |  |
| Anteil Umsteiger auf offene Operationen bei Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen | Beobachtungswert | 2,4%    |     |        | 2,0%  |     |     |  |
|                                                                                          | 1                | 1.269   | von | 53.069 | 3     | von | 147 |  |
| Todesfälle bei Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen                              | <0,60% (SE)      | 0,4541% |     |        | 0,0%  |     |     |  |
|                                                                                          | 1 / 4            | 241     | von | 53.069 | 0     | von | 147 |  |

Operation von Leisten-, Schenkel- und Nabelbrüchen (Hernien)

|                                                                   |                  |         |     |        |       |     |     |  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----|--------|-------|-----|-----|--|
| Todesfälle bei Bruchoperationen ohne anteilige Darmentfernung     | <0,12% (SE)      | 0,1007% |     |        | 0,0%  |     |     |  |
|                                                                   | 1 / 4            | 71      | von | 70.497 | 0     | von | 213 |  |
| Todesfälle bei Bruchoperationen mit anteiliger Darmentfernung     | Beobachtungswert | 2,3%    |     |        | 0,0%  |     |     |  |
|                                                                   | 1                | 144     | von | 6.140  | 0     | von | 27  |  |
| Anteil Behandlungsfälle mit Leistenbruchoperation mit Netzeinlage | Information      | 9,7%    |     |        | n.a.  |     |     |  |
| Alle Patient:innen < 20 Jahre                                     | 1                | 290     | von | 2.984  | <4    |     |     |  |
| Anteil Behandlungsfälle mit Leistenbruchoperation mit Netzeinlage | Information      | 98,2%   |     |        | 98,2% |     |     |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                    | 1                | 44.462  | von | 45.266 | 161   | von | 164 |  |

Eingriffe an der Schilddrüse

|                                                                                      |                   |           |     |        |      |     |   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----|--------|------|-----|---|--|
| Behandlungsfälle mit operativer Entfernung der Schilddrüse                           | Mengeninformation | 61,6 (24) |     |        | 6    |     |   |  |
|                                                                                      | 2                 | 17.239    |     |        |      |     |   |  |
| Behandlungsfälle mit operativer Entfernung der Schilddrüse bei Schilddrüsenkrebs     | Mengeninformation | 13,2 (6)  |     |        | n.a. |     |   |  |
|                                                                                      | 2                 | 2.639     |     |        | <4   |     |   |  |
| Behandlungsfälle mit operativer Entfernung der Schilddrüse bei gutartiger Erkrankung | Mengeninformation | 51,6 (22) |     |        | 4    |     |   |  |
|                                                                                      | 2                 | 13.633    |     |        |      |     |   |  |
| Anteil der Beatmungsfälle (> 24 Std.) nach Schilddrüseneingriff                      | Information (SE)  | 0,55%     |     |        | 0,0% |     |   |  |
|                                                                                      | 1 / 4             | 89        | von | 16.263 | 0    | von | 6 |  |

Große Operationen am Dick- und Enddarm (Kolon und Rektum)

|                                                         |                   |            |     |        |      |     |    |  |
|---------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----|--------|------|-----|----|--|
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Dick-/Enddarmkrebs   | Mengeninformation | 129,6 (84) |     |        | 212  |     |    |  |
|                                                         | 2                 | 44.981     |     |        |      |     |    |  |
| Behandlungsfälle mit Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn | Mengeninformation | 99,5 (62)  |     |        | 64   |     |    |  |
|                                                         | 2                 | 38.009     |     |        |      |     |    |  |
| Todesfälle bei operativer Entfernung des Dick-/Enddarms | Beobachtungswert  | 7,4%       |     |        | 4,7% |     |    |  |
|                                                         | 1                 | 2.681      | von | 36.051 | 3    | von | 64 |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

Präambel

| IQM Indikatoren                                                                               | <div>IQM<br/>Zielwert</div> <div>Quelle</div>   | <div>IQM<br/>Durchschnittswert</div> <div>Fallzahl</div> | <div>Klinik<br/>Ist-Wert</div> <div>Fallzahl</div> | <div>Klinik<br/>Erwartungs-<br/>wert</div> <div>SMR</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                               |                                                 |                                                          |                                                    |                                                           |
| Todesfälle bei operativer Dickdarmentfernung bei Krebs ohne komplizierende Diagnose           | <div>&lt; Erwartungswert</div> <div>1 / 5</div> | <div>3,3%</div> <div>293 von 8.881</div>                 | <div>0,0%</div> <div>0 von 11</div>                | <div>4,2%</div> <div>0,00</div>                           |
| Todesfälle bei operativer Dickdarmentfernung bei Krebs mit komplizierender Diagnose           | <div>Beobachtungswert</div> <div>1</div>        | <div>10,5%</div> <div>272 von 2.590</div>                | <div>10,0%</div> <div>2 von 20</div>               |                                                           |
| Todesfälle bei operativer Enddarmentfernung bei Krebs                                         | <div>&lt;3,2%</div> <div>1</div>                | <div>2,5%</div> <div>105 von 4.184</div>                 | <div>0,0%</div> <div>0 von 6</div>                 |                                                           |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Divertikel ohne Abszess/Perforation | <div>&lt;0,72% (SE)</div> <div>1 / 4</div>      | <div>0,6938%</div> <div>14 von 2.018</div>               | <div>n.a.</div> <div>&lt;4</div>                   |                                                           |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Divertikel mit Abszess/Perforation  | <div>Beobachtungswert</div> <div>1</div>        | <div>5,5%</div> <div>259 von 4.729</div>                 | <div>0,0%</div> <div>0 von 14</div>                |                                                           |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Darmischämie                        | <div>Information</div> <div>1</div>             | <div>42,9%</div> <div>904 von 2.109</div>                | <div>n.a.</div> <div>&lt;4</div>                   |                                                           |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn  | <div>Beobachtungswert</div> <div>1</div>        | <div>2,6%</div> <div>54 von 2.076</div>                  | <div>25,0%</div> <div>1 von 4</div>                |                                                           |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei anderen Diagnosen                   | <div>Information</div> <div>1</div>             | <div>8,2%</div> <div>780 von 9.464</div>                 | <div>0,0%</div> <div>0 von 6</div>                 |                                                           |
| Anteil operative Leberentfernung bei Entfernung des Dick-/Enddarms bei Dick- und Enddarmkrebs | <div>Information</div> <div>1</div>             | <div>4,1%</div> <div>648 von 15.655</div>                | <div>2,7%</div> <div>1 von 37</div>                |                                                           |
| Behandlungsfälle mit roboterassistiertem Eingriff bei Krebserkrankung des Darms               | <div>Information</div> <div>1</div>             | <div>20,1%</div> <div>3.153 von 15.655</div>             | <div>0,0%</div> <div>0 von 37</div>                |                                                           |

Erkrankungen des Magens

|                                                                                                              |                                           |                                           |                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Magenkrebs (mit und ohne Magenoperation)                                  | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div> | <div>44,9 (25)</div> <div>14.822</div>    | <div>38</div>                       |  |
| Todesfälle bei Geschwüren an Magen, Zwölffingerdarm oder Dünndarm als Hauptdiagnose (mit und ohne Operation) | <div>Beobachtungswert</div> <div>1</div>  | <div>5,1%</div> <div>983 von 19.463</div> | <div>2,9%</div> <div>2 von 68</div> |  |
| Behandlungsfälle mit Magenentfernungen                                                                       | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div> | <div>38,2 (11)</div> <div>10.463</div>    | <div>n.a.</div> <div>&lt;4</div>    |  |
| Todesfälle bei operativer Magenentfernung bei Magenkrebs ohne Speiseröhreneingriff                           | <div>Beobachtungswert</div> <div>1</div>  | <div>5,3%</div> <div>100 von 1.881</div>  | <div>n.a.</div> <div>&lt;4</div>    |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                                                             | IQM Zielwert              | IQM Durchschnittswert     | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungs-wert |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                             | <a href="#">Quelle</a>    | <a href="#">Fallzahl</a>  | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>    |
| Todesfälle bei operativer Magenentfernung bei anderer Diagnose (nicht Magenkrebs) ohne Speiseröhreneingriff | Beobachtungswert<br><br>1 | 2,9%<br><br>244 von 8.389 | n.a.<br><br><4           |                        |
| Eingriffe an der Bauchspeicheldrüse und der Leber                                                           |                           |                           |                          |                        |
| Todesfälle bei anatomischer Leberentfernung                                                                 | Beobachtungswert<br><br>1 | 5,7%<br><br>158 von 2.777 | n.a.<br><br><4           |                        |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                              |                           |                           |                          |                        |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | <div>IQM<br/>Zielwert</div> <div><a href="#">Quelle</a></div> | <div>IQM<br/>Durchschnittswert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Ist-Wert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Erwartungs-<br/>wert</div> <div><a href="#">SMR</a></div> |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

Gefäßoperationen

Eingriffe an der Halsschlagader (Carotis)

|                                                                            |        |              |         |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------|--|
| Todesfälle bei ausschließlich extrakranieller Operation der Halsschlagader | <1,09% | 0,87%        | 0,0%    |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                             | 1      | 83 von 9.541 | 0 von 6 |  |

Eingriffe der Becken-/Bein-Arterien

|                                                     |             |                  |         |  |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------------|---------|--|
| Todesfälle bei Operationen der Becken-/Beinarterien | Information | 5,5%             | 0,0%    |  |
|                                                     | 1           | 1.525 von 27.921 | 0 von 5 |  |
| davon Todesfälle bei Ulzeration/Gangrän             | <4,5%       | 3,5%             | n.a.    |  |
|                                                     | 1           | 118 von 3.335    | <4      |  |

PTA (Perkutan transluminale Gefäßinterventionen)

|                                                                                       |                   |                  |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------|--|
| Todesfälle bei Wiedereröffnung eines verschlossenen Gefäßes mittels Ballonkatheter    | Beobachtungswert  | 2,9%             | 12,5%   |  |
|                                                                                       | 1                 | 1.699 von 57.910 | 1 von 8 |  |
| PTA Abdomen/Beinarterien mit arterieller Operation im gleichen stationären Aufenthalt | Mengeninformation | 49,2 (41)        | 4       |  |
|                                                                                       | 2                 | 10.032           |         |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungs-wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>    |

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Geburtshilfe

|                                                                                  |                       |                             |                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|--|
| Mütterliche Todesfälle bei der Geburt                                            | <0,005% (SE)<br>1 / 4 | 0,0041%<br>9 von 219.797    | 0,0%<br>0 von 377   |  |
| Anteil vaginale Geburten mit Dammriss 4. Grades                                  | <0,125% (SE)<br>1 / 4 | 0,1066%<br>155 von 145.432  | 0,0%<br>0 von 286   |  |
| Anteil vaginale Geburten mit Dammschnitt                                         | Information<br>1      | 9,1%<br>13.162 von 145.432  | 23,4%<br>67 von 286 |  |
| Anteil Kaiserschnitt an allen Geburten                                           | Information<br>1      | 33,8%<br>74.365 von 219.797 | 24,1%<br>91 von 377 |  |
| Anteil sanfter Kaiserschnitt (nach Misgav-Ladach) an allen Kaiserschnittgeburten | Information<br>1      | 79,3%<br>58.956 von 74.365  | 72,5%<br>66 von 91  |  |
| Anteil Kaiserschnitte bei risikoarmer Geburt                                     | Information<br>1      | 28,7%<br>55.478 von 193.134 | 21,6%<br>75 von 348 |  |
| davon Anteil Kaiserschnitte bei risikoarmer Geburt                               | Information<br>1      | 26,4%<br>37.312 von 141.193 | 20,7%<br>54 von 261 |  |
| Alle Patient:innen < 35 Jahre                                                    |                       |                             |                     |  |
| davon Anteil Kaiserschnitte bei risikoarmer Geburt                               | Information<br>1      | 35,0%<br>18.166 von 51.941  | 24,1%<br>21 von 87  |  |
| Alle Patient:innen > 34 Jahre                                                    |                       |                             |                     |  |

Neugeborene

|                                                                |                        |                         |            |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|--|
| davon Neugeborene mit Geburtsgewicht von 1.250 bis 1.499 Gramm | Mengeninformation<br>2 | 10,0 (9)<br>894         | n.a.<br><4 |  |
| davon Neugeborene mit Geburtsgewicht von 1.500 bis 2.499 Gramm | Mengeninformation<br>2 | 66,4 (24)<br>13.148     | 15         |  |
| davon Neugeborene mit Geburtsgewicht > 2.500 Gramm             | Mengeninformation<br>2 | 1056,9 (776)<br>218.786 | 373        |  |

Frauenheilkunde

|                                                                                                            |                      |                            |                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|--|
| Todesfälle bei operativer Entfernung der Gebärmutter bei gutartigen Erkrankungen                           | <0,04% (SE)<br>1 / 4 | 0,0364%<br>8 von 21.973    | 0,0%<br>0 von 20   |  |
| Alle Patient:innen > 14 Jahre                                                                              |                      |                            |                    |  |
| Anteil der Behandlungsfälle mit vaginaler/laparoskopischer Gebärmutterentfernung ohne plastische Operation | >88,4%<br>1          | 90,5%<br>19.712 von 21.793 | 80,0%<br>16 von 20 |  |
| Alle Patient:innen > 14 Jahre                                                                              |                      |                            |                    |  |
| Anteil der Behandlungsfälle mit vaginaler Entfernung durch Zerkleinerung der Gebärmutter                   | Information<br>1     | 25,4%<br>5.546 von 21.793  | 80,0%<br>16 von 20 |  |
| Alle Patient:innen > 14 Jahre                                                                              |                      |                            |                    |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                                                                    | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungs-wert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                                    | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>    |
| Anteil der Behandlungsfälle mit vaginaler Gebärmutterentfernung durch Zerkleinerung der Gebärmutter                |                        |                          |                          |                        |
| Alle Patient:innen > 14 Jahre                                                                                      | Information            | 5,2%                     | 0,0%                     |                        |
|                                                                                                                    | 1                      | 291 von 5.546            | 0 von 16                 |                        |
| Anteil der Behandlungsfälle mit laparoskopischer Gebärmutterentfernung ohne plastische Operation                   |                        |                          |                          |                        |
| Alle Patient:innen > 14 Jahre                                                                                      | Information            | 65,0%                    | 0,0%                     |                        |
|                                                                                                                    | 1                      | 14.166 von 21.793        | 0 von 20                 |                        |
| Anteil der Behandlungsfälle mit Eierstock- und Gebärmutterentfernung bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose |                        |                          |                          |                        |
| Alle Patient:innen > 14 und < 50 Jahre                                                                             | Information            | 5,5%                     | 12,5%                    |                        |
|                                                                                                                    | 1                      | 391 von 7.162            | 1 von 8                  |                        |
| Anteil der Behandlungsfälle mit Eierstock- und Gebärmutterentfernung bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose |                        |                          |                          |                        |
| Alle Patient:innen >= 50 Jahre                                                                                     | Information            | 33,7%                    | 25,0%                    |                        |
|                                                                                                                    | 1                      | 2.811 von 8.334          | 3 von 12                 |                        |
| Bösartige Neubildungen der Brust und der weiblichen Geschlechtsorgane                                              |                        |                          |                          |                        |
| Behandlungsfälle mit Krebserkrankung der Brust oder der Geschlechtsorgane als Hauptdiagnose                        |                        |                          |                          |                        |
|                                                                                                                    | Mengeninformation      | 209,8 (60)               | 15                       |                        |
|                                                                                                                    | 2                      | 71.973                   |                          |                        |
| Behandlungsfälle mit Eierstockkrebs als Hauptdiagnose                                                              |                        |                          |                          |                        |
|                                                                                                                    | Mengeninformation      | 31,1 (12)                | 7                        |                        |
|                                                                                                                    | 2                      | 9.486                    |                          |                        |
| Todesfälle nach Eierstockentfernung bei Eierstockkrebs                                                             |                        |                          |                          |                        |
|                                                                                                                    | Beobachtungswert       | 1,3%                     | n.a.                     |                        |
|                                                                                                                    | 1                      | 35 von 2.649             | <4                       |                        |
| Behandlungsfälle mit Gebärmutterkrebs als Hauptdiagnose                                                            |                        |                          |                          |                        |
|                                                                                                                    | Mengeninformation      | 52,3 (29)                | 4                        |                        |
|                                                                                                                    | 2                      | 14.604                   |                          |                        |
| Behandlungsfälle mit Brustkrebs als Hauptdiagnose                                                                  |                        |                          |                          |                        |
|                                                                                                                    | Mengeninformation      | 133,9 (26)               | n.a.                     |                        |
|                                                                                                                    | 2                      | 44.064                   | <4                       |                        |
| Eingriffe am Beckenboden bei der Frau                                                                              |                        |                          |                          |                        |
| Behandlungsfälle mit Beckenbodenoperationen mit und ohne plastische Operation                                      |                        |                          |                          |                        |
|                                                                                                                    | Mengeninformation      | 78,5 (62)                | 38                       |                        |
|                                                                                                                    | 2                      | 20.182                   |                          |                        |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

Präambel

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |

## Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe

### Bösartige Neubildungen des Bewegungsapparates

|                                                                                                                                    |                   |          |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------|--|
| Behandlungsfälle mit bösartiger Neubildung an Knochen, Gelenkknorpel, peripheren Nerven, Retroperitoneum, Bindegewebe, Weichteilen | Mengeninformation | 46,8 (5) | n.a. |  |
|                                                                                                                                    | 2                 | 14.169   | <4   |  |

### Gelenkersatz (Endoprothetik)

|                                                                                                                                           |                                    |                              |                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------|--|
| Todesfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung                                        | <0,13% (SE)<br><br>1 / 4           | 0,0846%<br><br>51 von 60.250 | 0,0%<br><br>0 von 6  |  |
| Todesfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei hüftgelenksnahen Frakturen                                                         | Beobachtungswert<br><br>1          | 4,7%<br><br>985 von 20.903   | 3,8%<br><br>1 von 26 |  |
| Todesfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei anderen Diagnosen                                                                  | Beobachtungswert<br><br>1          | 4,7%<br><br>319 von 6.857    | 0,0%<br><br>0 von 8  |  |
| Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung | Beobachtungswert<br><br>1          | 2,0%<br><br>1.222 von 60.250 | 0,0%<br><br>0 von 6  |  |
| Todesfälle bei Wechsel eines Hüftgelenkersatzes ohne Fraktur oder Infektion                                                               | <1,42% (SE)<br><br>1 / 4           | 1,36%<br><br>65 von 4.781    | n.a.<br><br><4       |  |
| Todesfälle bei Wechsel eines Hüftgelenkersatzes wegen Fraktur oder Infektion                                                              | Beobachtungswert<br><br>1          | 4,1%<br><br>169 von 4.150    | n.a.<br><br><4       |  |
| Todesfälle bei Kniegelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung                                        | <0,06% (SE)<br><br>1 / 4           | 0,0278%<br><br>18 von 64.683 | n.a.<br><br><4       |  |
| Todesfälle bei Kniegelenkersatz (Erstimplantation) bei anderen Diagnosen                                                                  | Beobachtungswert (SE)<br><br>1 / 4 | 0,5193%<br><br>19 von 3.659  | n.a.<br><br><4       |  |
| Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei Kniegelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung | Beobachtungswert<br><br>1          | 1,4%<br><br>874 von 64.683   | n.a.<br><br><4       |  |
| Todesfälle bei Wechsel eines Kniegelenk oder -teilersatzes ohne Fraktur oder Infektion                                                    | <0,20% (SE)<br><br>1 / 4           | 0,3095%<br><br>16 von 5.169  | n.a.<br><br><4       |  |
| Todesfälle bei Hüft- oder Kniegelenkersatz bei Tumorerkrankung                                                                            | Beobachtungswert<br><br>1          | 6,1%<br><br>150 von 2.456    | 0,0%<br><br>0 von 4  |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

Präambel

| IQM Indikatoren                                                                                                                                   | IQM Zielwert          | IQM Durchschnittswert |     |        | Klinik Ist-Wert |     |    | Klinik Erwartungs-wert |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----|--------|-----------------|-----|----|------------------------|
|                                                                                                                                                   | Quelle                | Fallzahl              |     |        | Fallzahl        |     |    | SMR                    |
| Hüftgelenknahe Frakturen                                                                                                                          |                       |                       |     |        |                 |     |    |                        |
| Todesfälle nach operativer Versorgung einer Schenkelhalsfraktur als Hauptdiagnose                                                                 | < Erwartungswert      | 4,3%                  |     |        | 3,8%            |     |    | 6,6%                   |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                    | 1                     | 984                   | von | 22.984 | 1               | von | 26 | 0,58                   |
| Todesfälle nach Gelenkersatz bei Schenkelhalsfraktur als Hauptdiagnose                                                                            | Beobachtungswert      | 4,7%                  |     |        | 3,8%            |     |    |                        |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                    | 1                     | 961                   | von | 20.474 | 1               | von | 26 |                        |
| Todesfälle nach operativer Versorgung einer pertrochantären Fraktur als Hauptdiagnose                                                             | < Erwartungswert      | 4,6%                  |     |        | 0,0%            |     |    | 5,7%                   |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                    | 1                     | 873                   | von | 19.033 | 0               | von | 43 | 0,00                   |
| Todesfälle nach Osteosynthese (Verbindung der Knochenfragmente durch Platten, Schrauben oder Nägel) bei pertrochantärer Fraktur als Hauptdiagnose | Beobachtungswert      | 4,6%                  |     |        | 0,0%            |     |    |                        |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                    | 1                     | 852                   | von | 18.645 | 0               | von | 43 |                        |
| Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark                                                                                                  |                       |                       |     |        |                 |     |    |                        |
| Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark (ohne lokale Schmerztherapie)                                                                    | Mengeninformation     | 341,5 (227)           |     |        | 68              |     |    |                        |
|                                                                                                                                                   | 2                     | 115.097               |     |        |                 |     |    |                        |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder Wirbelkörper-Ersatz bei Tumor (inkl. komplexe Rekonstruktionen)                                      | Beobachtungswert      | 7,7%                  |     |        | n.a.            |     |    |                        |
|                                                                                                                                                   | 1                     | 265                   | von | 3.455  | <4              |     |    |                        |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder Wirbelkörper-Ersatz bei Trauma (inkl. komplexe Rekonstruktionen, Rückenmarkoperation)                | Beobachtungswert      | 3,5%                  |     |        | 0,0%            |     |    |                        |
|                                                                                                                                                   | 1                     | 505                   | von | 14.334 | 0               | von | 22 |                        |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Operation bei Entzündung der Bandscheibe oder des Rückenmarks                                                         | Beobachtungswert      | 7,5%                  |     |        | n.a.            |     |    |                        |
|                                                                                                                                                   | 1                     | 198                   | von | 2.624  | <4              |     |    |                        |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder 1 Wirbelkörper-Ersatz (ohne Tumor, Trauma oder kompl. Rekonstruktionen)                              | Beobachtungswert (SE) | 0,0739%               |     |        | 0,0%            |     |    |                        |
|                                                                                                                                                   | 1 / 4                 | 10                    | von | 13.530 | 0               | von | 7  |                        |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder 2 Wirbelkörper-Ersatz (ohne Tumor, Trauma oder kompl. Rekonstruktionen)                              | Beobachtungswert (SE) | 0,2279%               |     |        | n.a.            |     |    |                        |
|                                                                                                                                                   | 1 / 4                 | 16                    | von | 7.022  | <4              |     |    |                        |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder 3 oder mehr Wirbelkörper-Ersatz (ohne Tumor, Trauma oder kompl. Rekonstruktionen)                    | Beobachtungswert (SE) | 0,6394%               |     |        | n.a.            |     |    |                        |
|                                                                                                                                                   | 1 / 4                 | 36                    | von | 5.630  | <4              |     |    |                        |
| Todesfälle bei alleiniger 'Entlastung' (Dekompression) der Wirbelsäule                                                                            | Beobachtungswert (SE) | 0,1044%               |     |        | 0,0%            |     |    |                        |
|                                                                                                                                                   | 1 / 4                 | 25                    | von | 23.952 | 0               | von | 5  |                        |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                                                                                      | IQM Zielwert                   | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungs-wert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                      | <a href="#">Quelle</a>         | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>    |
| Todesfälle bei 'einfachen' Bandscheibenentfernungen                                                                                  | <0,03% (SE)<br>1 / 4           | 0,0253%<br>4 von 15.826  | n.a.<br><4               |                        |
| Todesfälle bei Vertebro-/Kyphoplastie (ohne Tumor, Trauma, kompl. Rekonstruktion, Versteifung, WK-Ersatz oder Bandscheibeneingriffe) | <0,53% (SE)<br>1 / 4           | 0,3634%<br>24 von 6.605  | 0,0%<br>0 von 14         |                        |
| Todesfälle bei anderen Operationen an der Wirbelsäule oder am Rückenmark                                                             | Beobachtungswert<br>1          | 1,9%<br>410 von 21.255   | 0,0%<br>0 von 6          |                        |
| Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei 'einfachen' Bandscheibenentfernungen                                           | Beobachtungswert (SE)<br>1 / 4 | 0,4234%<br>67 von 15.826 | n.a.<br><4               |                        |
| Lokale Schmerztherapie an der Wirbelsäule (ohne andere Wirbelsäulen- oder Rückenmarkoperation)                                       | Mengeninformation<br>2         | 87,1 (38)<br>27.869      | 13                       |                        |
| Behandlungsfälle mit Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen als Hauptdiagnose ohne Operation oder lokale Schmerztherapie            | Mengeninformation<br>2         | 142,4 (118)<br>53.541    | 22                       |                        |
| Operationen am Bewegungsapparat inkl. Endoprothetik                                                                                  |                                |                          |                          |                        |
| Gelenkersatz am Schulter-/ Ellenbogengelenk                                                                                          | Mengeninformation<br>2         | 37,0 (27)<br>12.498      | 9                        |                        |
| Mehrfachverletzungen - Polytraumen                                                                                                   |                                |                          |                          |                        |
| Mehrfachverletzungen (Polytraumen) im Sinne der DRG-Definition                                                                       | Mengeninformation<br>2         | 21,7 (8)<br>6.970        | n.a.<br><4               |                        |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    |  |  | Klinik Ist-Wert          |  |  | Klinik Erwartungs-wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--|--|--------------------------|--|--|------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> |  |  | <a href="#">Fallzahl</a> |  |  | <a href="#">SMR</a>    |

Urologie

Operationen der Niere

|                                                                                             |                       |         |     |       |       |     |   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-----|-------|-------|-----|---|--|
| Todesfälle bei Totalentfernung der Niere bei bösartiger Neubildung                          | <1,8%                 | 1,7%    |     |       | 0,0%  |     |   |  |
|                                                                                             | 1                     | 54      | von | 3.262 | 0     | von | 5 |  |
| Anteil laparoskopischer Operationen bei Totalentfernung der Niere bei bösartiger Neubildung | Information           | 51,4%   |     |       | 0,0%  |     |   |  |
|                                                                                             | 1                     | 1.678   | von | 3.262 | 0     | von | 5 |  |
| Todesfälle bei Teilentfernung der Niere bei bösartiger Neubildung                           | <0,35% (SE)           | 0,255%  |     |       | n.a.  |     |   |  |
|                                                                                             | 1 / 4                 | 9       | von | 3.530 | <4    |     |   |  |
| Anteil laparoskopischer Operationen bei Teilentfernung der Niere bei bösartiger Neubildung  | Information           | 68,2%   |     |       | n.a.  |     |   |  |
|                                                                                             | 1                     | 2.409   | von | 3.530 | <4    |     |   |  |
| Anteil der Teilentfernungen der Niere bei bösartiger Neubildung                             | Information           | 52,0%   |     |       | 28,6% |     |   |  |
|                                                                                             | 1                     | 3.530   | von | 6.792 | 2     | von | 7 |  |
| Todesfälle bei Totalentfernung der Niere bei anderer Diagnose                               | Beobachtungswert      | 3,8%    |     |       | 0,0%  |     |   |  |
|                                                                                             | 1                     | 81      | von | 2.111 | 0     | von | 7 |  |
| Todesfälle bei Teilentfernung der Niere bei anderer Diagnose                                | Beobachtungswert (SE) | 0,2981% |     |       | n.a.  |     |   |  |
|                                                                                             | 1 / 4                 | 4       | von | 1.342 | <4    |     |   |  |
| Behandlungsfälle mit roboterassistierter Nierenentfernung bei bösartiger Neubildung         | Information           | 47,0%   |     |       | 0,0%  |     |   |  |
|                                                                                             | 1                     | 3.194   | von | 6.792 | 0     | von | 7 |  |

Harnblase

|                                                                                                       |                   |             |     |        |       |     |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----|--------|-------|-----|----|--|
| Behandlungsfälle mit Blasenkrebs als Hauptdiagnose                                                    | Mengeninformation | 133,5 (34)  |     |        | 85    |     |    |  |
|                                                                                                       | 2                 | 41.519      |     |        |       |     |    |  |
| Operationen an der Harnblase durch die Harnröhre                                                      | Mengeninformation | 223,6 (213) |     |        | 129   |     |    |  |
|                                                                                                       | 2                 | 43.155      |     |        |       |     |    |  |
| Operationen an der Harnblase durch die Harnröhre bei Blasenkrebs                                      | Mengeninformation | 177,8 (156) |     |        | 53    |     |    |  |
|                                                                                                       | 2                 | 30.056      |     |        |       |     |    |  |
| Operationen an der Harnblase durch die Harnröhre bei Blasenkrebs mit Einbringen von Chemotherapeutika | Beobachtungswert  | 18,1%       |     |        | 20,8% |     |    |  |
|                                                                                                       | 1                 | 5.445       | von | 30.056 | 11    | von | 53 |  |
| Todesfälle bei Entfernung der Harnblase                                                               | <4,8%             | 3,9%        |     |        | 0,0%  |     |    |  |
|                                                                                                       | 1                 | 111         | von | 2.840  | 0     | von | 5  |  |
| Todesfälle bei vollständiger Entnahme aller Organe des kleinen Beckens bei Mann oder Frau             | Beobachtungswert  | 5,2%        |     |        | 0,0%  |     |    |  |
|                                                                                                       | 1                 | 29          | von | 557    | 0     | von | 4  |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                                                                        | IQM Zielwert                   | IQM Durchschnittswert    |                |        | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungs-wert |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------|--------|--------------------------|------------------------|-----|
|                                                                                                                        | <a href="#">Quelle</a>         | <a href="#">Fallzahl</a> |                |        | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>    |     |
| Behandlungsfälle mit roboterassistierter Harnblasenentfernung                                                          | Information<br>1               | 615                      | 18,1%<br>von   | 3.397  | 0                        | 0,0%<br>von            | 9   |
| Prostata                                                                                                               |                                |                          |                |        |                          |                        |     |
| Todesfälle bei Operationen der Prostata durch die Harnröhre bei gutartigen Erkrankungen                                | <0,20% (SE)<br>1 / 4           | 27                       | 0,1034%<br>von | 26.117 | 0                        | 0,0%<br>von            | 91  |
| Todesfälle bei Operationen der Prostata durch die Harnröhre bei bösartigen Erkrankungen                                | Beobachtungswert (SE)<br>1 / 4 | 52                       | 0,7547%<br>von | 6.890  | 0                        | 0,0%<br>von            | 46  |
| Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei Behandlungsfällen mit Operation der Prostata durch die Harnröhre | Beobachtungswert<br>1          | 1.039                    | 3,1%<br>von    | 33.007 | 3                        | 2,2%<br>von            | 137 |
| Behandlungsfälle mit Prostatakrebs als Hauptdiagnose                                                                   | Mengeninformation<br>2         | 36.416                   | 113,4 (20)     |        | 70                       |                        |     |
| Todesfälle bei radikaler Prostataentfernung                                                                            | <0,16% (SE)<br>1 / 4           | 22                       | 0,1599%<br>von | 13.761 | 0                        | 0,0%<br>von            | 6   |
| Behandlungsfälle mit roboterassistierter Prostataentfernung                                                            | Information<br>1               | 11.251                   | 81,8%<br>von   | 13.761 | 0                        | 0,0%<br>von            | 6   |
| Nierensteine                                                                                                           |                                |                          |                |        |                          |                        |     |
| Behandlungsfälle mit Nierensteinen als Hauptdiagnose                                                                   | Mengeninformation<br>2         | 71.430                   | 209,5 (50)     |        | 225                      |                        |     |
| Anteil der Behandlungsfälle mit Intervention zur Steinentfernung bei Hauptdiagnose Nierensteine                        | Information<br>1               | 36.814                   | 51,5%<br>von   | 71.430 | 165                      | 73,3%<br>von           | 225 |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | <div>IQM<br/>Zielwert</div> <div><a href="#">Quelle</a></div> | <div>IQM<br/>Durchschnittswert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Ist-Wert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Erwartungs-<br/>wert</div> <div><a href="#">SMR</a></div> |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

Hautkrankheiten

Hautkrankheiten

|                                                             |                                           |                                       |                                  |  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| Behandlungsfälle mit Melanom als Hauptdiagnose              | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div> | <div>47,2 (4)</div> <div>11.840</div> | <div>n.a.</div> <div>&lt;4</div> |  |
| Behandlungsfälle mit Dermatitis und Ekzem als Hauptdiagnose | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div> | <div>34,3 (6)</div> <div>11.214</div> | <div>7</div>                     |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    |  | Klinik Ist-Wert          |  | Klinik Erwartungs-wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--|------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> |  | <a href="#">Fallzahl</a> |  | <a href="#">SMR</a>    |

Intensivmedizin

Intensivmedizin

|                                                                                                                           |                       |                            |                     |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| Todesfälle bei Beatmung > 24 Stunden ohne Neugeborene                                                                     | Information<br>1      | 34,8%<br>30.431 von 87.437 | 14,3%<br>3 von 21   |               |
| Todesfälle bei Beatmung > 24 Stunden ohne Neugeborene und ohne COVID-19 Fälle                                             | <35,9%<br>1           | 34,5%<br>28.853 von 83.547 | 15,0%<br>3 von 20   |               |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger als Hauptdiagnose                                        | < Erwartungswert<br>1 | 30,5%<br>9.492 von 31.083  | 15,4%<br>16 von 104 | 36,0%<br>0,43 |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger als Hauptdiagnose mit Organkomplikation/Schock           | Beobachtungswert<br>1 | 32,3%<br>9.080 von 28.152  | 16,7%<br>16 von 96  |               |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger als Hauptdiagnose ohne Organkomplikation/Schock          | Beobachtungswert<br>1 | 14,1%<br>412 von 2.931     | 0,0%<br>0 von 8     |               |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger oder SIRS als Nebendiagnose                              | Beobachtungswert<br>1 | 35,5%<br>22.689 von 63.903 | 17,9%<br>12 von 67  |               |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger oder SIRS als Nebendiagnose mit Organkomplikation/Schock | Beobachtungswert<br>1 | 36,3%<br>22.225 von 61.292 | 15,0%<br>9 von 60   |               |
| Todesfälle bei generalisierter Entzündungsreaktion des gesamten Körpers ohne Organkomplikation (SIRS)                     | Information<br>1      | 6,4%<br>3.837 von 60.049   | 0,0%<br>0 von 58    |               |

Angeborene Gerinnungsstörung und Bluttransfusion

|                                                                                                    |                        |                               |                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|
| Behandlungsfälle mit angeborenen Gerinnungsstörungen als Haupt- oder Nebendiagnose                 | Mengeninformation<br>2 | 30,1 (14)<br>11.108           | 8                     |  |
| davon operierte Behandlungsfälle mit angeborenen Gerinnungsstörungen als Haupt- oder Nebendiagnose | Mengeninformation<br>2 | 20,3 (9)<br>7.080             | 4                     |  |
| Anteil operierter Behandlungsfälle mit Bluttransfusion                                             | Information<br>1       | 7,5%<br>180.424 von 2.407.413 | 7,6%<br>190 von 2.490 |  |

Obduktionen

|                |                  |                            |                   |  |
|----------------|------------------|----------------------------|-------------------|--|
| Obduktionsrate | Information<br>1 | 0,79%<br>1.241 von 156.378 | 0,0%<br>0 von 173 |  |
|----------------|------------------|----------------------------|-------------------|--|

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                         | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungs-wert |
|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|                                         | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>    |
| Palliativmedizin                        |                        |                          |                          |                        |
| Palliativmedizin                        |                        |                          |                          |                        |
| Palliativmedizinische Komplexbehandlung | Mengeninformation      | 223,5 (139)              | 33                       |                        |
|                                         | 2                      | 47.612                   |                          |                        |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    |  | Klinik Ist-Wert          |  | Klinik Erwartungs-wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--|------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> |  | <a href="#">Fallzahl</a> |  | <a href="#">SMR</a>    |

Herzerkrankungen

Herzinfarkt

|                                                                      |                  |        |            |       |        |       |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------|-------|--------|-------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Herzinfarkt                             | < Erwartungswert | 7,5%   |            | 0,0%  |        | 21,5% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | 1 / 5            | 5.337  | von 70.837 | 0     | von 12 | 0,00  |
| Anteil der Herzinfarkte mit Linksherzkatheter                        | Information      | 85,8%  |            | 75,0% |        |       |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | 1                | 60.786 | von 70.837 | 9     | von 12 |       |
| Todesfälle bei Direktaufnahme ohne Verlegung                         | Beobachtungswert | 7,4%   |            | 0,0%  |        |       |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | 1                | 4.746  | von 64.041 | 0     | von 10 |       |
| Anteil transmuraler Herzinfarkte (STEMI)                             | Information      | 33,7%  |            | 33,3% |        |       |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | 1                | 23.848 | von 70.760 | 4     | von 12 |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Transmuraler Herzinfarkt                | < Erwartungswert | 11,6%  |            | 0,0%  |        | 26,4% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | 1                | 2.761  | von 23.848 | 0     | von 4  |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Nicht-transmuraler Herzinfarkt (NSTEMI) | < Erwartungswert | 5,1%   |            | 0,0%  |        | 8,9%  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | 1                | 2.361  | von 46.320 | 0     | von 8  |       |
| Todesfälle bei Nebendiagnose Herzinfarkt                             | Beobachtungswert | 17,8%  |            | 31,6% |        |       |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | 1                | 3.670  | von 20.570 | 6     | von 19 |       |

Herzinsuffizienz

|                                                                                                     |                  |        |             |       |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------------|-------|--------|-------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Herzinsuffizienz                                                       | < Erwartungswert | 8,2%   |             | 11,7% |        | 11,2% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | 1 / 5            | 13.117 | von 160.876 | 11    | von 94 | 1,04  |
| Anteil Behandlungsfälle mit Beschwerden bei Linksherzinsuffizienz bereits im Ruhezustand (NYHA IV)  | Information      | 46,7%  |             | 63,0% |        |       |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | 1                | 50.732 | von 108.703 | 34    | von 54 |       |
| Anteil Behandlungsfälle mit Beschwerden bei Rechtsherzinsuffizienz bereits im Ruhezustand (NYHA IV) | Information      | 5,7%   |             | 12,8% |        |       |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | 1                | 2.812  | von 49.475  | 5     | von 39 |       |

Linksherzkatheter

|                                                                                                                                                                                    |                   |           |             |       |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|-------|-------|------|
| Anzahl aller Linksherzkatheter zur Koronardiagnostik                                                                                                                               | Mengeninformation | 853 (778) |             | 22    |       |      |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                                                     | 2                 | 269.548   |             |       |       |      |
| Todesfälle mit Linksherzkatheter bei Herzinfarkt ohne Zuverlegungen oder Herz-Kreislauf-Stillstand vor Krankenhaus-Aufnahme und ohne Herzoperation                                 | < Erwartungswert  | 4,6%      |             | 0,0%  |       | 9,3% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                                                     | 1                 | 2.501     | von 54.395  | 0     | von 9 | 0,00 |
| Todesfälle bei diagnostischem Linksherzkatheter ohne Hauptdiagnose Herzinfarkt, ohne Zuverlegungen oder Herz-Kreislauf-Stillstand vor Krankenhaus-Aufnahme und ohne Herzoperation  | < Erwartungswert  | 1,1%      |             | 0,0%  |       | 1,9% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                                                     | 1                 | 1.265     | von 117.048 | 0     | von 4 | 0,00 |
| Todesfälle bei therapeutischem Linksherzkatheter ohne Hauptdiagnose Herzinfarkt, ohne Zuverlegungen oder Herz-Kreislauf-Stillstand vor Krankenhaus-Aufnahme und ohne Herzoperation | < Erwartungswert  | 1,3%      |             | 12,5% |       | 2,3% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                                                     | 1                 | 973       | von 73.982  | 1     | von 8 |      |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                                                                     | <div>IQM<br/>Zielwert</div> <div><a href="#">Quelle</a></div> | <div>IQM<br/>Durchschnittswert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Ist-Wert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Erwartungs-<br/>wert</div> <div><a href="#">SMR</a></div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                     |                                                               |                                                                          |                                                                    |                                                                           |
| Anteil der Behandlungen mit therapeutischem Linksherzkatheter ohne Hauptdiagnose Herzinfarkt und ohne Herzoperation | Information                                                   | 38,5%                                                                    | 69,2%                                                              |                                                                           |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                      | 1                                                             | 75.910 von 197.238                                                       | 9 von 13                                                           |                                                                           |
| Herzrhythmusstörungen                                                                                               |                                                               |                                                                          |                                                                    |                                                                           |
| Behandlungsfälle mit Herzrhythmusstörungen als Hauptdiagnose                                                        | Mengeninformation                                             | 496,7 (340)                                                              | 12                                                                 |                                                                           |
|                                                                                                                     | 2                                                             | 177.317                                                                  |                                                                    |                                                                           |
| Versorgung mit Schrittmacher oder Defibrillator                                                                     |                                                               |                                                                          |                                                                    |                                                                           |
| Versorgung mit Herzschrittmacher oder Defibrillator                                                                 | Mengeninformation                                             | 147,7 (104)                                                              | n.a.                                                               |                                                                           |
|                                                                                                                     | 2                                                             | 46.541                                                                   | <4                                                                 |                                                                           |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der**

**[Präambel](#)**

IQM Indikatoren

IQM  
Zielwert

[Quelle](#)

IQM  
Durchschnittswert

[Fallzahl](#)

Klinik  
Ist-Wert

[Fallzahl](#)

Klinik  
Erwartungs-  
wert

[SMR](#)

## Erkrankungen des Nervensystems und Schlaganfall

### Bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhaut

|                                                                         |                   |          |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------|--|
| Bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhäute als Hauptdiagnose | Mengeninformation | 34,7 (6) | n.a. |  |
|                                                                         | 2                 | 8.991    | <4   |  |

### Todesfälle bei allen Formen des Schlaganfalls

|                                           |                  |                    |          |       |
|-------------------------------------------|------------------|--------------------|----------|-------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Schlaganfall | < Erwartungswert | 9,9%               | 2,3%     | 13,3% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre            | 1                | 10.243 von 103.310 | 2 von 88 |       |

### Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirninfarkt

|                                          |                  |                  |          |       |
|------------------------------------------|------------------|------------------|----------|-------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirninfarkt | < Erwartungswert | 7,3%             | 2,5%     | 10,9% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre           | 1 / 5            | 6.524 von 88.895 | 2 von 79 |       |

|                                                                                                          |             |                   |           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------|--|
| Anteil der Hirninfarkte mit medikamentöser Auflösung des Blutgerinnsels (Thrombolyse) ohne Zuverlegungen | Information | 18,3%             | 15,6%     |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                           | 1           | 15.042 von 82.056 | 10 von 64 |  |

|                                                                                                                           |                  |                  |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|--|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirninfarkt mit medikamentöser Auflösung des Blutgerinnsels (Thrombolyse) ohne Zuverlegungen | Beobachtungswert | 6,7%             | 0,0%     |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                            | 1                | 1.004 von 15.042 | 0 von 10 |  |

|                                                                                                                        |             |                  |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|--|
| Anteil Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Hirninfarkt mit Entfernung des Blutgerinnsels durch Katheter (Thrombektomie) | Information | 10,2%            | 0,0%     |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                         | 1           | 9.128 von 89.875 | 0 von 80 |  |

|                                                                                    |                  |                  |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|--|
| davon Anteil der Hirninfarkte mit Lungenentzündung, die bei Aufnahme nicht bestand | Beobachtungswert | 6,3%             | 7,9%     |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                     | 1                | 5.557 von 87.601 | 6 von 76 |  |

|                                                                                               |                  |                 |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------|--|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirninfarkt mit Lungenentzündung, die bei Aufnahme nicht bestand | Beobachtungswert | 28,8%           | 0,0%    |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                | 1                | 1.602 von 5.557 | 0 von 6 |  |

|                                                          |                  |                  |         |  |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------|--|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirnblutung (intrazerebral) | Beobachtungswert | 28,5%            | 0,0%    |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                           | 1                | 3.077 von 10.795 | 0 von 9 |  |

|                                                                 |        |                 |          |  |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------|--|
| Anteil nicht näher bezeichneter Schlaganfälle als Hauptdiagnose | <0,42% | 0,23%           | 0,0%     |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                  | 1      | 243 von 104.755 | 0 von 89 |  |

|                                                                         |                       |                |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------|--|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose TIA ohne Neubildungen und Kopfverletzungen | Beobachtungswert (SE) | 0,3159%        | n.a. |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                          | 1 / 4                 | 101 von 31.977 | <4   |  |

### Behandlung auf einer Stroke Unit

|                                                                    |                   |             |    |  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----|--|
| Behandlungsfälle mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung | Mengeninformation | 495,5 (486) | 76 |  |
|                                                                    | 2                 | 102.072     |    |  |

|                                                                                     |             |                   |           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------|--|
| Anteil Hauptdiagnose Hirninfarkte mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung | Information | 75,2%             | 78,8%     |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                      | 1           | 67.568 von 89.875 | 63 von 80 |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                                                                                                           | IQM Zielwert      | IQM Durchschnittswert |     |         | Klinik Ist-Wert | Klinik Erwartungs-wert |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----|---------|-----------------|------------------------|
|                                                                                                                                                           | Quelle            | Fallzahl              |     |         | Fallzahl        | SMR                    |
|                                                                                                                                                           |                   |                       |     |         |                 |                        |
| Anteil Hauptdiagnose TIA mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung                                                                                | Information       | 74,4%                 |     |         | n.a.            |                        |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                            | 1                 | 23.940                | von | 32.157  | <4              |                        |
| Anteil mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung ohne Zuverlegungen (in Anlehnung an Schlaganfallregister) bei Hauptdiagnose Hirninfarkt oder TIA | Beobachtungswert  | 76,6%                 |     |         | 97,1%           |                        |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                            | 1                 | 87.746                | von | 114.496 | 66              | von 68                 |
| Anteil mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung nur Zuverlegungen (in Anlehnung an Schlaganfallregister) bei Hauptdiagnose Hirninfarkt oder TIA  | Information       | 49,9%                 |     |         | 0,0%            |                        |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                            | 1                 | 3.762                 | von | 7.536   | 0               | von 15                 |
| Epilepsie                                                                                                                                                 |                   |                       |     |         |                 |                        |
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Epilepsie                                                                                                              | Mengeninformation | 114,4 (38)            |     |         | 9               |                        |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                            | 2                 | 39.017                |     |         |                 |                        |
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Epilepsie                                                                                                              | Mengeninformation | 48,8 (14)             |     |         | 14              |                        |
| Alle Patient:innen < 20 Jahre                                                                                                                             | 2                 | 10.050                |     |         |                 |                        |
| Multiple Sklerose                                                                                                                                         |                   |                       |     |         |                 |                        |
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Multiple Sklerose                                                                                                      | Mengeninformation | 39,3 (25)             |     |         | n.a.            |                        |
|                                                                                                                                                           | 2                 | 8.832                 |     |         | <4              |                        |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |

Altersmedizin

Geriatrische Frührehabilitation

|                                                       |                   |             |     |  |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----|--|
| Behandlungsfälle mit geriatrischer Frührehabilitation | Mengeninformation | 483,6 (404) | 763 |  |
|                                                       | 2                 | 108.317     |     |  |

Mangelernährung bei Älteren

|                                                                                  |             |                      |              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|--|
| Anteil Behandlungsfälle mit erheblicher Mangelernährung und ohne Tumorerkrankung | Information | 0,94%                | 2,21%        |  |
| Alle Patient:innen >= 65 Jahre                                                   | 1           | 22.315 von 2.366.261 | 62 von 2.804 |  |

|                                                                                                                 |             |                |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------|--|
| Anteil Behandlungsfälle mit Sonden-/Infusionsernährung bei erheblicher Mangelernährung und ohne Tumorerkrankung | Information | 2,0%           | 0,0%     |  |
| Alle Patient:innen >= 65 Jahre                                                                                  | 1           | 448 von 22.315 | 0 von 62 |  |

Delir

|                                                                      |             |                      |              |  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|--|
| Anteil Behandlungsfälle mit aufgetretenem Delir an operierten Fällen | Information | 3,0%                 | 3,8%         |  |
| Alle Patient:innen >= 60 Jahre                                       | 1           | 38.725 von 1.271.087 | 53 von 1.383 |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |

Lungenerkrankungen

Lungenentzündung (Pneumonie)

|                                                                                                     |                       |                    |            |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------|-------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung                                                       | < Erwartungswert      | 12,6%              | 13,6%      | 19,4% |
| alle Altersgruppen                                                                                  | 1                     | 16.990 von 134.678 | 17 von 125 |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung ohne Zuverlegung, Tumor, Mukoviszidose                | < Erwartungswert      | 11,7%              | 9,4%       | 18,6% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | 1                     | 10.916 von 93.320  | 8 von 85   |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung ohne Zuverlegung, Tumor, Mukoviszidose, COVID-19      | < Erwartungswert      | 10,2%              | 11,5%      | 15,8% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | 1 / 5                 | 7.579 von 74.468   | 7 von 61   | 0,73  |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung ohne Zuverlegung, Tumor, Mukoviszidose                | Beobachtungswert (SE) | 0,31%              | 0,0%       |       |
| Alle Patient:innen 1 bis 19 Jahre                                                                   | 1 / 4                 | 36 von 11.775      | 0 von 7    |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung durch Aspiration von Nahrungsmitteln oder Mageninhalt | Beobachtungswert      | 28,8%              | 29,4%      |       |
|                                                                                                     | 1                     | 3.376 von 11.737   | 5 von 17   |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Bronchitis oder Bronchiolitis ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose | < Erwartungswert      | 2,2%               | 5,3%       | 3,6%  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | 1                     | 267 von 12.100     | 1 von 19   |       |

COPD (Chronisch obstruktive Lungenkrankheit)

|                                   |                  |                  |          |      |
|-----------------------------------|------------------|------------------|----------|------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose COPD | < Erwartungswert | 4,7%             | 8,1%     | 7,1% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre    | 1                | 2.996 von 63.883 | 3 von 37 | 1,14 |

Lungenkrebs

|                                                |                   |            |    |  |
|------------------------------------------------|-------------------|------------|----|--|
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Lungenkrebs | Mengeninformation | 186,2 (54) | 16 |  |
|                                                | 2                 | 64.042     |    |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungswert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>   |

## Erkrankungen der Bauchorgane

### Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen (ohne Tumor)

|                                                                                          |                  |                   |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|--|
| Anteil laparoskopischer Operationen bei Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen     | >95,1%           | 95,8%             | 90,6%       |  |
|                                                                                          | 1                | 48.172 von 50.299 | 106 von 117 |  |
| Anteil Umsteiger auf offene Operationen bei Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen | Beobachtungswert | 2,5%              | 6,0%        |  |
|                                                                                          | 1                | 1.269 von 50.299  | 7 von 117   |  |
| Todesfälle bei Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen                              | <0,60% (SE)      | 0,4573%           | 0,0%        |  |
|                                                                                          | 1 / 4            | 230 von 50.299    | 0 von 117   |  |

### Operation von Leisten-, Schenkel- und Nabelbrüchen (Hernien)

|                                                                   |                  |                   |             |  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|--|
| Todesfälle bei Bruchoperationen ohne anteilige Darmentfernung     | <0,12% (SE)      | 0,1145%           | 0,0%        |  |
|                                                                   | 1 / 4            | 73 von 63.738     | 0 von 167   |  |
| Todesfälle bei Bruchoperationen mit anteiliger Darmentfernung     | Beobachtungswert | 2,1%              | 0,0%        |  |
|                                                                   | 1                | 146 von 6.843     | 0 von 20    |  |
| Anteil Behandlungsfälle mit Leistenbruchoperation mit Netzeinlage | Information      | 9,2%              | n.a.        |  |
| Alle Patient:innen < 20 Jahre                                     | 1                | 205 von 2.223     | <4          |  |
| Anteil Behandlungsfälle mit Leistenbruchoperation mit Netzeinlage | Information      | 98,3%             | 94,6%       |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                    | 1                | 43.038 von 43.793 | 122 von 129 |  |

### Eingriffe an der Schilddrüse

|                                                                                      |                   |                |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------|--|
| Behandlungsfälle mit operativer Entfernung der Schilddrüse                           | Mengeninformation | 60,5 (20)      | n.a. |  |
|                                                                                      | 2                 | 17.109         | <4   |  |
| Behandlungsfälle mit operativer Entfernung der Schilddrüse bei gutartiger Erkrankung | Mengeninformation | 49,8 (18)      | n.a. |  |
|                                                                                      | 2                 | 13.655         | <4   |  |
| Anteil der Beatmungsfälle (> 24 Std.) nach Schilddrüseneingriff                      | Information (SE)  | 0,64%          | n.a. |  |
|                                                                                      | 1 / 4             | 103 von 16.146 | <4   |  |

### Große Operationen am Dick- und Enddarm (Kolon und Rektum)

|                                                                                     |                   |                  |          |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------|------|
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Dick-/Enddarmkrebs                               | Mengeninformation | 126,3 (86)       | 173      |      |
|                                                                                     | 2                 | 43.444           |          |      |
| Behandlungsfälle mit Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn                             | Mengeninformation | 97,8 (63)        | 59       |      |
|                                                                                     | 2                 | 36.971           |          |      |
| Todesfälle bei operativer Entfernung des Dick-/Enddarms                             | Beobachtungswert  | 7,7%             | 3,3%     |      |
|                                                                                     | 1                 | 2.714 von 35.313 | 2 von 60 |      |
| Todesfälle bei operativer Dickdarmentfernung bei Krebs ohne komplizierende Diagnose | < Erwartungswert  | 3,8%             | 5,6%     | 5,0% |
|                                                                                     | 1 / 5             | 330 von 8.624    | 1 von 18 | 1,11 |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                                                              | IQM Zielwert      | IQM Durchschnittswert |     |        | Klinik Ist-Wert |     |    | Klinik Erwartungs-wert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----|--------|-----------------|-----|----|------------------------|
|                                                                                                              | Quelle            | Fallzahl              |     |        | Fallzahl        |     |    | SMR                    |
|                                                                                                              |                   |                       |     |        |                 |     |    |                        |
| Todesfälle bei operativer Dickdarmentfernung bei Krebs mit komplizierender Diagnose                          | Beobachtungswert  | 11,6%                 |     |        | 5,6%            |     |    |                        |
|                                                                                                              | 1                 | 293                   | von | 2.516  | 1               | von | 18 |                        |
| Todesfälle bei operativer Enddarmentfernung bei Krebs                                                        | <3,2%             | 2,6%                  |     |        | 0,0%            |     |    |                        |
|                                                                                                              | 1                 | 106                   | von | 4.134  | 0               | von | 6  |                        |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Divertikel mit Abszess/Perforation                 | Beobachtungswert  | 5,4%                  |     |        | 0,0%            |     |    |                        |
|                                                                                                              | 1                 | 251                   | von | 4.675  | 0               | von | 9  |                        |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Darmischämie                                       | Information       | 42,3%                 |     |        | n.a.            |     |    |                        |
|                                                                                                              | 1                 | 856                   | von | 2.022  | <4              |     |    |                        |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei anderen Diagnosen                                  | Information       | 8,5%                  |     |        | 0,0%            |     |    |                        |
|                                                                                                              | 1                 | 795                   | von | 9.346  | 0               | von | 7  |                        |
| Anteil operative Leberentfernung bei Entfernung des Dick-/Enddarms bei Dick- und Enddarmkrebs                | Information       | 4,2%                  |     |        | 9,5%            |     |    |                        |
|                                                                                                              | 1                 | 647                   | von | 15.274 | 4               | von | 42 |                        |
| Behandlungsfälle mit roboterassistiertem Eingriff bei Krebserkrankung des Darms                              | Information       | 14,6%                 |     |        | 0,0%            |     |    |                        |
|                                                                                                              | 1                 | 2.223                 | von | 15.274 | 0               | von | 42 |                        |
| Erkrankungen des Magens                                                                                      |                   |                       |     |        |                 |     |    |                        |
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Magenkrebs (mit und ohne Magenoperation)                                  | Mengeninformation | 45,2 (26)             |     |        | 50              |     |    |                        |
|                                                                                                              | 2                 | 14.509                |     |        |                 |     |    |                        |
| Todesfälle bei Geschwüren an Magen, Zwölffingerdarm oder Dünndarm als Hauptdiagnose (mit und ohne Operation) | Beobachtungswert  | 5,4%                  |     |        | 0,0%            |     |    |                        |
|                                                                                                              | 1                 | 991                   | von | 18.467 | 0               | von | 53 |                        |
| Behandlungsfälle mit Magenentfernungen                                                                       | Mengeninformation | 36,9 (13)             |     |        | 4               |     |    |                        |
|                                                                                                              | 2                 | 9.921                 |     |        |                 |     |    |                        |
| Todesfälle bei operativer Magenentfernung bei Magenkrebs ohne Speiseröhreneingriff                           | Beobachtungswert  | 5,1%                  |     |        | n.a.            |     |    |                        |
|                                                                                                              | 1                 | 99                    | von | 1.941  | <4              |     |    |                        |
| Todesfälle bei operativer Magenentfernung bei anderer Diagnose (nicht Magenkrebs) ohne Speiseröhreneingriff  | Beobachtungswert  | 2,9%                  |     |        | n.a.            |     |    |                        |
|                                                                                                              | 1                 | 227                   | von | 7.753  | <4              |     |    |                        |
| Eingriffe an der Bauchspeicheldrüse und der Leber                                                            |                   |                       |     |        |                 |     |    |                        |
| Todesfälle bei anatomischer Leberentfernung                                                                  | Beobachtungswert  | 5,5%                  |     |        | n.a.            |     |    |                        |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                               | 1                 | 136                   | von | 2.489  | <4              |     |    |                        |

Alle Patient:innen >= 20 Jahre

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | <div>IQM<br/>Zielwert</div> | <div>IQM<br/>Durchschnittswert</div> | <div>Klinik<br/>Ist-Wert</div> | <div>Klinik<br/>Erwartungs-<br/>wert</div> |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a>      | <a href="#">Fallzahl</a>             | <a href="#">Fallzahl</a>       | <a href="#">SMR</a>                        |

Gefäßoperationen

Eingriffe an der Halsschlagader (Carotis)

|                                                                            |        |               |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|--|
| Todesfälle bei ausschließlich extrakranieller Operation der Halsschlagader | <1,09% | 1,09%         | n.a. |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                             | 1      | 100 von 9.177 | <4   |  |

Eingriffe an der Hauptschlagader (Aorta)

|                                             |             |               |      |  |
|---------------------------------------------|-------------|---------------|------|--|
| Todesfälle bei rupturiertem Aortenaneurysma | Information | 40,8%         | n.a. |  |
|                                             | 1           | 734 von 1.799 | <4   |  |

Eingriffe der Becken-/Bein-Arterien

|                                                     |             |                  |      |  |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------------|------|--|
| Todesfälle bei Operationen der Becken-/Beinarterien | Information | 5,6%             | n.a. |  |
|                                                     | 1           | 1.553 von 27.545 | <4   |  |

PTA (Perkutan transluminale Gefäßinterventionen)

|                                                                                    |                  |                  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------|--|
| Todesfälle bei Wiedereröffnung eines verschlossenen Gefäßes mittels Ballonkatheter | Beobachtungswert | 2,9%             | n.a. |  |
|                                                                                    | 1                | 1.684 von 57.653 | <4   |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

IQM Indikatoren

IQM  
Zielwert

[Quelle](#)

IQM  
Durchschnittswert

[Fallzahl](#)

Klinik  
Ist-Wert

[Fallzahl](#)

Klinik  
Erwartungs-  
wert

[SMR](#)

## Frauenheilkunde und Geburtshilfe

### Geburtshilfe

|                                                                                  |                       |                             |                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|--|
| Mütterliche Todesfälle bei der Geburt                                            | <0,005% (SE)<br>1 / 4 | 0,0045%<br>10 von 219.975   | 0,0%<br>0 von 409   |  |
| Anteil vaginale Geburten mit Dammriss 4. Grades                                  | <0,125% (SE)<br>1 / 4 | 0,1109%<br>163 von 146.933  | 0,0%<br>0 von 319   |  |
| Anteil vaginale Geburten mit Dammschnitt                                         | Information<br>1      | 9,7%<br>14.200 von 146.933  | 21,9%<br>70 von 319 |  |
| Anteil Kaiserschnitt an allen Geburten                                           | Information<br>1      | 33,2%<br>73.042 von 219.975 | 22,0%<br>90 von 409 |  |
| Anteil sanfter Kaiserschnitt (nach Misgav-Ladach) an allen Kaiserschnittgeburten | Information<br>1      | 78,8%<br>57.535 von 73.042  | 60,0%<br>54 von 90  |  |
| Anteil Kaiserschnitte bei risikoarmer Geburt                                     | Information<br>1      | 27,9%<br>53.760 von 192.567 | 19,2%<br>70 von 364 |  |
| davon Anteil Kaiserschnitte bei risikoarmer Geburt                               | Information<br>1      | 25,8%<br>36.583 von 141.813 | 15,9%<br>42 von 264 |  |
| Alle Patient:innen < 35 Jahre                                                    |                       |                             |                     |  |
| davon Anteil Kaiserschnitte bei risikoarmer Geburt                               | Information<br>1      | 33,8%<br>17.177 von 50.754  | 28,0%<br>28 von 100 |  |
| Alle Patient:innen > 34 Jahre                                                    |                       |                             |                     |  |

### Neugeborene

|                                                                |                        |                         |            |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|--|
| Neugeborene mit Geburtsgewicht < 1.250 Gramm                   | Mengeninformation<br>2 | 23,4 (24)<br>2.150      | n.a.<br><4 |  |
| davon Neugeborene mit Geburtsgewicht von 500 bis 749 Gramm     | Mengeninformation<br>2 | 7,4 (6)<br>500          | n.a.<br><4 |  |
| davon Neugeborene mit Geburtsgewicht von 1.500 bis 2.499 Gramm | Mengeninformation<br>2 | 68,1 (26)<br>13.422     | 16         |  |
| davon Neugeborene mit Geburtsgewicht > 2.500 Gramm             | Mengeninformation<br>2 | 1039,3 (779)<br>218.259 | 408        |  |

### Frauenheilkunde

|                                                                                                            |                      |                            |                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|--|
| Todesfälle bei operativer Entfernung der Gebärmutter bei gutartigen Erkrankungen                           | <0,04% (SE)<br>1 / 4 | 0,0526%<br>11 von 20.893   | 0,0%<br>0 von 9  |  |
| Alle Patient:innen > 14 Jahre                                                                              |                      |                            |                  |  |
| Anteil der Behandlungsfälle mit vaginaler/laparoskopischer Gebärmutterentfernung ohne plastische Operation | >88,4%<br>1          | 89,3%<br>18.501 von 20.710 | 77,8%<br>7 von 9 |  |
| Alle Patient:innen > 14 Jahre                                                                              |                      |                            |                  |  |
| Anteil der Behandlungsfälle mit vaginaler Entfernung durch Zerkleinerung der Gebärmutter                   | Information<br>1     | 28,2%<br>5.848 von 20.710  | 66,7%<br>6 von 9 |  |
| Alle Patient:innen > 14 Jahre                                                                              |                      |                            |                  |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                                                                    | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungswert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                    | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>   |
| Anteil der Behandlungsfälle mit vaginaler Gebärmutterentfernung durch Zerkleinerung der Gebärmutter                | Information            | 5,7%                     | 0,0%                     |                       |
| Alle Patient:innen > 14 Jahre                                                                                      | 1                      | 334 von 5.848            | 0 von 6                  |                       |
| Anteil der Behandlungsfälle mit laparoskopischer Gebärmutterentfernung ohne plastische Operation                   | Information            | 61,1%                    | 11,1%                    |                       |
| Alle Patient:innen > 14 Jahre                                                                                      | 1                      | 12.653 von 20.710        | 1 von 9                  |                       |
| Anteil der Behandlungsfälle mit laparoskopischer Gebärmutterentfernung durch Zerkleinerung der Gebärmutter         | Information            | 27,3%                    | n.a.                     |                       |
|                                                                                                                    | 1                      | 3.455 von 12.653         | <4                       |                       |
| Anteil der Behandlungsfälle mit Eierstock- und Gebärmutterentfernung bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose | Information            | 5,7%                     | n.a.                     |                       |
| Alle Patient:innen > 14 und < 50 Jahre                                                                             | 1                      | 387 von 6.804            | <4                       |                       |
| Anteil der Behandlungsfälle mit Eierstock- und Gebärmutterentfernung bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose | Information            | 32,6%                    | 33,3%                    |                       |
| Alle Patient:innen >= 50 Jahre                                                                                     | 1                      | 2.626 von 8.063          | 2 von 6                  |                       |
| Bösartige Neubildungen der Brust und der weiblichen Geschlechtsorgane                                              |                        |                          |                          |                       |
| Behandlungsfälle mit Krebserkrankung der Brust oder der Geschlechtsorgane als Hauptdiagnose                        | Mengeninformation      | 213,7 (72)               | 6                        |                       |
|                                                                                                                    | 2                      | 70.101                   |                          |                       |
| Behandlungsfälle mit Eierstockkrebs als Hauptdiagnose                                                              | Mengeninformation      | 30,3 (14)                | n.a.                     |                       |
|                                                                                                                    | 2                      | 8.765                    | <4                       |                       |
| Behandlungsfälle mit Gebärmutterkrebs als Hauptdiagnose                                                            | Mengeninformation      | 51,9 (29)                | n.a.                     |                       |
|                                                                                                                    | 2                      | 14.432                   | <4                       |                       |
| Behandlungsfälle mit Brustkrebs als Hauptdiagnose                                                                  | Mengeninformation      | 135,1 (34)               | n.a.                     |                       |
|                                                                                                                    | 2                      | 43.095                   | <4                       |                       |
| Eingriffe am Beckenboden bei der Frau                                                                              |                        |                          |                          |                       |
| Behandlungsfälle mit Beckenbodenoperationen mit und ohne plastische Operation                                      | Mengeninformation      | 73,8 (54)                | 21                       |                       |
|                                                                                                                    | 2                      | 18.971                   |                          |                       |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |

## Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe

### Bösartige Neubildungen des Bewegungsapparates

|                                                                                                                                    |                   |          |   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---|--|
| Behandlungsfälle mit bösartiger Neubildung an Knochen, Gelenkknorpel, peripheren Nerven, Retroperitoneum, Bindegewebe, Weichteilen | Mengeninformation | 45,7 (5) | 4 |  |
|                                                                                                                                    | 2                 | 14.026   |   |  |

### Gelenkersatz (Endoprothetik)

|                                                                                                                                           |                                |                          |                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|--|
| Todesfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung                                        | <0,13% (SE)<br>1 / 4           | 0,0843%<br>49 von 58.126 | 0,0%<br>0 von 4  |  |
| Todesfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei hüftgelenknahen Frakturen                                                          | Beobachtungswert<br>1          | 5,1%<br>1.033 von 20.145 | 0,0%<br>0 von 30 |  |
| Todesfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei anderen Diagnosen                                                                  | Beobachtungswert<br>1          | 5,5%<br>351 von 6.336    | 16,7%<br>1 von 6 |  |
| Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung | Beobachtungswert<br>1          | 2,4%<br>1.373 von 58.126 | 25,0%<br>1 von 4 |  |
| Todesfälle bei Wechsel eines Hüftgelenkersatzes wegen Fraktur oder Infektion                                                              | Beobachtungswert<br>1          | 4,5%<br>177 von 3.930    | n.a.<br><4       |  |
| Todesfälle bei Kniegelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung                                        | <0,06% (SE)<br>1 / 4           | 0,044%<br>26 von 59.081  | n.a.<br><4       |  |
| Todesfälle bei Kniegelenkersatz (Erstimplantation) bei anderen Diagnosen                                                                  | Beobachtungswert (SE)<br>1 / 4 | 0,3447%<br>12 von 3.481  | n.a.<br><4       |  |
| Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei Kniegelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung | Beobachtungswert<br>1          | 1,5%<br>915 von 59.081   | n.a.<br><4       |  |
| Todesfälle bei Hüft- oder Kniegelenkersatz bei Tumorerkrankung                                                                            | Beobachtungswert<br>1          | 7,0%<br>166 von 2.359    | n.a.<br><4       |  |

### Hüftgelenknahe Frakturen

|                                                                                   |                       |                          |                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|--------------|
| Todesfälle nach operativer Versorgung einer Schenkelhalsfraktur als Hauptdiagnose | < Erwartungswert<br>1 | 4,7%<br>1.035 von 22.251 | 0,0%<br>0 von 32 | 7,0%<br>0,00 |
| Todesfälle nach Gelenkersatz bei Schenkelhalsfraktur als Hauptdiagnose            | Beobachtungswert<br>1 | 5,0%<br>995 von 19.716   | 0,0%<br>0 von 30 |              |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                                                                                                   | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    |     |        | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungs-wert |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----|--------|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                   | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> |     |        | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>    |
| Todesfälle nach Osteosynthese (Verbindung der Knochenfragmente durch Platten, Schrauben oder Nägel) bei Schenkelhalsfraktur als Hauptdiagnose     | Beobachtungswert       | 1,6%                     |     |        | n.a.                     |                        |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                    | 1                      | 40                       | von | 2.535  | <4                       |                        |
| Todesfälle nach operativer Versorgung einer pertrochantären Fraktur als Hauptdiagnose                                                             | < Erwartungswert       | 4,7%                     |     |        | 5,3%                     |                        |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                    | 1                      | 875                      | von | 18.558 | 2                        | von 38 0,99            |
| Todesfälle nach Osteosynthese (Verbindung der Knochenfragmente durch Platten, Schrauben oder Nägel) bei pertrochantärer Fraktur als Hauptdiagnose | Beobachtungswert       | 4,6%                     |     |        | 5,3%                     |                        |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                    | 1                      | 839                      | von | 18.159 | 2                        | von 38                 |
| Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark                                                                                                  |                        |                          |     |        |                          |                        |
| Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark (ohne lokale Schmerztherapie)                                                                    | Mengeninformation      | 331,5 (212)              |     |        | 46                       |                        |
|                                                                                                                                                   | 2                      | 109.058                  |     |        |                          |                        |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder Wirbelkörper-Ersatz bei Tumor (inkl. komplexe Rekonstruktionen)                                      | Beobachtungswert       | 8,0%                     |     |        | n.a.                     |                        |
|                                                                                                                                                   | 1                      | 269                      | von | 3.366  | <4                       |                        |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder Wirbelkörper-Ersatz bei Trauma (inkl. komplexe Rekonstruktionen, Rückenmarkoperation)                | Beobachtungswert       | 3,6%                     |     |        | 0,0%                     |                        |
|                                                                                                                                                   | 1                      | 497                      | von | 13.832 | 0                        | von 15                 |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Operation bei Entzündung der Bandscheibe oder des Rückenmarks                                                         | Beobachtungswert       | 7,7%                     |     |        | n.a.                     |                        |
|                                                                                                                                                   | 1                      | 187                      | von | 2.428  | <4                       |                        |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder 1 Wirbelkörper-Ersatz (ohne Tumor, Trauma oder kompl. Rekonstruktionen)                              | Beobachtungswert (SE)  | 0,1621%                  |     |        | 0,0%                     |                        |
|                                                                                                                                                   | 1 / 4                  | 20                       | von | 12.339 | 0                        | von 4                  |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder 3 oder mehr Wirbelkörper-Ersatz (ohne Tumor, Trauma oder kompl. Rekonstruktionen)                    | Beobachtungswert (SE)  | 0,7644%                  |     |        | n.a.                     |                        |
|                                                                                                                                                   | 1 / 4                  | 40                       | von | 5.233  | <4                       |                        |
| Todesfälle bei alleiniger 'Entlastung' (Dekompression) der Wirbelsäule                                                                            | Beobachtungswert (SE)  | 0,062%                   |     |        | 0,0%                     |                        |
|                                                                                                                                                   | 1 / 4                  | 14                       | von | 22.563 | 0                        | von 7                  |
| Todesfälle bei 'einfachen' Bandscheibenentfernungen                                                                                               | <0,03% (SE)            | 0,0067%                  |     |        | n.a.                     |                        |
|                                                                                                                                                   | 1 / 4                  | 1                        | von | 14.848 | <4                       |                        |
| Todesfälle bei Vertebro-/Kyphoplastie (ohne Tumor, Trauma, kompl. Rekonstruktion, Versteifung, WK-Ersatz oder Bandscheibeneingriffe)              | <0,53% (SE)            | 0,4888%                  |     |        | 0,0%                     |                        |
|                                                                                                                                                   | 1 / 4                  | 32                       | von | 6.547  | 0                        | von 7                  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                                                                           | IQM Zielwert                   | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungs-wert |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                                           | <a href="#">Quelle</a>         | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>    |
| Todesfälle bei anderen Operationen an der Wirbelsäule oder am Rückenmark                                                  | Beobachtungswert<br>1          | 1,8%<br>374 von 20.396   | 0,0%<br>0 von 4          |                        |
| Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei 'einfachen' Bandscheibenentfernungen                                | Beobachtungswert (SE)<br>1 / 4 | 0,5119%<br>76 von 14.848 | n.a.<br><4               |                        |
| Lokale Schmerztherapie an der Wirbelsäule (ohne andere Wirbelsäulen- oder Rückenmarkoperation)                            | Mengeninformation<br>2         | 84,6 (32)<br>27.056      | n.a.<br><4               |                        |
| Behandlungsfälle mit Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen als Hauptdiagnose ohne Operation oder lokale Schmerztherapie | Mengeninformation<br>2         | 133,9 (115)<br>49.963    | 32                       |                        |
| Operationen am Bewegungsapparat inkl. Endoprothetik                                                                       |                                |                          |                          |                        |
| Gelenkersatz am Schulter-/ Ellenbogengelenk                                                                               | Mengeninformation<br>2         | 34,8 (27)<br>11.390      | 9                        |                        |
| Mehrfachverletzungen - Polytraumen                                                                                        |                                |                          |                          |                        |
| Mehrfachverletzungen (Polytraumen) im Sinne der DRG-Definition                                                            | Mengeninformation<br>2         | 21,7 (8)<br>6.866        | 5                        |                        |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert |  |  | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |  |  |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--|--|--------------------------|-------------------------------|--|--|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> |  |  | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |  |  |

## Urologie

### Operationen der Niere

|                                                                                             |                       |         |     |       |      |     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-----|-------|------|-----|----|
| Todesfälle bei Totalentfernung der Niere bei bösartiger Neubildung                          | <1,8%                 | 1,3%    |     |       | 0,0% |     |    |
|                                                                                             | 1                     | 42      | von | 3.208 | 0    | von | 10 |
| Anteil laparoskopischer Operationen bei Totalentfernung der Niere bei bösartiger Neubildung | Information           | 46,5%   |     |       | 0,0% |     |    |
|                                                                                             | 1                     | 1.492   | von | 3.208 | 0    | von | 10 |
| Todesfälle bei Teilentfernung der Niere bei bösartiger Neubildung                           | <0,35% (SE)           | 0,2894% |     |       | n.a. |     |    |
|                                                                                             | 1 / 4                 | 10      | von | 3.455 | <4   |     |    |
| Anteil laparoskopischer Operationen bei Teilentfernung der Niere bei bösartiger Neubildung  | Information           | 59,3%   |     |       | n.a. |     |    |
|                                                                                             | 1                     | 2.049   | von | 3.455 | <4   |     |    |
| Anteil der Teilentfernungen der Niere bei bösartiger Neubildung                             | Information           | 51,9%   |     |       | 9,1% |     |    |
|                                                                                             | 1                     | 3.455   | von | 6.663 | 1    | von | 11 |
| Todesfälle bei Totalentfernung der Niere bei anderer Diagnose                               | Beobachtungswert      | 3,7%    |     |       | 0,0% |     |    |
|                                                                                             | 1                     | 75      | von | 2.013 | 0    | von | 6  |
| Todesfälle bei Teilentfernung der Niere bei anderer Diagnose                                | Beobachtungswert (SE) | 0,1708% |     |       | n.a. |     |    |
|                                                                                             | 1 / 4                 | 2       | von | 1.171 | <4   |     |    |
| Behandlungsfälle mit roboterassistierter Nierenentfernung bei bösartiger Neubildung         | Information           | 38,3%   |     |       | 0,0% |     |    |
|                                                                                             | 1                     | 2.551   | von | 6.663 | 0    | von | 11 |

## Harnblase

|                                                                                                       |                   |             |     |        |       |     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----|--------|-------|-----|----|
| Behandlungsfälle mit Blasenkrebs als Hauptdiagnose                                                    | Mengeninformation | 140,1 (54)  |     |        | 72    |     |    |
|                                                                                                       | 2                 | 41.898      |     |        |       |     |    |
| Operationen an der Harnblase durch die Harnröhre                                                      | Mengeninformation | 218,3 (208) |     |        | 128   |     |    |
|                                                                                                       | 2                 | 41.905      |     |        |       |     |    |
| Operationen an der Harnblase durch die Harnröhre bei Blasenkrebs                                      | Mengeninformation | 171,5 (152) |     |        | 62    |     |    |
|                                                                                                       | 2                 | 29.666      |     |        |       |     |    |
| Operationen an der Harnblase durch die Harnröhre bei Blasenkrebs mit Einbringen von Chemotherapeutika | Beobachtungswert  | 17,9%       |     |        | 22,6% |     |    |
|                                                                                                       | 1                 | 5.307       | von | 29.666 | 14    | von | 62 |
| Todesfälle bei Entfernung der Harnblase                                                               | <4,8%             | 4,3%        |     |        | n.a.  |     |    |
|                                                                                                       | 1                 | 125         | von | 2.882  | <4    |     |    |
| Behandlungsfälle mit roboterassistierter Harnblasenentfernung                                         | Information       | 13,7%       |     |        | n.a.  |     |    |
|                                                                                                       | 1                 | 468         | von | 3.417  | <4    |     |    |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                                                                        | IQM<br>Zielwert                | IQM<br>Durchschnittswert   | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                        | <a href="#">Quelle</a>         | <a href="#">Fallzahl</a>   | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |
| Prostata                                                                                                               |                                |                            |                          |                               |
| Todesfälle bei Operationen der Prostata durch die Harnröhre bei gutartigen Erkrankungen                                | <0,20% (SE)<br>1 / 4           | 0,1697%<br>41 von 24.167   | 0,0%<br>0 von 74         |                               |
| Todesfälle bei Operationen der Prostata durch die Harnröhre bei bösartigen Erkrankungen                                | Beobachtungswert (SE)<br>1 / 4 | 0,7599%<br>51 von 6.711    | 0,0%<br>0 von 34         |                               |
| Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei Behandlungsfällen mit Operation der Prostata durch die Harnröhre | Beobachtungswert<br>1          | 3,4%<br>1.041 von 30.878   | 8,3%<br>9 von 108        |                               |
| Behandlungsfälle mit Prostatakrebs als Hauptdiagnose                                                                   | Mengeninformation<br>2         | 109,0 (26)<br>34.228       | 60                       |                               |
| Nierensteine                                                                                                           |                                |                            |                          |                               |
| Behandlungsfälle mit Nierensteinen als Hauptdiagnose                                                                   | Mengeninformation<br>2         | 205,6 (52)<br>69.911       | 254                      |                               |
| Anteil der Behandlungsfälle mit Intervention zur Steinentfernung bei Hauptdiagnose Nierensteine                        | Information<br>1               | 53,0%<br>37.084 von 69.911 | 66,5%<br>169 von 254     |                               |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

IQM Indikatoren

| IQM<br>Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> | IQM<br>Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert<br><a href="#">SMR</a> |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Hautkrankheiten

Hautkrankheiten

|                                                                |                            |                        |   |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---|--|
| Behandlungsfälle mit Dermatitis und Ekzem als<br>Hauptdiagnose | Mengeninformation<br><br>2 | 33,9 (6)<br><br>10.779 | 6 |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---|--|

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

IQM Indikatoren

IQM  
Zielwert

[Quelle](#)

IQM  
Durchschnittswert

[Fallzahl](#)

Klinik  
Ist-Wert

[Fallzahl](#)

Klinik  
Erwartungs-  
wert

[SMR](#)

## Intensivmedizin

### Intensivmedizin

|                                                                                                                           |                       |                            |                   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|---------------|
| Todesfälle bei Beatmung > 24 Stunden ohne Neugeborene                                                                     | Information<br>1      | 35,4%<br>30.990 von 87.630 | 17,9%<br>5 von 28 |               |
| Todesfälle bei Beatmung > 24 Stunden ohne Neugeborene und ohne COVID-19 Fälle                                             | <35,9%<br>1           | 34,8%<br>28.096 von 80.798 | 21,7%<br>5 von 23 |               |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger als Hauptdiagnose                                        | < Erwartungswert<br>1 | 33,3%<br>9.575 von 28.731  | 5,3%<br>3 von 57  | 35,0%<br>0,15 |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger als Hauptdiagnose mit Organkomplikation/Schock           | Beobachtungswert<br>1 | 35,5%<br>9.156 von 25.801  | 6,0%<br>3 von 50  |               |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger als Hauptdiagnose ohne Organkomplikation/Schock          | Beobachtungswert<br>1 | 14,3%<br>419 von 2.930     | 0,0%<br>0 von 7   |               |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger oder SIRS als Nebendiagnose                              | Beobachtungswert<br>1 | 37,4%<br>22.659 von 60.510 | 11,0%<br>8 von 73 |               |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger oder SIRS als Nebendiagnose mit Organkomplikation/Schock | Beobachtungswert<br>1 | 38,5%<br>22.214 von 57.675 | 11,3%<br>6 von 53 |               |
| Todesfälle bei generalisierter Entzündungsreaktion des gesamten Körpers ohne Organkomplikation (SIRS)                     | Information<br>1      | 7,2%<br>3.384 von 47.318   | 3,6%<br>1 von 28  |               |
| Anteil Todesfälle bei nicht-bakterieller Blutvergiftung (Sepsis)                                                          | Beobachtungswert<br>1 | 34,8%<br>155 von 446       | n.a.<br><4        |               |

### Angeborene Gerinnungsstörung und Bluttransfusion

|                                                                                                    |                        |                               |                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|
| Behandlungsfälle mit angeborenen Gerinnungsstörungen als Haupt- oder Nebendiagnose                 | Mengeninformation<br>2 | 28,9 (14)<br>10.632           | 15                    |  |
| davon operierte Behandlungsfälle mit angeborenen Gerinnungsstörungen als Haupt- oder Nebendiagnose | Mengeninformation<br>2 | 19,5 (9)<br>6.847             | 9                     |  |
| Anteil operierter Behandlungsfälle mit Bluttransfusion                                             | Information<br>1       | 7,5%<br>175.709 von 2.336.953 | 8,1%<br>189 von 2.334 |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

|                 |  |                                                               |                                                                          |                                                                    |                                                                           |
|-----------------|--|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| IQM Indikatoren |  | <div>IQM<br/>Zielwert</div> <div><a href="#">Quelle</a></div> | <div>IQM<br/>Durchschnittswert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Ist-Wert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Erwartungs-<br/>wert</div> <div><a href="#">SMR</a></div> |
| Obduktionen     |  |                                                               |                                                                          |                                                                    |                                                                           |
| Obduktionsrate  |  | <div>Information</div> <div>1</div>                           | <div>0,84%</div> <div>1.310 von 156.425</div>                            | <div>0,0%</div> <div>0 von 141</div>                               |                                                                           |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                         | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                                         | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |
| Palliativmedizin                        |                        |                          |                          |                               |
| Palliativmedizin                        |                        |                          |                          |                               |
| Palliativmedizinische Komplexbehandlung | Mengeninformation      | 208,7 (132)              | 39                       |                               |
|                                         | 2                      | 43.404                   |                          |                               |



# Leseanleitung zu den IQM-Indikatoren

## Lesebeispiel

Beim nachfolgenden Indikator „Todesfälle bei Hauptdiagnose Transmuraler Herzinfarkt (Alle Patient:innen >= 20 Jahre)“ liegt der Wert der durchschnittlichen Krankenhaussterblichkeit in der Bundesrepublik bei 12,2 % (Quelle: Statistisches Bundesamt). Daraus ergibt sich rechnerisch für das Beispielkrankenhaus aufgrund des Alters und Geschlechts der Patientinnen und Patienten des ausgewerteten Jahres eine zu erwartende Krankenhaussterblichkeit von 10,8 % **4** als Erwartungswert. Ziel der IQM-Mitgliedskrankenhäuser ist es, im Ergebnis unter diesem Erwartungswert zu liegen **1**. Der für das Beispielkrankenhaus tatsächlich gemessene Ist-Wert betrug in diesem Jahr 19,4 % **3** und lag damit über dem Krankenhaus-Erwartungswert für den Qualitätsindikator „Todesfälle bei Hauptdiagnose Transmuraler Herzinfarkt“. Der Durchschnittswert aller IQM-Mitgliedskrankenhäuser liegt bei diesem Indikator bei 11,0 % **2**.

|                                                                                                                          |                        |                          |                          |                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--|
| G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025                                                                                     |                        | Jahr:                    |                          | 2024                   |  |
| Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der <a href="#">Präambel</a> |                        |                          |                          |                        |  |
| IQM Indikatoren                                                                                                          | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungs-wert |  |
|                                                                                                                          | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>    |  |
| Herzerkrankungen                                                                                                         | 1                      | 2                        | 3                        | 4                      |  |
| Herzinfarkt                                                                                                              |                        |                          |                          |                        |  |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Transmuraler Herzinfarkt                                                                    | < Erwartungswert       | 11,0%                    | 19,4%                    | 10,8%                  |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                           | 1                      | 2.623 von 23.934         | 99 von 511               |                        |  |

## Die Indikatoren

Die von IQM verwendeten German/Swiss Inpatient Quality Indicators (G-IQI/CH-IQI) sind so ausgewählt, dass sie sowohl häufige und wichtige Krankheitsbilder als auch wichtige Verfahren abbilden. Alle Indikatoren werden aus den Routinedaten des Krankenhauses ohne zusätzliche Dokumentation abgeleitet, wodurch kein weiterer Dokumentationsaufwand entsteht.

## Was wird gemessen?

Hierbei unterscheiden wir **absolute Mengeninformationen** von **relativen Mengeninformationen**, bei denen z.B. ein Anteil bestimmter Operationsverfahren ausgewiesen wird.

Wesentlicher Messwert ist die **Sterblichkeit** bei verschiedenen Krankheitsbildern, auch wenn wir uns bewusst sind, dass Sterblichkeit im Krankenhaus auch bei bester Medizin nicht vermeidbar ist. Deswegen vergleichen wir die Sterblichkeit, wo verfügbar, mit bundesdurchschnittlichen Werten. Diese werden entweder aus Daten des **Statistischen Bundesamtes** oder aus Daten des **Forschungsdatenzentrums der statistischen Ämter des Bundes und der Länder** berechnet. Mit den Daten des Statistischen Bundesamtes wird eine **Risikogewichtung** für das **Alter** und das **Geschlecht** der Behandelten ermöglicht. Krankenhäuser mit einem hohen Anteil sehr alter Patient:innen weisen in der Regel eine andere Sterblichkeit auf als solche mit vergleichsweise jungen Patientinnen und Patienten.

Als wesentliche Orientierungshilfe zur Einordnung der Ergebnisse dient der **Erwartungswert**, da er besagt, welche Sterblichkeit bei einer Patientengruppe gleicher Alters- und Geschlechtsverteilung im Bundesdurchschnitt zu erwarten wäre. Für einige Indikatoren (G-IQI/CH-IQI 01.1, 02.1, 09.3, 14.26 und 21.311) kommen erweiterte **differenzierte Risikomodelle** zum Einsatz. Diese berücksichtigen zusätzlich Begleiterkrankungen, Erkrankungsschwere und den Zuverlegungsstatus. Insofern ergeben sich für unterschiedliche Krankenhäuser individuelle Erwartungswerte, da Unterschiede in der Alters- und Geschlechtszusammensetzung der Behandelten bestehen. Ziel der IQM-Krankenhäuser ist es, „bessere“ als die erwarteten Werte zu erreichen.

Die Beziehung zwischen erwarteter Sterblichkeit und dem tatsächlichen Wert des Krankenhauses nennt man wissenschaftlich **„standardized mortality rate“** oder kurz **„SMR“**. Liegt diese Quote unter 1, dann ist die tatsächliche Sterblichkeit im Krankenhaus für den gemessenen Indikator geringer als die zu erwartende, liegt sie über 1, ist die Sterblichkeit höher als eigentlich erwartet. Ein solcher Wert ist lediglich bei den Indikatoren errechenbar, bei denen die zu erwartende Sterblichkeit aus den Daten des Statistischen Bundesamtes ermittelt werden kann.

Liegen keine alters- und geschlechtsgewichteten Werte für einen Indikator vor, kann auch kein Erwartungswert errechnet werden. Wir sind uns ebenso bewusst, dass die Sterblichkeit bei manchen Indikatoren ein ausgesprochen seltenes Ereignis ist und nicht als alleiniger Nachweis der medizinischen Qualität gelten darf. Die im „low risk“-Bereich gemessene Sterblichkeit ermöglicht in nachfolgenden Analysen dieser seltenen Ereignisse, wichtige Verbesserungspotentiale zu heben.

## Glossar zur Ergebnisveröffentlichung

Hier finden Sie eine Erläuterung der wichtigsten Begriffe und Kennzahlen, die in dieser Veröffentlichung verwendet werden:

### **IQM Zielwert - Quellen (Herkunft und Berechnung):**

Die Referenz- bzw. Zielwerte für die Indikatoren basieren auf verschiedenen Quellen. Die jeweilige Quelle wird durch eine Nummer unter dem „IQM Zielwert“ angegeben:

- 1: Forschungsdatenzentren der statistischen Ämter des Bundes und der Länder, DRG-Statistik 2022. Eigene Berechnungen. Diese Daten bilden auch die Grundlage für die Berechnung der klinikindividuellen Erwartungswerte, standardisiert nach Alter und Geschlecht.
- 2: Gleiche Quelle wie 1; jedoch speziell für Mengenindikatoren: Die mittlere Fallzahl (Median in Klammern) für IQM-Mitgliedskrankenhäuser mit entsprechender Leistung im Jahr 2022.
- 3: Der Zielwert ist hier nicht identisch mit dem Bundeswert und wurde entnommen aus: Kaiser D (2007) Mindestmengen aus thoraxchirurgischer Sicht. Chirurg, 78(11): 1012-1017
- 4: Sentinel Event: Kennzahl wurde im G-IQI Kolloquium als Sentinel Event eingestuft (seltene Ereignisse, die man nicht erwartet). Weitere Infos dazu in den G-IQI FAQs.
- 5: Differenziertes Risikomodell zur Berechnung der Erwartungswerte; basierend auf Daten der Forschungsdatenzentren der statistischen Ämter des Bundes und der Länder, DRG-Statistik 2022. Eigene Berechnungen.
- 6: Empfehlung aus der Beschlussfassung der G-IQI Version 5.5 im Kolloquium II durch den wissenschaftlichen Beirat des IQM e.V.

### **IQM-Durchschnittswert - Fallzahl:**

Der IQM-Durchschnittswert gibt die mittleren Ergebnisse über alle Patient:innen an, die im Beobachtungszeitraum in IQM-Mitgliedskrankenhäusern (D) behandelt wurden. Mengenangaben werden als Durchschnittswert und zusätzlich in Klammern als Median dargestellt.

### **Krankenhaus Erwartungswert:**

Dieser Wert beschreibt die erwartete Sterblichkeit der Patient:innen, basierend auf Alters- und Geschlechtsverteilung. Er wird nur für Indikatoren berechnet, bei denen Vergleichszahlen des Bundesdurchschnitts vorliegen.

Für einige Indikatoren (G-IQI/CH-IQI 01.1, 02.1, 09.3, 14.26 und 21.311) kommen erweiterte differenzierte Risikomodelle zum Einsatz. Diese berücksichtigen zusätzlich Begleiterkrankungen, Erkrankungsschwere und den Zuverlegungsstatus.

### **SMR:**

Die SMR (standardized mortality ratio) ist das Verhältnis von beobachteter Sterblichkeit (Durchschnittswert) und dem Erwartungswert.

### **Hinweis zum Indikator „Obduktionsrate“:**

Die Anzahl der ausgewiesenen Obduktionen kann unvollständig sein, da nicht alle Krankenhaus-Dokumentationssysteme eine vollständige bzw. nachträgliche Kodierung nach Entlassung (bzw. Tod) unterstützen.

### **Fallzahlen und Mindestgrenzen:**

Ergebnisse einer Kennzahl werden nur dann im Detail dargestellt, wenn mindestens 4 oder mehr Fälle im Nenner aufgetreten sind. Bei Unterschreiten dieser Grenze wird dann die Angabe „<4“ ausgewiesen.

Ergebnisse, die sich auf sehr seltene Ereignisse beziehen, werden mit bis zu 4 Nachkommastellen ausgewiesen, um bei hohen Grundgesamtheiten ein Ergebnis zwischen 0 und 1 ausweisen zu können.