

## Ergebnisdarstellung und Nutzung der Indikatoren-Sets

Im Sinne einer transparenten und fundierten Qualitätsanalyse möchten wir Ihnen mit dieser Veröffentlichung eine strukturierte Orientierungshilfe zu den dargestellten Ergebnissen bieten. Die Nutzung der Indikatoren-Sets ermöglicht eine präzise Einordnung der Resultate und unterstützt eine gezielte Analyse.

Mit der Versionierung auf G-IQI/CH-IQI 5.5 wurden einige Indikatoren als **Sentinel Events** klassifiziert, um besonders kritische Ereignisse klar zu kennzeichnen. Diese sind in der Spalte „IQM Zielwert“ mit dem Zusatz „SE“ ausgewiesen.

Zudem wurde die **Bezeichnung der G-IQI/CH-IQI systematisch überarbeitet**, um eine bessere Verständlichkeit und Konsistenz zu gewährleisten. Die Anpassungen dieser Terminologie spiegeln sich auch in diesem Dokument wider.

Wir laden Sie ein, die Ergebnisse unter diesen Aspekten zu betrachten und für Ihre weiterführenden Analysen zu nutzen.

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

### IQM Indikatoren

[Qualitätsbericht](#)

[QSR-Mehrjahresergebnisse](#)

### Inhaltsverzeichnis

|                                                    |                      |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Herzerkrankungen                                   | <a href="#">2024</a> | <a href="#">2023</a> |
| Erkrankungen des Nervensystems und Schlaganfall    | <a href="#">2024</a> | <a href="#">2023</a> |
| Altersmedizin                                      | <a href="#">2024</a> | <a href="#">2023</a> |
| Lungenerkrankungen                                 | <a href="#">2024</a> | <a href="#">2023</a> |
| Erkrankungen der Bauchorgane                       | <a href="#">2024</a> | <a href="#">2023</a> |
| Gefäßoperationen                                   | <a href="#">2024</a> | <a href="#">2023</a> |
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe                   | <a href="#">2024</a> | <a href="#">2023</a> |
| Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe | <a href="#">2024</a> | <a href="#">2023</a> |
| Urologie                                           | <a href="#">2024</a> | <a href="#">2023</a> |
| Hautkrankheiten                                    | <a href="#">2024</a> | <a href="#">2023</a> |
| Intensivmedizin                                    | <a href="#">2024</a> | <a href="#">2023</a> |
| Palliativmedizin                                   | <a href="#">2024</a> | <a href="#">2023</a> |

[Lesehilfe](#)

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)**

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |

Herzerkrankungen

Herzinfarkt

|                                                                      |                  |                   |           |       |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------|-------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Herzinfarkt                             | < Erwartungswert | 7,1%              | 6,8%      | 8,1%  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | 1 / 5            | 5.037 von 70.894  | 5 von 74  | 0,84  |
| Anteil der Herzinfarkte mit Linksherzkatheter                        | Information      | 86,0%             | 82,4%     |       |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | 1                | 60.951 von 70.894 | 61 von 74 |       |
| Todesfälle bei Direktaufnahme ohne Verlegung                         | Beobachtungswert | 7,1%              | 6,8%      |       |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | 1                | 4.544 von 64.327  | 5 von 73  |       |
| Anteil transmuraler Herzinfarkte (STEMI)                             | Information      | 33,8%             | 24,3%     |       |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | 1                | 23.934 von 70.824 | 18 von 74 |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Transmuraler Herzinfarkt                | < Erwartungswert | 11,0%             | 16,7%     | 14,0% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | 1                | 2.623 von 23.934  | 3 von 18  |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Nicht-transmuraler Herzinfarkt (NSTEMI) | < Erwartungswert | 4,7%              | 3,6%      | 6,5%  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | 1                | 2.188 von 46.325  | 2 von 56  |       |
| Todesfälle bei Nebendiagnose Herzinfarkt                             | Beobachtungswert | 17,3%             | 22,7%     |       |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | 1                | 3.490 von 20.146  | 5 von 22  |       |

Herzinsuffizienz

|                                                                                                     |                  |                    |             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------|------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Herzinsuffizienz                                                       | < Erwartungswert | 7,6%               | 4,5%        | 9,5% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | 1 / 5            | 12.766 von 166.959 | 21 von 466  | 0,47 |
| Anteil Behandlungsfälle mit Beschwerden bei Linksherzinsuffizienz bereits im Ruhezustand (NYHA IV)  | Information      | 46,6%              | 49,1%       |      |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | 1                | 53.334 von 114.561 | 197 von 401 |      |
| Anteil Behandlungsfälle mit Beschwerden bei Rechtsherzinsuffizienz bereits im Ruhezustand (NYHA IV) | Information      | 5,5%               | 1,5%        |      |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | 1                | 2.710 von 49.553   | 1 von 65    |      |

Linksherzkatheter

|                                                                                                                                                                                    |                   |                   |           |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------|
| Anzahl aller Linksherzkatheter zur Koronardiagnostik                                                                                                                               | Mengeninformation | 847,3 (758)       | 763       |      |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                                                     | 2                 | 271.132           |           |      |
| Todesfälle mit Linksherzkatheter bei Herzinfarkt ohne Zuverlegungen oder Herz-Kreislauf-Stillstand vor Krankenhaus-Aufnahme und ohne Herzoperation                                 | < Erwartungswert  | 4,2%              | 3,3%      | 5,8% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                                                     | 1                 | 2.310 von 54.643  | 2 von 60  | 0,58 |
| Todesfälle bei diagnostischem Linksherzkatheter ohne Hauptdiagnose Herzinfarkt, ohne Zuverlegungen oder Herz-Kreislauf-Stillstand vor Krankenhaus-Aufnahme und ohne Herzoperation  | < Erwartungswert  | 1,0%              | 0,6%      | 1,0% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                                                     | 1                 | 1.215 von 115.908 | 3 von 496 | 0,61 |
| Todesfälle bei therapeutischem Linksherzkatheter ohne Hauptdiagnose Herzinfarkt, ohne Zuverlegungen oder Herz-Kreislauf-Stillstand vor Krankenhaus-Aufnahme und ohne Herzoperation | < Erwartungswert  | 1,3%              | 1,0%      | 1,4% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                                                     | 1                 | 1.010 von 76.129  | 2 von 202 |      |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                                                                     | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungs-wert |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                                     | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>    |
| Anteil der Behandlungen mit therapeutischem Linksherzkatheter ohne Hauptdiagnose Herzinfarkt und ohne Herzoperation | Information            | 39,4%                    | 28,9%                    |                        |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                      | 1                      | 78.048 von 198.022       | 202 von 700              |                        |
| Herzrhythmusstörungen                                                                                               |                        |                          |                          |                        |
| Behandlungsfälle mit Herzrhythmusstörungen als Hauptdiagnose                                                        | Mengeninformation      | 515,0 (355)              | 346                      |                        |
|                                                                                                                     | 2                      | 186.941                  |                          |                        |
| Versorgung mit Schrittmacher oder Defibrillator                                                                     |                        |                          |                          |                        |
| Versorgung mit Herzschrittmacher oder Defibrillator                                                                 | Mengeninformation      | 152,3 (107)              | 81                       |                        |
|                                                                                                                     | 2                      | 47.357                   |                          |                        |
| Versorgung mit Herzschrittmacher <u>und</u> Defibrillator                                                           | Mengeninformation      | 48,7 (36)                | 22                       |                        |
|                                                                                                                     | 2                      | 12.283                   |                          |                        |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr: 2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> | IQM<br>Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert<br><a href="#">SMR</a> |
|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Erkrankungen des Nervensystems und Schlaganfall

Bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhaut

|                                                                         |                        |                   |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|--|
| Bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhäute als Hauptdiagnose | Mengeninformation<br>2 | 35,1 (6)<br>8.857 | n.a.<br><4 |  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|--|

Todesfälle bei allen Formen des Schlaganfalls

|                                           |                  |                    |          |       |
|-------------------------------------------|------------------|--------------------|----------|-------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Schlaganfall | < Erwartungswert | 9,7%               | 13,3%    | 11,3% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre            | 1                | 10.387 von 107.151 | 4 von 30 |       |

Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirninfarkt

|                                                                                                                        |                       |                   |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------|-------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirninfarkt                                                                               | < Erwartungswert      | 7,1%              | 3,7%     | 13,1% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                         | 1 / 5                 | 6.511 von 92.264  | 1 von 27 |       |
| Anteil der Hirninfarkte mit medikamentöser Auflösung des Blutgerinnsels (Thrombolyse) ohne Zuverlegungen               | Information           | 18,4%             | 0,0%     |       |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                         | 1                     | 15.600 von 84.989 | 0 von 25 |       |
| Anteil Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Hirninfarkt mit Entfernung des Blutgerinnsels durch Katheter (Thrombektomie) | Information           | 10,7%             | 0,0%     |       |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                         | 1                     | 9.955 von 93.342  | 0 von 27 |       |
| davon Anteil der Hirninfarkte mit Lungenentzündung, die bei Aufnahme nicht bestand                                     | Beobachtungswert      | 4,9%              | 0,0%     |       |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                         | 1                     | 4.566 von 93.342  | 0 von 27 |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirnblutung (intrazerebral)                                                               | Beobachtungswert      | 28,8%             | n.a.     |       |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                         | 1                     | 3.227 von 11.199  | <4       |       |
| Anteil nicht näher bezeichneter Schlaganfälle als Hauptdiagnose                                                        | <0,42%                | 0,24%             | 0,0%     |       |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                         | 1                     | 259 von 108.712   | 0 von 30 |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose TIA ohne Neubildungen und Kopfverletzungen                                                | Beobachtungswert (SE) | 0,2763%           | 0,0%     |       |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                         | 1 / 4                 | 96 von 34.751     | 0 von 17 |       |

Behandlung auf einer Stroke Unit

|                                                                                                                                                           |                  |                    |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------|--|
| Anteil Hauptdiagnose Hirninfarkte mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung                                                                       | Information      | 76,3%              | 0,0%     |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                            | 1                | 71.261 von 93.342  | 0 von 27 |  |
| Anteil Hauptdiagnose TIA mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung                                                                                | Information      | 76,7%              | 0,0%     |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                            | 1                | 26.855 von 34.991  | 0 von 17 |  |
| Anteil mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung ohne Zuverlegungen (in Anlehnung an Schlaganfallregister) bei Hauptdiagnose Hirninfarkt oder TIA | Beobachtungswert | 78,2%              | 0,0%     |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                            | 1                | 94.089 von 120.268 | 0 von 42 |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

## Präambel

| IQM Indikatoren                                                                                                                                          | IQM Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> | IQM Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik Erwartungs-wert<br><a href="#">SMR</a> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Anteil mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung nur Zuverlegungen (in Anlehnung an Schlaganfallregister) bei Hauptdiagnose Hirninfarkt oder TIA | Information                            | 49,9%                                             | n.a.                                        |                                               |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                           | 1                                      | 4.027 von 8.065                                   | <4                                          |                                               |
| Epilepsie                                                                                                                                                |                                        |                                                   |                                             |                                               |
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Epilepsie                                                                                                             | Mengeninformation                      | 116,8 (44)                                        | 16                                          |                                               |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                           | 2                                      | 39.466                                            |                                             |                                               |
| Multiple Sklerose                                                                                                                                        |                                        |                                                   |                                             |                                               |
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Multiple Sklerose                                                                                                     | Mengeninformation                      | 35,4 (22)                                         | n.a.                                        |                                               |
|                                                                                                                                                          | 2                                      | 8.345                                             | <4                                          |                                               |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |

Altersmedizin

Geriatrische Frührehabilitation

|                                                       |                   |             |     |  |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----|--|
| Behandlungsfälle mit geriatrischer Frührehabilitation | Mengeninformation | 532,4 (447) | 380 |  |
|                                                       | 2                 | 122.983     |     |  |

Mangelernährung bei Älteren

|                                                                                  |             |                      |              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|--|
| Anteil Behandlungsfälle mit erheblicher Mangelernährung und ohne Tumorerkrankung | Information | 0,88%                | 1,32%        |  |
| Alle Patient:innen >= 65 Jahre                                                   | 1           | 21.895 von 2.486.668 | 68 von 5.160 |  |

|                                                                                                                 |             |                |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------|--|
| Anteil Behandlungsfälle mit Sonden-/Infusionsernährung bei erheblicher Mangelernährung und ohne Tumorerkrankung | Information | 1,8%           | 0,0%     |  |
| Alle Patient:innen >= 65 Jahre                                                                                  | 1           | 387 von 21.895 | 0 von 68 |  |

Delir

|                                                                      |             |                      |              |  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|--|
| Anteil Behandlungsfälle mit aufgetretenem Delir an operierten Fällen | Information | 3,0%                 | 3,6%         |  |
| Alle Patient:innen >= 60 Jahre                                       | 1           | 40.039 von 1.327.814 | 80 von 2.250 |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    |  | Klinik Ist-Wert          |  | Klinik Erwartungs-wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--|------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> |  | <a href="#">Fallzahl</a> |  | <a href="#">SMR</a>    |

Lungenerkrankungen

Lungenentzündung (Pneumonie)

|                                                                                                     |                       |        |             |       |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-------------|-------|---------|-------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung                                                       | < Erwartungswert      | 10,0%  |             | 13,4% |         | 17,5% |
| alle Altersgruppen                                                                                  | 1                     | 16.307 | von 162.332 | 31    | von 232 |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung ohne Zuverlegung, Tumor, Mukoviszidose                | < Erwartungswert      | 9,2%   |             | 11,6% |         | 14,5% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | 1                     | 10.353 | von 112.464 | 22    | von 189 |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung ohne Zuverlegung, Tumor, Mukoviszidose, COVID-19      | < Erwartungswert      | 8,6%   |             | 9,6%  |         | 13,4% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | 1 / 5                 | 8.604  | von 100.621 | 17    | von 178 | 0,71  |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung ohne Zuverlegung, Tumor, Mukoviszidose                | Beobachtungswert (SE) | 0,15%  |             | n.a.  |         |       |
| Alle Patient:innen 1 bis 19 Jahre                                                                   | 1 / 4                 | 28     | von 18.387  | <4    |         |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung durch Aspiration von Nahrungsmitteln oder Mageninhalt | Beobachtungswert      | 27,8%  |             | 33,3% |         |       |
|                                                                                                     | 1                     | 3.446  | von 12.409  | 5     | von 15  |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Bronchitis oder Bronchiolitis ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose | < Erwartungswert      | 1,9%   |             | 4,2%  |         | 2,4%  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | 1                     | 244    | von 13.186  | 3     | von 71  |       |

COPD (Chronisch obstruktive Lungenkrankheit)

|                                   |                  |       |            |      |         |      |
|-----------------------------------|------------------|-------|------------|------|---------|------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose COPD | < Erwartungswert | 4,4%  |            | 2,8% |         | 5,5% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre    | 1                | 2.907 | von 66.452 | 5    | von 180 | 0,50 |

Lungenkrebs

|                                                |                   |            |  |    |  |  |
|------------------------------------------------|-------------------|------------|--|----|--|--|
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Lungenkrebs | Mengeninformation | 191,4 (52) |  | 53 |  |  |
|                                                | 2                 | 66.602     |  |    |  |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr: 2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

Präambel

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert |  |  | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |  |  |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--|--|--------------------------|-------------------------------|--|--|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> |  |  | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |  |  |

## Erkrankungen der Bauchorgane

### Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen (ohne Tumor)

|                                                                                          |                  |         |     |        |         |     |     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----|--------|---------|-----|-----|--|
| Anteil laparoskopischer Operationen bei Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen     | >95,1%           | 96,0%   |     |        | 99,1%   |     |     |  |
|                                                                                          | 1                | 50.963  | von | 53.069 | 115     | von | 116 |  |
| Anteil Umsteiger auf offene Operationen bei Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen | Beobachtungswert | 2,4%    |     |        | 0,0%    |     |     |  |
|                                                                                          | 1                | 1.269   | von | 53.069 | 0       | von | 116 |  |
| Todesfälle bei Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen                              | <0,60% (SE)      | 0,4541% |     |        | 0,8621% |     |     |  |
|                                                                                          | 1 / 4            | 241     | von | 53.069 | 1       | von | 116 |  |

### Operation von Leisten-, Schenkel- und Nabelbrüchen (Hernien)

|                                                                   |                  |         |     |        |       |     |    |  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----|--------|-------|-----|----|--|
| Todesfälle bei Bruchoperationen ohne anteilige Darmentfernung     | <0,12% (SE)      | 0,1007% |     |        | 0,0%  |     |    |  |
|                                                                   | 1 / 4            | 71      | von | 70.497 | 0     | von | 54 |  |
| Todesfälle bei Bruchoperationen mit anteiliger Darmentfernung     | Beobachtungswert | 2,3%    |     |        | 25,0% |     |    |  |
|                                                                   | 1                | 144     | von | 6.140  | 1     | von | 4  |  |
| Anteil Behandlungsfälle mit Leistenbruchoperation mit Netzeinlage | Information      | 98,2%   |     |        | 88,9% |     |    |  |
|                                                                   | 1                | 44.462  | von | 45.266 | 24    | von | 27 |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                    |                  |         |     |        |       |     |    |  |

### Eingriffe an der Schilddrüse

|                                                                                      |                   |           |     |        |      |     |   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----|--------|------|-----|---|--|
| Behandlungsfälle mit operativer Entfernung der Schilddrüse                           | Mengeninformation | 61,6 (24) |     |        | 8    |     |   |  |
|                                                                                      | 2                 | 17.239    |     |        |      |     |   |  |
| Behandlungsfälle mit operativer Entfernung der Schilddrüse bei Schilddrüsenkrebs     | Mengeninformation | 13,2 (6)  |     |        | n.a. |     |   |  |
|                                                                                      | 2                 | 2.639     |     |        | <4   |     |   |  |
| Behandlungsfälle mit operativer Entfernung der Schilddrüse bei gutartiger Erkrankung | Mengeninformation | 51,6 (22) |     |        | 7    |     |   |  |
|                                                                                      | 2                 | 13.633    |     |        |      |     |   |  |
| Anteil der Beatmungsfälle (> 24 Std.) nach Schilddrüseneingriff                      | Information (SE)  | 0,55%     |     |        | 0,0% |     |   |  |
|                                                                                      | 1 / 4             | 89        | von | 16.263 | 0    | von | 8 |  |

### Große Operationen am Dick- und Enddarm (Kolon und Rektum)

|                                                                                     |                   |            |     |        |      |     |    |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----|--------|------|-----|----|------|
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Dick-/Enddarmkrebs                               | Mengeninformation | 129,6 (84) |     |        | 85   |     |    |      |
|                                                                                     | 2                 | 44.981     |     |        |      |     |    |      |
| Behandlungsfälle mit Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn                             | Mengeninformation | 99,5 (62)  |     |        | 58   |     |    |      |
|                                                                                     | 2                 | 38.009     |     |        |      |     |    |      |
| Todesfälle bei operativer Entfernung des Dick-/Enddarms                             | Beobachtungswert  | 7,4%       |     |        | 8,7% |     |    |      |
|                                                                                     | 1                 | 2.681      | von | 36.051 | 4    | von | 46 |      |
| Todesfälle bei operativer Dickdarmentfernung bei Krebs ohne komplizierende Diagnose | < Erwartungswert  | 3,3%       |     |        | 0,0% |     |    | 3,7% |
|                                                                                     | 1 / 5             | 293        | von | 8.881  | 0    | von | 16 | 0,00 |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                                               | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert     |  |  | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungs-wert |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--|--|--------------------------|------------------------|
|                                                                                               | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a>  |  |  | <a href="#">Fallzahl</a> |                        |
| Todesfälle bei operativer Dickdarmentfernung bei Krebs mit komplizierender Diagnose           | Beobachtungswert<br>1  | 10,5%<br>272 von 2.590    |  |  | n.a.<br><4               |                        |
| Todesfälle bei operativer Enddarmentfernung bei Krebs                                         | <3,2%<br>1             | 2,5%<br>105 von 4.184     |  |  | 20,0%<br>1 von 5         |                        |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Divertikel ohne Abszess/Perforation | <0,72% (SE)<br>1 / 4   | 0,6938%<br>14 von 2.018   |  |  | 0,0%<br>0 von 7          |                        |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Divertikel mit Abszess/Perforation  | Beobachtungswert<br>1  | 5,5%<br>259 von 4.729     |  |  | 25,0%<br>1 von 4         |                        |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn  | Beobachtungswert<br>1  | 2,6%<br>54 von 2.076      |  |  | n.a.<br><4               |                        |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei anderen Diagnosen                   | Information<br>1       | 8,2%<br>780 von 9.464     |  |  | 18,2%<br>2 von 11        |                        |
| Anteil operative Leberentfernung bei Entfernung des Dick-/Enddarms bei Dick- und Enddarmkrebs | Information<br>1       | 4,1%<br>648 von 15.655    |  |  | 0,0%<br>0 von 22         |                        |
| Behandlungsfälle mit roboterassistiertem Eingriff bei Krebserkrankung des Darms               | Information<br>1       | 20,1%<br>3.153 von 15.655 |  |  | 0,0%<br>0 von 22         |                        |

Erkrankungen des Magens

|                                                                                                              |                        |                        |  |  |                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--|--|------------------|--|
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Magenkrebs (mit und ohne Magenoperation)                                  | Mengeninformation<br>2 | 44,9 (25)<br>14.822    |  |  | 16               |  |
| Todesfälle bei Geschwüren an Magen, Zwölffingerdarm oder Dünndarm als Hauptdiagnose (mit und ohne Operation) | Beobachtungswert<br>1  | 5,1%<br>983 von 19.463 |  |  | 7,9%<br>3 von 38 |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr: 2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

Präambel

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert | IQM Durchschnittswert | Klinik Ist-Wert | Klinik Erwartungs-wert |
|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------|------------------------|
|                 | Quelle       | Fallzahl              | Fallzahl        | SMR                    |

## Gefäßoperationen

### Eingriffe an der Hauptschlagader (Aorta)

|                                                        |                   |               |      |  |
|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------|--|
| Operation an der Hauptschlagader (Aorta)               | Mengeninformation | 56,2 (30)     | n.a. |  |
|                                                        | 2                 | 10.571        | <4   |  |
| Operation an der Bauchaorta                            | Mengeninformation | 29,6 (24)     | n.a. |  |
|                                                        | 2                 | 5.358         | <4   |  |
| Todesfälle bei Operation der Bauchaorta ohne Aneurysma | Beobachtungswert  | 10,8%         | n.a. |  |
|                                                        | 1                 | 49 von 452    | <4   |  |
| Todesfälle bei rupturiertem Aortenaneurysma            | Information       | 41,9%         | n.a. |  |
|                                                        | 1                 | 801 von 1.911 | <4   |  |

### Eingriffe der Becken-/Bein-Arterien

|                                                          |             |                  |          |  |
|----------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|--|
| Todesfälle bei Operationen der Becken-/Beinarterien      | Information | 5,5%             | 0,0%     |  |
|                                                          | 1           | 1.525 von 27.921 | 0 von 34 |  |
| davon Todesfälle bei Schaufensterkrankheit (Claudicatio) | <0,33% (SE) | 0,301%           | 0,0%     |  |
|                                                          | 1 / 4       | 17 von 5.647     | 0 von 7  |  |
| davon Todesfälle bei Ruheschmerz                         | <2,3%       | 1,7%             | n.a.     |  |
|                                                          | 1           | 38 von 2.179     | <4       |  |
| davon Todesfälle bei Ulzeration/Gangrän                  | <4,5%       | 3,5%             | 0,0%     |  |
|                                                          | 1           | 118 von 3.335    | 0 von 8  |  |

### PTA (Perkutan transluminale Gefäßinterventionen)

|                                                                                       |                   |                  |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------|--|
| Todesfälle bei Wiedereröffnung eines verschlossenen Gefäßes mittels Ballonkatheter    | Beobachtungswert  | 2,9%             | 3,0%     |  |
|                                                                                       | 1                 | 1.699 von 57.910 | 3 von 99 |  |
| PTA Abdomen/Beinarterien mit arterieller Operation im gleichen stationären Aufenthalt | Mengeninformation | 49,2 (41)        | n.a.     |  |
|                                                                                       | 2                 | 10.032           | <4       |  |

### Arteriovenöser Shunt

|                                     |                   |           |    |  |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|----|--|
| Anlegen eines arteriovenösen Shunts | Mengeninformation | 28,9 (16) | 41 |  |
|                                     | 2                 | 5.344     |    |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | <div>IQM<br/>Zielwert</div> <div><a href="#">Quelle</a></div> | <div>IQM<br/>Durchschnittswert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Ist-Wert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Erwartungs-<br/>wert</div> <div><a href="#">SMR</a></div> |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                               |                                                                          |                                                                    |                                                                           |

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Bösartige Neubildungen der Brust und der weiblichen Geschlechtsorgane

|                                                                                             |                                           |                                         |               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--|
| Behandlungsfälle mit Krebserkrankung der Brust oder der Geschlechtsorgane als Hauptdiagnose | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div> | <div>209,8 (60)</div> <div>71.973</div> | <div>23</div> |  |
| Behandlungsfälle mit Eierstockkrebs als Hauptdiagnose                                       | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div> | <div>31,1 (12)</div> <div>9.486</div>   | <div>4</div>  |  |
| Behandlungsfälle mit Gebärmutterkrebs als Hauptdiagnose                                     | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div> | <div>52,3 (29)</div> <div>14.604</div>  | <div>7</div>  |  |
| Behandlungsfälle mit Brustkrebs als Hauptdiagnose                                           | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div> | <div>133,9 (26)</div> <div>44.064</div> | <div>11</div> |  |

Eingriffe an der Brust

|                        |                                           |                                          |               |  |
|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|--|
| Eingriffe an der Brust | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div> | <div>187,6 (150)</div> <div>39.772</div> | <div>24</div> |  |
|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|--|

Eingriffe am Beckenboden bei der Frau

|                                                                               |                                           |                                        |                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|--|
| Behandlungsfälle mit Beckenbodenoperationen mit und ohne plastische Operation | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div> | <div>78,5 (62)</div> <div>20.182</div> | <div>n.a.</div> <div>&lt;4</div> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|--|

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr: 2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> | IQM<br>Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert<br><a href="#">SMR</a> |
|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe

Bösartige Neubildungen des Bewegungsapparates

|                                                                                                                                    |                            |                        |                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|--|
| Behandlungsfälle mit bösartiger Neubildung an Knochen, Gelenkknorpel, peripheren Nerven, Retroperitoneum, Bindegewebe, Weichteilen | Mengeninformation<br><br>2 | 46,8 (5)<br><br>14.169 | n.a.<br><br><4 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|--|

Gelenkersatz (Endoprothetik)

|                                                                                                                                           |                           |                              |                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|--|
| Todesfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung                                        | <0,13% (SE)<br><br>1 / 4  | 0,0846%<br><br>51 von 60.250 | 0,0%<br><br>0 von 138 |  |
| Todesfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei hüftgelenknahen Frakturen                                                          | Beobachtungswert<br><br>1 | 4,7%<br><br>985 von 20.903   | 5,0%<br><br>2 von 40  |  |
| Todesfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei anderen Diagnosen                                                                  | Beobachtungswert<br><br>1 | 4,7%<br><br>319 von 6.857    | 0,0%<br><br>0 von 6   |  |
| Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung | Beobachtungswert<br><br>1 | 2,0%<br><br>1.222 von 60.250 | 0,7%<br><br>1 von 138 |  |
| Todesfälle bei Wechsel eines Hüftgelenkersatzes ohne Fraktur oder Infektion                                                               | <1,42% (SE)<br><br>1 / 4  | 1,36%<br><br>65 von 4.781    | n.a.<br><br><4        |  |
| Todesfälle bei Wechsel eines Hüftgelenkersatzes wegen Fraktur oder Infektion                                                              | Beobachtungswert<br><br>1 | 4,1%<br><br>169 von 4.150    | 0,0%<br><br>0 von 7   |  |
| Todesfälle bei Kniegelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung                                        | <0,06% (SE)<br><br>1 / 4  | 0,0278%<br><br>18 von 64.683 | 0,0%<br><br>0 von 232 |  |
| Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei Kniegelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung | Beobachtungswert<br><br>1 | 1,4%<br><br>874 von 64.683   | 0,0%<br><br>0 von 232 |  |
| Todesfälle bei Wechsel eines Kniegelenk oder -teilersatzes ohne Fraktur oder Infektion                                                    | <0,20% (SE)<br><br>1 / 4  | 0,3095%<br><br>16 von 5.169  | n.a.<br><br><4        |  |
| Todesfälle bei Wechsel eines Kniegelenkersatzes wegen Fraktur oder Infektion                                                              | Beobachtungswert<br><br>1 | 2,0%<br><br>45 von 2.206     | n.a.<br><br><4        |  |
| Todesfälle bei Hüft- oder Kniegelenkersatz bei Tumorerkrankung                                                                            | Beobachtungswert<br><br>1 | 6,1%<br><br>150 von 2.456    | n.a.<br><br><4        |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

Präambel

| IQM Indikatoren                                                                                                                                   | IQM Zielwert          | IQM Durchschnittswert |     |        | Klinik Ist-Wert |     |    | Klinik Erwartungs-wert |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----|--------|-----------------|-----|----|------------------------|
|                                                                                                                                                   | Quelle                | Fallzahl              |     |        | Fallzahl        |     |    | SMR                    |
| Hüftgelenknahe Frakturen                                                                                                                          |                       |                       |     |        |                 |     |    |                        |
| Todesfälle nach operativer Versorgung einer Schenkelhalsfraktur als Hauptdiagnose                                                                 | < Erwartungswert      | 4,3%                  |     |        | 4,9%            |     |    | 5,4%                   |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                    | 1                     | 984                   | von | 22.984 | 2               | von | 41 | 0,91                   |
| Todesfälle nach Gelenkersatz bei Schenkelhalsfraktur als Hauptdiagnose                                                                            | Beobachtungswert      | 4,7%                  |     |        | 5,0%            |     |    |                        |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                    | 1                     | 961                   | von | 20.474 | 2               | von | 40 |                        |
| Todesfälle nach Osteosynthese (Verbindung der Knochenfragmente durch Platten, Schrauben oder Nägel) bei Schenkelhalsfraktur als Hauptdiagnose     | Beobachtungswert      | 0,9%                  |     |        | n.a.            |     |    |                        |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                    | 1                     | 23                    | von | 2.510  | <4              |     |    |                        |
| Todesfälle nach operativer Versorgung einer pertrochantären Fraktur als Hauptdiagnose                                                             | < Erwartungswert      | 4,6%                  |     |        | 3,4%            |     |    | 6,1%                   |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                    | 1                     | 873                   | von | 19.033 | 1               | von | 29 | 0,57                   |
| Todesfälle nach Osteosynthese (Verbindung der Knochenfragmente durch Platten, Schrauben oder Nägel) bei pertrochantärer Fraktur als Hauptdiagnose | Beobachtungswert      | 4,6%                  |     |        | 3,4%            |     |    |                        |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                    | 1                     | 852                   | von | 18.645 | 1               | von | 29 |                        |
| Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark                                                                                                  |                       |                       |     |        |                 |     |    |                        |
| Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark (ohne lokale Schmerztherapie)                                                                    | Mengeninformation     | 341,5 (227)           |     |        | 34              |     |    |                        |
|                                                                                                                                                   | 2                     | 115.097               |     |        |                 |     |    |                        |
| Todesfälle bei alleiniger 'Entlastung' (Dekompression) der Wirbelsäule                                                                            | Beobachtungswert (SE) | 0,1044%               |     |        | 0,0%            |     |    |                        |
|                                                                                                                                                   | 1 / 4                 | 25                    | von | 23.952 | 0               | von | 21 |                        |
| Todesfälle bei 'einfachen' Bandscheibenentfernungen                                                                                               | <0,03% (SE)           | 0,0253%               |     |        | 0,0%            |     |    |                        |
|                                                                                                                                                   | 1 / 4                 | 4                     | von | 15.826 | 0               | von | 11 |                        |
| Todesfälle bei anderen Operationen an der Wirbelsäule oder am Rückenmark                                                                          | Beobachtungswert      | 1,9%                  |     |        | n.a.            |     |    |                        |
|                                                                                                                                                   | 1                     | 410                   | von | 21.255 | <4              |     |    |                        |
| Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei 'einfachen' Bandscheibenentfernungen                                                        | Beobachtungswert (SE) | 0,4234%               |     |        | 0,0%            |     |    |                        |
|                                                                                                                                                   | 1 / 4                 | 67                    | von | 15.826 | 0               | von | 11 |                        |
| Lokale Schmerztherapie an der Wirbelsäule (ohne andere Wirbelsäulen- oder Rückenmarkoperation)                                                    | Mengeninformation     | 87,1 (38)             |     |        | 68              |     |    |                        |
|                                                                                                                                                   | 2                     | 27.869                |     |        |                 |     |    |                        |
| Behandlungsfälle mit Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen als Hauptdiagnose ohne Operation oder lokale Schmerztherapie                         | Mengeninformation     | 142,4 (118)           |     |        | 229             |     |    |                        |
|                                                                                                                                                   | 2                     | 53.541                |     |        |                 |     |    |                        |
| Operationen am Bewegungsapparat inkl. Endoprothetik                                                                                               |                       |                       |     |        |                 |     |    |                        |
| Gelenkersatz am Schulter-/ Ellenbogengelenk                                                                                                       | Mengeninformation     | 37,0 (27)             |     |        | n.a.            |     |    |                        |
|                                                                                                                                                   | 2                     | 12.498                |     |        | <4              |     |    |                        |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                   | IQM<br>Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> | IQM<br>Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert<br><a href="#">SMR</a> |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                           |                                                      |                                                |                                                      |
| Mehrfachverletzungen - Polytraumen                                |                                           |                                                      |                                                |                                                      |
| Mehrfachverletzungen (Polytraumen) im Sinne der<br>DRG-Definition | Mengeninformation<br>2                    | 21,7 (8)<br>6.970                                    | 6                                              |                                                      |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der**

## Präambel

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |

## Urologie

## Operationen der Niere

|                                                                                             |                  |                 |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------|--|
| Todesfälle bei Totalentfernung der Niere bei bösartiger Neubildung                          | <1,8%            | 1,7%            | 0,0%     |  |
|                                                                                             | 1                | 54 von 3.262    | 0 von 15 |  |
| Anteil laparoskopischer Operationen bei Totalentfernung der Niere bei bösartiger Neubildung | Information      | 51,4%           | 0,0%     |  |
|                                                                                             | 1                | 1.678 von 3.262 | 0 von 15 |  |
| Todesfälle bei Teilentfernung der Niere bei bösartiger Neubildung                           | <0,35% (SE)      | 0,255%          | 0,0%     |  |
|                                                                                             | 1 / 4            | 9 von 3.530     | 0 von 9  |  |
| Anteil laparoskopischer Operationen bei Teilentfernung der Niere bei bösartiger Neubildung  | Information      | 68,2%           | 0,0%     |  |
|                                                                                             | 1                | 2.409 von 3.530 | 0 von 9  |  |
| Anteil der Teilentfernungen der Niere bei bösartiger Neubildung                             | Information      | 52,0%           | 37,5%    |  |
|                                                                                             | 1                | 3.530 von 6.792 | 9 von 24 |  |
| Todesfälle bei Totalentfernung der Niere bei anderer Diagnose                               | Beobachtungswert | 3,8%            | n.a.     |  |
|                                                                                             | 1                | 81 von 2.111    | <4       |  |
| Behandlungsfälle mit roboterassistierter Nierenentfernung bei bösartiger Neubildung         | Information      | 47,0%           | 0,0%     |  |
|                                                                                             | 1                | 3.194 von 6.792 | 0 von 24 |  |

## Harnblase

|                                                                                                       |                   |                  |           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------|--|
| Behandlungsfälle mit Blasenkrebs als Hauptdiagnose                                                    | Mengeninformation | 133,5 (34)       | 130       |  |
|                                                                                                       | 2                 | 41.519           |           |  |
| Operationen an der Harnblase durch die Harnröhre                                                      | Mengeninformation | 223,6 (213)      | 200       |  |
|                                                                                                       | 2                 | 43.155           |           |  |
| Operationen an der Harnblase durch die Harnröhre bei Blasenkrebs                                      | Mengeninformation | 177,8 (156)      | 103       |  |
|                                                                                                       | 2                 | 30.056           |           |  |
| Operationen an der Harnblase durch die Harnröhre bei Blasenkrebs mit Einbringen von Chemotherapeutika | Beobachtungswert  | 18,1%            | 8,7%      |  |
|                                                                                                       | 1                 | 5.445 von 30.056 | 9 von 103 |  |
| Todesfälle bei Entfernung der Harnblase                                                               | <4,8%             | 3,9%             | 6,3%      |  |
|                                                                                                       | 1                 | 111 von 2.840    | 1 von 16  |  |
| Behandlungsfälle mit roboterassistierter Harnblasenentfernung                                         | Information       | 18,1%            | 0,0%      |  |
|                                                                                                       | 1                 | 615 von 3.397    | 0 von 16  |  |

## Prostata

|                                                                                         |             |               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------|
| Todesfälle bei Operationen der Prostata durch die Harnröhre bei gutartigen Erkrankungen | <0,20% (SE) | 0,1034%       | 0,0%      |
|                                                                                         | 1 / 4       | 27 von 26.117 | 0 von 115 |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                                                                        | IQM Zielwert                   | IQM Durchschnittswert      | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungs-wert |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                                        | <a href="#">Quelle</a>         | <a href="#">Fallzahl</a>   | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>    |
| Todesfälle bei Operationen der Prostata durch die Harnröhre bei bösartigen Erkrankungen                                | Beobachtungswert (SE)<br>1 / 4 | 0,7547%<br>52 von 6.890    | 0,0%<br>0 von 42         |                        |
| Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei Behandlungsfällen mit Operation der Prostata durch die Harnröhre | Beobachtungswert<br>1          | 3,1%<br>1.039 von 33.007   | 4,5%<br>7 von 157        |                        |
| Behandlungsfälle mit Prostatakrebs als Hauptdiagnose                                                                   | Mengeninformation<br>2         | 113,4 (20)<br>36.416       | 90                       |                        |
| Todesfälle bei radikaler Prostataentfernung                                                                            | <0,16% (SE)<br>1 / 4           | 0,1599%<br>22 von 13.761   | 6,6667%<br>1 von 15      |                        |
| Behandlungsfälle mit roboterassistierter Prostataentfernung                                                            | Information<br>1               | 81,8%<br>11.251 von 13.761 | 0,0%<br>0 von 15         |                        |
| Nierensteine                                                                                                           |                                |                            |                          |                        |
| Behandlungsfälle mit Nierensteinen als Hauptdiagnose                                                                   | Mengeninformation<br>2         | 209,5 (50)<br>71.430       | 240                      |                        |
| Anteil der Behandlungsfälle mit Intervention zur Steinentfernung bei Hauptdiagnose Nierensteine                        | Information<br>1               | 51,5%<br>36.814 von 71.430 | 60,8%<br>146 von 240     |                        |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | <div>IQM<br/>Zielwert</div> <div><a href="#">Quelle</a></div> | <div>IQM<br/>Durchschnittswert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Ist-Wert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Erwartungs-<br/>wert</div> <div><a href="#">SMR</a></div> |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

Hautkrankheiten

Hautkrankheiten

|                                                             |                                           |                                       |                                  |  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| Behandlungsfälle mit Melanom als Hauptdiagnose              | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div> | <div>47,2 (4)</div> <div>11.840</div> | <div>n.a.</div> <div>&lt;4</div> |  |
| Behandlungsfälle mit Dermatitis und Ekzem als Hauptdiagnose | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div> | <div>34,3 (6)</div> <div>11.214</div> | <div>8</div>                     |  |



G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                         | IQM<br>Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> | IQM<br>Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert<br><a href="#">SMR</a> |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                         |                                           |                                                      |                                                |                                                      |
| Palliativmedizin                        |                                           |                                                      |                                                |                                                      |
| Palliativmedizin                        |                                           |                                                      |                                                |                                                      |
| Palliativmedizinische Komplexbehandlung | Mengeninformation<br>2                    | 223,5 (139)<br>47.612                                | 231                                            |                                                      |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    |  | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungs-wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> |  | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>    |

Herzerkrankungen

Herzinfarkt

|                                                                      |                  |        |            |       |        |       |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------|-------|--------|-------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Herzinfarkt                             | < Erwartungswert | 7,5%   |            | 11,4% |        | 9,2%  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | 1 / 5            | 5.337  | von 70.837 | 9     | von 79 | 1,23  |
| Anteil der Herzinfarkte mit Linksherzkatheter                        | Information      | 85,8%  |            | 70,9% |        |       |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | 1                | 60.786 | von 70.837 | 56    | von 79 |       |
| Todesfälle bei Direktaufnahme ohne Verlegung                         | Beobachtungswert | 7,4%   |            | 12,0% |        |       |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | 1                | 4.746  | von 64.041 | 9     | von 75 |       |
| Anteil transmuraler Herzinfarkte (STEMI)                             | Information      | 33,7%  |            | 13,9% |        |       |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | 1                | 23.848 | von 70.760 | 11    | von 79 |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Transmuraler Herzinfarkt                | < Erwartungswert | 11,6%  |            | 0,0%  |        | 11,5% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | 1                | 2.761  | von 23.848 | 0     | von 11 |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Nicht-transmuraler Herzinfarkt (NSTEMI) | < Erwartungswert | 5,1%   |            | 13,2% |        | 6,4%  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | 1                | 2.361  | von 46.320 | 9     | von 68 |       |
| Todesfälle bei Nebendiagnose Herzinfarkt                             | Beobachtungswert | 17,8%  |            | 0,0%  |        |       |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | 1                | 3.670  | von 20.570 | 0     | von 22 |       |

Herzinsuffizienz

|                                                                                                     |                  |        |             |       |         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------------|-------|---------|------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Herzinsuffizienz                                                       | < Erwartungswert | 8,2%   |             | 7,5%  |         | 8,6% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | 1 / 5            | 13.117 | von 160.876 | 36    | von 478 | 0,88 |
| Anteil Behandlungsfälle mit Beschwerden bei Linksherzinsuffizienz bereits im Ruhezustand (NYHA IV)  | Information      | 46,7%  |             | 46,2% |         |      |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | 1                | 50.732 | von 108.703 | 190   | von 411 |      |
| Anteil Behandlungsfälle mit Beschwerden bei Rechtsherzinsuffizienz bereits im Ruhezustand (NYHA IV) | Information      | 5,7%   |             | 1,7%  |         |      |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | 1                | 2.812  | von 49.475  | 1     | von 60  |      |

Linksherzkatheter

|                                                                                                                                                                                    |                   |           |             |      |         |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|------|---------|------|
| Anzahl aller Linksherzkatheter zur Koronardiagnostik                                                                                                                               | Mengeninformation | 853 (778) |             | 650  |         |      |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                                                     | 2                 | 269.548   |             |      |         |      |
| Todesfälle mit Linksherzkatheter bei Herzinfarkt ohne Zuverlegungen oder Herz-Kreislauf-Stillstand vor Krankenhaus-Aufnahme und ohne Herzoperation                                 | < Erwartungswert  | 4,6%      |             | 5,6% |         | 5,3% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                                                     | 1                 | 2.501     | von 54.395  | 3    | von 54  | 1,05 |
| Todesfälle bei diagnostischem Linksherzkatheter ohne Hauptdiagnose Herzinfarkt, ohne Zuverlegungen oder Herz-Kreislauf-Stillstand vor Krankenhaus-Aufnahme und ohne Herzoperation  | < Erwartungswert  | 1,1%      |             | 0,5% |         | 1,0% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                                                     | 1                 | 1.265     | von 117.048 | 2    | von 396 | 0,50 |
| Todesfälle bei therapeutischem Linksherzkatheter ohne Hauptdiagnose Herzinfarkt, ohne Zuverlegungen oder Herz-Kreislauf-Stillstand vor Krankenhaus-Aufnahme und ohne Herzoperation | < Erwartungswert  | 1,3%      |             | 0,0% |         | 1,4% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                                                     | 1                 | 973       | von 73.982  | 0    | von 197 |      |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                                                                     | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                     | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |
| Anteil der Behandlungen mit therapeutischem Linksherzkatheter ohne Hauptdiagnose Herzinfarkt und ohne Herzoperation | Information            | 38,5%                    | 33,2%                    |                               |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                      | 1                      | 75.910 von 197.238       | 197 von 594              |                               |
| Herzrhythmusstörungen                                                                                               |                        |                          |                          |                               |
| Behandlungsfälle mit Herzrhythmusstörungen als Hauptdiagnose                                                        | Mengeninformation      | 496,7 (340)              | 266                      |                               |
|                                                                                                                     | 2                      | 177.317                  |                          |                               |
| Versorgung mit Schrittmacher oder Defibrillator                                                                     |                        |                          |                          |                               |
| Versorgung mit Herzschrittmacher oder Defibrillator                                                                 | Mengeninformation      | 147,7 (104)              | 66                       |                               |
|                                                                                                                     | 2                      | 46.541                   |                          |                               |
| Versorgung mit Herzschrittmacher <u>und</u> Defibrillator                                                           | Mengeninformation      | 50,1 (36)                | 18                       |                               |
|                                                                                                                     | 2                      | 12.365                   |                          |                               |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungs-wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>    |

## Erkrankungen des Nervensystems und Schlaganfall

### Bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhaut

|                                                                         |                   |          |   |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---|--|
| Bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhäute als Hauptdiagnose | Mengeninformation | 34,7 (6) | 5 |  |
|                                                                         | 2                 | 8.991    |   |  |

### Todesfälle bei allen Formen des Schlaganfalls

|                                           |                  |                    |          |       |
|-------------------------------------------|------------------|--------------------|----------|-------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Schlaganfall | < Erwartungswert | 9,9%               | 16,4%    | 10,8% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre            | 1                | 10.243 von 103.310 | 9 von 55 |       |

### Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirninfarkt

|                                          |                  |                  |          |       |
|------------------------------------------|------------------|------------------|----------|-------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirninfarkt | < Erwartungswert | 7,3%             | 14,3%    | 11,1% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre           | 1 / 5            | 6.524 von 88.895 | 7 von 49 |       |

|                                                                                                          |             |                   |          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------|--|
| Anteil der Hirninfarkte mit medikamentöser Auflösung des Blutgerinnsels (Thrombolyse) ohne Zuverlegungen | Information | 18,3%             | 4,3%     |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                           | 1           | 15.042 von 82.056 | 2 von 46 |  |

|                                                                                                                           |                  |                  |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------|--|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirninfarkt mit medikamentöser Auflösung des Blutgerinnsels (Thrombolyse) ohne Zuverlegungen | Beobachtungswert | 6,7%             | n.a. |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                            | 1                | 1.004 von 15.042 | <4   |  |

|                                                                                                                        |             |                  |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|--|
| Anteil Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Hirninfarkt mit Entfernung des Blutgerinnsels durch Katheter (Thrombektomie) | Information | 10,2%            | 0,0%     |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                         | 1           | 9.128 von 89.875 | 0 von 49 |  |

|                                                                                    |                  |                  |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|--|
| davon Anteil der Hirninfarkte mit Lungenentzündung, die bei Aufnahme nicht bestand | Beobachtungswert | 6,3%             | 4,3%     |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                     | 1                | 5.557 von 87.601 | 2 von 47 |  |

|                                                                                               |                  |                 |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------|--|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirninfarkt mit Lungenentzündung, die bei Aufnahme nicht bestand | Beobachtungswert | 28,8%           | n.a. |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                | 1                | 1.602 von 5.557 | <4   |  |

|                                                          |                  |                  |         |  |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------|--|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirnblutung (intrazerebral) | Beobachtungswert | 28,5%            | 40,0%   |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                           | 1                | 3.077 von 10.795 | 2 von 5 |  |

|                                                           |                  |               |      |  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------|------|--|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirnblutung (subarachnoidal) | Beobachtungswert | 18,3%         | n.a. |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                            | 1                | 637 von 3.474 | <4   |  |

|                                                                 |        |                 |          |  |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------|--|
| Anteil nicht näher bezeichneter Schlaganfälle als Hauptdiagnose | <0,42% | 0,23%           | 0,0%     |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                  | 1      | 243 von 104.755 | 0 von 55 |  |

|                                                                         |                       |                |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------|--|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose TIA ohne Neubildungen und Kopfverletzungen | Beobachtungswert (SE) | 0,3159%        | 0,0%     |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                          | 1 / 4                 | 101 von 31.977 | 0 von 15 |  |

### Behandlung auf einer Stroke Unit

|                                                                                     |             |                   |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------|--|
| Anteil Hauptdiagnose Hirninfarkte mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung | Information | 75,2%             | 0,0%     |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                      | 1           | 67.568 von 89.875 | 0 von 49 |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                                                                                                           | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungs-wert |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                           | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>    |
| Anteil Hauptdiagnose TIA mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung                                                                                | Information            | 74,4%                    | 0,0%                     |                        |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                            | 1                      | 23.940 von 32.157        | 0 von 15                 |                        |
| Anteil mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung ohne Zuverlegungen (in Anlehnung an Schlaganfallregister) bei Hauptdiagnose Hirninfarkt oder TIA | Beobachtungswert       | 76,6%                    | 0,0%                     |                        |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                            | 1                      | 87.746 von 114.496       | 0 von 61                 |                        |
| Anteil mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung nur Zuverlegungen (in Anlehnung an Schlaganfallregister) bei Hauptdiagnose Hirninfarkt oder TIA  | Information            | 49,9%                    | n.a.                     |                        |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                            | 1                      | 3.762 von 7.536          | <4                       |                        |
| Epilepsie                                                                                                                                                 |                        |                          |                          |                        |
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Epilepsie                                                                                                              | Mengeninformation      | 114,4 (38)               | 24                       |                        |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                            | 2                      | 39.017                   |                          |                        |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |

Altersmedizin

Geriatrische Frührehabilitation

|                                                       |                   |             |     |  |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----|--|
| Behandlungsfälle mit geriatrischer Frührehabilitation | Mengeninformation | 483,6 (404) | 308 |  |
|                                                       | 2                 | 108.317     |     |  |

Mangelernährung bei Älteren

|                                                                                  |             |                      |              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|--|
| Anteil Behandlungsfälle mit erheblicher Mangelernährung und ohne Tumorerkrankung | Information | 0,94%                | 1,94%        |  |
| Alle Patient:innen >= 65 Jahre                                                   | 1           | 22.315 von 2.366.261 | 99 von 5.098 |  |

|                                                                                                                 |             |                |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------|--|
| Anteil Behandlungsfälle mit Sonden-/Infusionsernährung bei erheblicher Mangelernährung und ohne Tumorerkrankung | Information | 2,0%           | 0,0%     |  |
| Alle Patient:innen >= 65 Jahre                                                                                  | 1           | 448 von 22.315 | 0 von 99 |  |

Delir

|                                                                      |             |                      |              |  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|--|
| Anteil Behandlungsfälle mit aufgetretenem Delir an operierten Fällen | Information | 3,0%                 | 2,9%         |  |
| Alle Patient:innen >= 60 Jahre                                       | 1           | 38.725 von 1.271.087 | 65 von 2.277 |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungs-wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>    |

Lungenerkrankungen

Lungenentzündung (Pneumonie)

|                                                                                                     |                       |                    |            |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------|-------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung                                                       | < Erwartungswert      | 12,6%              | 11,3%      | 17,7% |
| alle Altersgruppen                                                                                  | 1                     | 16.990 von 134.678 | 23 von 204 |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung ohne Zuverlegung, Tumor, Mukoviszidose                | < Erwartungswert      | 11,7%              | 7,8%       | 15,1% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | 1                     | 10.916 von 93.320  | 13 von 166 |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung ohne Zuverlegung, Tumor, Mukoviszidose, COVID-19      | < Erwartungswert      | 10,2%              | 5,3%       | 14,1% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | 1 / 5                 | 7.579 von 74.468   | 7 von 133  | 0,37  |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung ohne Zuverlegung, Tumor, Mukoviszidose                | Beobachtungswert (SE) | 0,31%              | n.a.       |       |
| Alle Patient:innen 1 bis 19 Jahre                                                                   | 1 / 4                 | 36 von 11.775      | <4         |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung durch Aspiration von Nahrungsmitteln oder Mageninhalt | Beobachtungswert      | 28,8%              | 34,8%      |       |
|                                                                                                     | 1                     | 3.376 von 11.737   | 8 von 23   |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Bronchitis oder Bronchiolitis ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose | < Erwartungswert      | 2,2%               | 4,2%       | 3,1%  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | 1                     | 267 von 12.100     | 4 von 95   |       |

COPD (Chronisch obstruktive Lungenkrankheit)

|                                   |                  |                  |            |      |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------|------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose COPD | < Erwartungswert | 4,7%             | 5,9%       | 5,8% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre    | 1                | 2.996 von 63.883 | 11 von 187 | 1,02 |

Lungenkrebs

|                                                |                   |            |    |  |
|------------------------------------------------|-------------------|------------|----|--|
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Lungenkrebs | Mengeninformation | 186,2 (54) | 53 |  |
|                                                | 2                 | 64.042     |    |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

IQM Indikatoren

IQM  
Zielwert

[Quelle](#)

IQM  
Durchschnittswert

[Fallzahl](#)

Klinik  
Ist-Wert

[Fallzahl](#)

Klinik  
Erwartungs-  
wert

[SMR](#)

## Erkrankungen der Bauchorgane

### Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen (ohne Tumor)

|                                                                                          |                  |                   |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|--|
| Anteil laparoskopischer Operationen bei Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen     | >95,1%           | 95,8%             | 98,2%       |  |
|                                                                                          | 1                | 48.172 von 50.299 | 111 von 113 |  |
| Anteil Umsteiger auf offene Operationen bei Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen | Beobachtungswert | 2,5%              | 1,8%        |  |
|                                                                                          | 1                | 1.269 von 50.299  | 2 von 113   |  |
| Todesfälle bei Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen                              | <0,60% (SE)      | 0,4573%           | 0,0%        |  |
|                                                                                          | 1 / 4            | 230 von 50.299    | 0 von 113   |  |

### Operation von Leisten-, Schenkel- und Nabelbrüchen (Hernien)

|                                                                   |                  |                   |             |  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|--|
| Todesfälle bei Bruchoperationen ohne anteilige Darmentfernung     | <0,12% (SE)      | 0,1145%           | 0,0%        |  |
|                                                                   | 1 / 4            | 73 von 63.738     | 0 von 143   |  |
| Todesfälle bei Bruchoperationen mit anteiliger Darmentfernung     | Beobachtungswert | 2,1%              | 0,0%        |  |
|                                                                   | 1                | 146 von 6.843     | 0 von 10    |  |
| Anteil Behandlungsfälle mit Leistenbruchoperation mit Netzeinlage | Information      | 98,3%             | 97,5%       |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                    | 1                | 43.038 von 43.793 | 118 von 121 |  |

### Eingriffe an der Schilddrüse

|                                                                                      |                   |                |         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------|--|
| Behandlungsfälle mit operativer Entfernung der Schilddrüse                           | Mengeninformation | 60,5 (20)      | 7       |  |
|                                                                                      | 2                 | 17.109         |         |  |
| Behandlungsfälle mit operativer Entfernung der Schilddrüse bei Schilddrüsenkrebs     | Mengeninformation | 12,4 (5)       | n.a.    |  |
|                                                                                      | 2                 | 2.501          | <4      |  |
| Behandlungsfälle mit operativer Entfernung der Schilddrüse bei gutartiger Erkrankung | Mengeninformation | 49,8 (18)      | 5       |  |
|                                                                                      | 2                 | 13.655         |         |  |
| Anteil der Beatmungsfälle (> 24 Std.) nach Schilddrüseneingriff                      | Information (SE)  | 0,64%          | 0,0%    |  |
|                                                                                      | 1 / 4             | 103 von 16.146 | 0 von 7 |  |

### Große Operationen am Dick- und Enddarm (Kolon und Rektum)

|                                                                                     |                   |                  |          |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------|------|
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Dick-/Enddarmkrebs                               | Mengeninformation | 126,3 (86)       | 100      |      |
|                                                                                     | 2                 | 43.444           |          |      |
| Behandlungsfälle mit Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn                             | Mengeninformation | 97,8 (63)        | 53       |      |
|                                                                                     | 2                 | 36.971           |          |      |
| Todesfälle bei operativer Entfernung des Dick-/Enddarms                             | Beobachtungswert  | 7,7%             | 6,7%     |      |
|                                                                                     | 1                 | 2.714 von 35.313 | 3 von 45 |      |
| Todesfälle bei operativer Dickdarmentfernung bei Krebs ohne komplizierende Diagnose | < Erwartungswert  | 3,8%             | 5,9%     | 3,2% |
|                                                                                     | 1 / 5             | 330 von 8.624    | 1 von 17 | 1,83 |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                                                              | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert     |  |  | Klinik Ist-Wert  | Klinik Erwartungs-wert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--|--|------------------|------------------------|
|                                                                                                              | Quelle                 | Fallzahl                  |  |  | Fallzahl         | SMR                    |
|                                                                                                              |                        |                           |  |  |                  |                        |
| Todesfälle bei operativer Dickdarmentfernung bei Krebs mit komplizierender Diagnose                          | Beobachtungswert<br>1  | 11,6%<br>293 von 2.516    |  |  | n.a.<br><4       |                        |
| Todesfälle bei operativer Enddarmentfernung bei Krebs                                                        | <3,2%<br>1             | 2,6%<br>106 von 4.134     |  |  | 22,2%<br>2 von 9 |                        |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Divertikel ohne Abszess/Perforation                | <0,72% (SE)<br>1 / 4   | 0,7539%<br>14 von 1.857   |  |  | n.a.<br><4       |                        |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Divertikel mit Abszess/Perforation                 | Beobachtungswert<br>1  | 5,4%<br>251 von 4.675     |  |  | 0,0%<br>0 von 9  |                        |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Darmischämie                                       | Information<br>1       | 42,3%<br>856 von 2.022    |  |  | n.a.<br><4       |                        |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei anderen Diagnosen                                  | Information<br>1       | 8,5%<br>795 von 9.346     |  |  | 0,0%<br>0 von 4  |                        |
| Anteil operative Leberentfernung bei Entfernung des Dick-/Enddarms bei Dick- und Enddarmkrebs                | Information<br>1       | 4,2%<br>647 von 15.274    |  |  | 0,0%<br>0 von 28 |                        |
| Behandlungsfälle mit roboterassistiertem Eingriff bei Krebserkrankung des Darms                              | Information<br>1       | 14,6%<br>2.223 von 15.274 |  |  | 0,0%<br>0 von 28 |                        |
|                                                                                                              |                        |                           |  |  |                  |                        |
| Erkrankungen des Magens                                                                                      |                        |                           |  |  |                  |                        |
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Magenkrebs (mit und ohne Magenoperation)                                  | Mengeninformation<br>2 | 45,2 (26)<br>14.509       |  |  | 31               |                        |
| Todesfälle bei Geschwüren an Magen, Zwölffingerdarm oder Dünndarm als Hauptdiagnose (mit und ohne Operation) | Beobachtungswert<br>1  | 5,4%<br>991 von 18.467    |  |  | 3,3%<br>2 von 60 |                        |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |

Gefäßoperationen

Eingriffe an der Hauptschlagader (Aorta)

|                                             |             |               |      |  |
|---------------------------------------------|-------------|---------------|------|--|
| Todesfälle bei rupturiertem Aortenaneurysma | Information | 40,8%         | n.a. |  |
|                                             | 1           | 734 von 1.799 | <4   |  |

Eingriffe der Becken-/Bein-Arterien

|                                                          |             |                  |          |  |
|----------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|--|
| Todesfälle bei Operationen der Becken-/Beinarterien      | Information | 5,6%             | 3,1%     |  |
|                                                          | 1           | 1.553 von 27.545 | 1 von 32 |  |
| davon Todesfälle bei Schaufensterkrankheit (Claudicatio) | <0,33% (SE) | 0,2817%          | n.a.     |  |
|                                                          | 1 / 4       | 16 von 5.680     | <4       |  |
| davon Todesfälle bei Ruheschmerz                         | <2,3%       | 1,4%             | 0,0%     |  |
|                                                          | 1           | 27 von 1.973     | 0 von 5  |  |
| davon Todesfälle bei Ulzeration/Gangrän                  | <4,5%       | 3,9%             | 0,0%     |  |
|                                                          | 1           | 136 von 3.498    | 0 von 11 |  |

PTA (Perkutan transluminale Gefäßinterventionen)

|                                                                                       |                   |                  |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------|--|
| Todesfälle bei Wiedereröffnung eines verschlossenen Gefäßes mittels Ballonkatheter    | Beobachtungswert  | 2,9%             | 1,1%     |  |
|                                                                                       | 1                 | 1.684 von 57.653 | 1 von 91 |  |
| PTA Abdomen/Beinarterien mit arterieller Operation im gleichen stationären Aufenthalt | Mengeninformation | 47,6 (38)        | 4        |  |
|                                                                                       | 2                 | 9.810            |          |  |

Arteriovenöser Shunt

|                                     |                   |           |    |  |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|----|--|
| Anlegen eines arteriovenösen Shunts | Mengeninformation | 27,7 (17) | 36 |  |
|                                     | 2                 | 5.213     |    |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Bösartige Neubildungen der Brust und der weiblichen Geschlechtsorgane

|                                                                                             |                        |                      |    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----|--|
| Behandlungsfälle mit Krebserkrankung der Brust oder der Geschlechtsorgane als Hauptdiagnose | Mengeninformation<br>2 | 213,7 (72)<br>70.101 | 23 |  |
| Behandlungsfälle mit Eierstockkrebs als Hauptdiagnose                                       | Mengeninformation<br>2 | 30,3 (14)<br>8.765   | 4  |  |
| Behandlungsfälle mit Gebärmutterkrebs als Hauptdiagnose                                     | Mengeninformation<br>2 | 51,9 (29)<br>14.432  | 4  |  |
| Behandlungsfälle mit Brustkrebs als Hauptdiagnose                                           | Mengeninformation<br>2 | 135,1 (34)<br>43.095 | 13 |  |

Eingriffe an der Brust

|                        |                        |                       |    |  |
|------------------------|------------------------|-----------------------|----|--|
| Eingriffe an der Brust | Mengeninformation<br>2 | 168,0 (126)<br>38.463 | 24 |  |
|------------------------|------------------------|-----------------------|----|--|

Eingriffe am Beckenboden bei der Frau

|                                                                               |                        |                     |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------|--|
| Behandlungsfälle mit Beckenbodenoperationen mit und ohne plastische Operation | Mengeninformation<br>2 | 73,8 (54)<br>18.971 | n.a.<br><4 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------|--|

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

IQM Indikatoren

IQM  
Zielwert

[Quelle](#)

IQM  
Durchschnittswert

[Fallzahl](#)

Klinik  
Ist-Wert

[Fallzahl](#)

Klinik  
Erwartungs-  
wert

[SMR](#)

## Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe

### Bösartige Neubildungen des Bewegungsapparates

Behandlungsfälle mit bösartiger Neubildung an Knochen, Gelenkknorpel, peripheren Nerven, Retroperitoneum, Bindegewebe, Weichteilen

Mengeninformation

45,7 (5)

n.a.

2

14.026

<4

### Gelenkersatz (Endoprothetik)

Todesfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung

<0,13% (SE)

0,0843%

0,0%

1 / 4

49 von 58.126

0 von 137

Todesfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei hüftgelenksnahen Frakturen

Beobachtungswert

5,1%

3,7%

1

1.033 von 20.145

1 von 27

Todesfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei anderen Diagnosen

Beobachtungswert

5,5%

0,0%

1

351 von 6.336

0 von 7

Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung

Beobachtungswert

2,4%

0,7%

1

1.373 von 58.126

1 von 137

Todesfälle bei Wechsel eines Hüftgelenkersatzes ohne Fraktur oder Infektion

<1,42% (SE)

1,37%

n.a.

1 / 4

64 von 4.685

<4

Todesfälle bei Wechsel eines Hüftgelenkersatzes wegen Fraktur oder Infektion

Beobachtungswert

4,5%

n.a.

1

177 von 3.930

<4

Todesfälle bei Kniegelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung

<0,06% (SE)

0,044%

0,0%

1 / 4

26 von 59.081

0 von 201

Todesfälle bei Kniegelenkersatz (Erstimplantation) bei anderen Diagnosen

Beobachtungswert (SE)

0,3447%

0,0%

1 / 4

12 von 3.481

0 von 5

Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei Kniegelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung

Beobachtungswert

1,5%

1,0%

1

915 von 59.081

2 von 201

Todesfälle bei Wechsel eines Kniegelenk oder -teilersatzes ohne Fraktur oder Infektion

<0,20% (SE)

0,3709%

n.a.

1 / 4

18 von 4.853

<4

Todesfälle bei Wechsel eines Kniegelenkersatzes wegen Fraktur oder Infektion

Beobachtungswert

3,2%

n.a.

1

65 von 2.040

<4

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                                                                                                   | IQM Zielwert          | IQM Durchschnittswert |     |        | Klinik Ist-Wert |     |    | Klinik Erwartungs-<br>wert |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----|--------|-----------------|-----|----|----------------------------|
|                                                                                                                                                   | Quelle                | Fallzahl              |     |        | Fallzahl        |     |    | SMR                        |
| Todesfälle bei Hüft- oder Kniegelenkersatz bei Tumorerkrankung                                                                                    | Beobachtungswert      | 7,0%                  |     |        | 0,0%            |     |    |                            |
|                                                                                                                                                   | 1                     | 166                   | von | 2.359  | 0               | von | 5  |                            |
| Hüftgelenknahe Frakturen                                                                                                                          |                       |                       |     |        |                 |     |    |                            |
| Todesfälle nach operativer Versorgung einer Schenkelhalsfraktur als Hauptdiagnose                                                                 | < Erwartungswert      | 4,7%                  |     |        | 3,0%            |     |    | 3,6%                       |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                    | 1                     | 1.035                 | von | 22.251 | 1               | von | 33 | 0,85                       |
| Todesfälle nach Gelenkersatz bei Schenkelhalsfraktur als Hauptdiagnose                                                                            | Beobachtungswert      | 5,0%                  |     |        | 3,7%            |     |    |                            |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                    | 1                     | 995                   | von | 19.716 | 1               | von | 27 |                            |
| Todesfälle nach Osteosynthese (Verbindung der Knochenfragmente durch Platten, Schrauben oder Nägel) bei Schenkelhalsfraktur als Hauptdiagnose     | Beobachtungswert      | 1,6%                  |     |        | 0,0%            |     |    |                            |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                    | 1                     | 40                    | von | 2.535  | 0               | von | 6  |                            |
| Todesfälle nach operativer Versorgung einer pertrochantären Fraktur als Hauptdiagnose                                                             | < Erwartungswert      | 4,7%                  |     |        | 3,0%            |     |    | 4,4%                       |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                    | 1                     | 875                   | von | 18.558 | 1               | von | 33 | 0,68                       |
| Todesfälle nach Osteosynthese (Verbindung der Knochenfragmente durch Platten, Schrauben oder Nägel) bei pertrochantärer Fraktur als Hauptdiagnose | Beobachtungswert      | 4,6%                  |     |        | 3,0%            |     |    |                            |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                    | 1                     | 839                   | von | 18.159 | 1               | von | 33 |                            |
| Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark                                                                                                  |                       |                       |     |        |                 |     |    |                            |
| Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark (ohne lokale Schmerztherapie)                                                                    | Mengeninformation     | 331,5 (212)           |     |        | 28              |     |    |                            |
|                                                                                                                                                   | 2                     | 109.058               |     |        |                 |     |    |                            |
| Todesfälle bei alleiniger 'Entlastung' (Dekompression) der Wirbelsäule                                                                            | Beobachtungswert (SE) | 0,062%                |     |        | 0,0%            |     |    |                            |
|                                                                                                                                                   | 1 / 4                 | 14                    | von | 22.563 | 0               | von | 10 |                            |
| Todesfälle bei 'einfachen' Bandscheibenentfernungen                                                                                               | <0,03% (SE)           | 0,0067%               |     |        | 0,0%            |     |    |                            |
|                                                                                                                                                   | 1 / 4                 | 1                     | von | 14.848 | 0               | von | 17 |                            |
| Todesfälle bei anderen Operationen an der Wirbelsäule oder am Rückenmark                                                                          | Beobachtungswert      | 1,8%                  |     |        | n.a.            |     |    |                            |
|                                                                                                                                                   | 1                     | 374                   | von | 20.396 | <4              |     |    |                            |
| Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei 'einfachen' Bandscheibenentfernungen                                                        | Beobachtungswert (SE) | 0,5119%               |     |        | 0,0%            |     |    |                            |
|                                                                                                                                                   | 1 / 4                 | 76                    | von | 14.848 | 0               | von | 17 |                            |
| Lokale Schmerztherapie an der Wirbelsäule (ohne andere Wirbelsäulen- oder Rückenmarkoperation)                                                    | Mengeninformation     | 84,6 (32)             |     |        | 70              |     |    |                            |
|                                                                                                                                                   | 2                     | 27.056                |     |        |                 |     |    |                            |
| Behandlungsfälle mit Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen als Hauptdiagnose ohne Operation oder lokale Schmerztherapie                         | Mengeninformation     | 133,9 (115)           |     |        | 246             |     |    |                            |
|                                                                                                                                                   | 2                     | 49.963                |     |        |                 |     |    |                            |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                   | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                                                                   | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |
| Mehrfachverletzungen - Polytraumen                                |                        |                          |                          |                               |
| Mehrfachverletzungen (Polytraumen) im Sinne der<br>DRG-Definition | Mengeninformation      | 21,7 (8)                 | n.a.                     |                               |
|                                                                   | 2                      | 6.866                    | <4                       |                               |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

IQM Indikatoren

IQM  
Zielwert

[Quelle](#)

IQM  
Durchschnittswert

[Fallzahl](#)

Klinik  
Ist-Wert

[Fallzahl](#)

Klinik  
Erwartungs-  
wert

[SMR](#)

## Urologie

### Operationen der Niere

|                                                                                             |                                |                          |                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|--|
| Todesfälle bei Totalentfernung der Niere bei bösartiger Neubildung                          | <1,8%<br>1                     | 1,3%<br>42 von 3.208     | 0,0%<br>0 von 8   |  |
| Anteil laparoskopischer Operationen bei Totalentfernung der Niere bei bösartiger Neubildung | Information<br>1               | 46,5%<br>1.492 von 3.208 | 0,0%<br>0 von 8   |  |
| Todesfälle bei Teilentfernung der Niere bei bösartiger Neubildung                           | <0,35% (SE)<br>1 / 4           | 0,2894%<br>10 von 3.455  | 0,0%<br>0 von 6   |  |
| Anteil laparoskopischer Operationen bei Teilentfernung der Niere bei bösartiger Neubildung  | Information<br>1               | 59,3%<br>2.049 von 3.455 | 0,0%<br>0 von 6   |  |
| Anteil der Teilentfernungen der Niere bei bösartiger Neubildung                             | Information<br>1               | 51,9%<br>3.455 von 6.663 | 42,9%<br>6 von 14 |  |
| Todesfälle bei Totalentfernung der Niere bei anderer Diagnose                               | Beobachtungswert<br>1          | 3,7%<br>75 von 2.013     | 40,0%<br>2 von 5  |  |
| Todesfälle bei Teilentfernung der Niere bei anderer Diagnose                                | Beobachtungswert (SE)<br>1 / 4 | 0,1708%<br>2 von 1.171   | n.a.<br><4        |  |
| Behandlungsfälle mit roboterassistierter Nierenentfernung bei bösartiger Neubildung         | Information<br>1               | 38,3%<br>2.551 von 6.663 | 0,0%<br>0 von 14  |  |

### Harnblase

|                                                                                                       |                        |                           |                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|--|
| Behandlungsfälle mit Blasenkrebs als Hauptdiagnose                                                    | Mengeninformation<br>2 | 140,1 (54)<br>41.898      | 142               |  |
| Operationen an der Harnblase durch die Harnröhre                                                      | Mengeninformation<br>2 | 218,3 (208)<br>41.905     | 169               |  |
| Operationen an der Harnblase durch die Harnröhre bei Blasenkrebs                                      | Mengeninformation<br>2 | 171,5 (152)<br>29.666     | 119               |  |
| Operationen an der Harnblase durch die Harnröhre bei Blasenkrebs mit Einbringen von Chemotherapeutika | Beobachtungswert<br>1  | 17,9%<br>5.307 von 29.666 | 5,0%<br>6 von 119 |  |
| Todesfälle bei Entfernung der Harnblase                                                               | <4,8%<br>1             | 4,3%<br>125 von 2.882     | 0,0%<br>0 von 15  |  |
| Behandlungsfälle mit roboterassistierter Harnblasenentfernung                                         | Information<br>1       | 13,7%<br>468 von 3.417    | 0,0%<br>0 von 15  |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                                                                        | IQM Zielwert                   | IQM Durchschnittswert      | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungs-wert |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                                        | <a href="#">Quelle</a>         | <a href="#">Fallzahl</a>   | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>    |
| Prostata                                                                                                               |                                |                            |                          |                        |
| Todesfälle bei Operationen der Prostata durch die Harnröhre bei gutartigen Erkrankungen                                | <0,20% (SE)<br>1 / 4           | 0,1697%<br>41 von 24.167   | 0,0%<br>0 von 88         |                        |
| Todesfälle bei Operationen der Prostata durch die Harnröhre bei bösartigen Erkrankungen                                | Beobachtungswert (SE)<br>1 / 4 | 0,7599%<br>51 von 6.711    | 0,0%<br>0 von 31         |                        |
| Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei Behandlungsfällen mit Operation der Prostata durch die Harnröhre | Beobachtungswert<br>1          | 3,4%<br>1.041 von 30.878   | 3,4%<br>4 von 119        |                        |
| Behandlungsfälle mit Prostatakrebs als Hauptdiagnose                                                                   | Mengeninformation<br>2         | 109,0 (26)<br>34.228       | 122                      |                        |
| Todesfälle bei radikaler Prostataentfernung                                                                            | <0,16% (SE)<br>1 / 4           | 0,1957%<br>25 von 12.773   | 0,0%<br>0 von 13         |                        |
| Behandlungsfälle mit roboterassistierter Prostataentfernung                                                            | Information<br>1               | 75,7%<br>9.672 von 12.773  | 0,0%<br>0 von 13         |                        |
| Nierensteine                                                                                                           |                                |                            |                          |                        |
| Behandlungsfälle mit Nierensteinen als Hauptdiagnose                                                                   | Mengeninformation<br>2         | 205,6 (52)<br>69.911       | 278                      |                        |
| Anteil der Behandlungsfälle mit Intervention zur Steinentfernung bei Hauptdiagnose Nierensteine                        | Information<br>1               | 53,0%<br>37.084 von 69.911 | 56,5%<br>157 von 278     |                        |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                |                                           |                                                      |                                                |                                                      |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                | IQM<br>Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> | IQM<br>Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert<br><a href="#">SMR</a> |
| Hautkrankheiten                                                |                                           |                                                      |                                                |                                                      |
| Hautkrankheiten                                                |                                           |                                                      |                                                |                                                      |
| Behandlungsfälle mit Dermatitis und Ekzem als<br>Hauptdiagnose | Mengeninformation<br><br>2                | 33,9 (6)<br><br>10.779                               | 7                                              |                                                      |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

IQM Indikatoren

IQM  
Zielwert

[Quelle](#)

IQM  
Durchschnittswert

[Fallzahl](#)

Klinik  
Ist-Wert

[Fallzahl](#)

Klinik  
Erwartungs-  
wert

[SMR](#)

## Intensivmedizin

### Intensivmedizin

|                                                                                                                           |                       |                            |                    |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|---------------|
| Todesfälle bei Beatmung > 24 Stunden ohne Neugeborene                                                                     | Information<br>1      | 35,4%<br>30.990 von 87.630 | 26,0%<br>20 von 77 |               |
| Todesfälle bei Beatmung > 24 Stunden ohne Neugeborene und ohne COVID-19 Fälle                                             | <35,9%<br>1           | 34,8%<br>28.096 von 80.798 | 22,5%<br>16 von 71 |               |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger als Hauptdiagnose                                        | < Erwartungswert<br>1 | 33,3%<br>9.575 von 28.731  | 27,8%<br>10 von 36 | 33,7%<br>0,82 |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger als Hauptdiagnose mit Organkomplikation/Schock           | Beobachtungswert<br>1 | 35,5%<br>9.156 von 25.801  | 34,8%<br>8 von 23  |               |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger als Hauptdiagnose ohne Organkomplikation/Schock          | Beobachtungswert<br>1 | 14,3%<br>419 von 2.930     | 15,4%<br>2 von 13  |               |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger oder SIRS als Nebendiagnose                              | Beobachtungswert<br>1 | 37,4%<br>22.659 von 60.510 | 20,7%<br>17 von 82 |               |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger oder SIRS als Nebendiagnose mit Organkomplikation/Schock | Beobachtungswert<br>1 | 38,5%<br>22.214 von 57.675 | 25,0%<br>15 von 60 |               |
| Todesfälle bei generalisierter Entzündungsreaktion des gesamten Körpers ohne Organkomplikation (SIRS)                     | Information<br>1      | 7,2%<br>3.384 von 47.318   | 12,0%<br>3 von 25  |               |
| Anteil Todesfälle bei nicht-bakterieller Blutvergiftung (Sepsis)                                                          | Beobachtungswert<br>1 | 34,8%<br>155 von 446       | n.a.<br><4         |               |

### Angeborene Gerinnungsstörung und Bluttransfusion

|                                                                                                    |                        |                               |                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|
| Behandlungsfälle mit angeborenen Gerinnungsstörungen als Haupt- oder Nebendiagnose                 | Mengeninformation<br>2 | 28,9 (14)<br>10.632           | 9                     |  |
| davon operierte Behandlungsfälle mit angeborenen Gerinnungsstörungen als Haupt- oder Nebendiagnose | Mengeninformation<br>2 | 19,5 (9)<br>6.847             | n.a.<br><4            |  |
| Anteil operierter Behandlungsfälle mit Bluttransfusion                                             | Information<br>1       | 7,5%<br>175.709 von 2.336.953 | 5,5%<br>172 von 3.146 |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

|                 |  |                                                                         |                                                                                    |                                                                              |                                                                                     |
|-----------------|--|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| IQM Indikatoren |  | <div><div>IQM<br/>Zielwert</div><div><a href="#">Quelle</a></div></div> | <div><div>IQM<br/>Durchschnittswert</div><div><a href="#">Fallzahl</a></div></div> | <div><div>Klinik<br/>Ist-Wert</div><div><a href="#">Fallzahl</a></div></div> | <div><div>Klinik<br/>Erwartungs-<br/>wert</div><div><a href="#">SMR</a></div></div> |
| Obduktionen     |  |                                                                         |                                                                                    |                                                                              |                                                                                     |
| Obduktionsrate  |  | <div><div>Information</div><div>1</div></div>                           | <div><div>0,84%</div><div>1.310 von 156.425</div></div>                            | <div><div>0,0%</div><div>0 von 302</div></div>                               |                                                                                     |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                         | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                                         | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |
| Palliativmedizin                        |                        |                          |                          |                               |
| Palliativmedizin                        |                        |                          |                          |                               |
| Palliativmedizinische Komplexbehandlung | Mengeninformation<br>2 | 208,7 (132)<br>43.404    | 264                      |                               |

# Leseanleitung zu den IQM-Indikatoren

## Lesebeispiel

Beim nachfolgenden Indikator „Todesfälle bei Hauptdiagnose Transmuraler Herzinfarkt (Alle Patient:innen >= 20 Jahre)“ liegt der Wert der durchschnittlichen Krankenhaussterblichkeit in der Bundesrepublik bei 12,2 % (Quelle: Statistisches Bundesamt). Daraus ergibt sich rechnerisch für das Beispielkrankenhaus aufgrund des Alters und Geschlechts der Patientinnen und Patienten des ausgewerteten Jahres eine zu erwartende Krankenhaussterblichkeit von 10,8 % **4** als Erwartungswert. Ziel der IQM-Mitgliedskrankenhäuser ist es, im Ergebnis unter diesem Erwartungswert zu liegen **1**. Der für das Beispielkrankenhaus tatsächlich gemessene Ist-Wert betrug in diesem Jahr 19,4 % **3** und lag damit über dem Krankenhaus-Erwartungswert für den Qualitätsindikator „Todesfälle bei Hauptdiagnose Transmuraler Herzinfarkt“. Der Durchschnittswert aller IQM-Mitgliedskrankenhäuser liegt bei diesem Indikator bei 11,0 % **2**.

|                                                                                                                          |                        |                          |                          |                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--|
| G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025                                                                                     |                        | Jahr:                    |                          | 2024                   |  |
| Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der <a href="#">Präambel</a> |                        |                          |                          |                        |  |
| IQM Indikatoren                                                                                                          | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungs-wert |  |
|                                                                                                                          | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>    |  |
| Herzerkrankungen                                                                                                         | 1                      | 2                        | 3                        | 4                      |  |
| Herzinfarkt                                                                                                              |                        |                          |                          |                        |  |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Transmuraler Herzinfarkt                                                                    | < Erwartungswert       | 11,0%                    | 19,4%                    | 10,8%                  |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                           | 1                      | 2.623 von 23.934         | 99 von 511               |                        |  |

## Die Indikatoren

Die von IQM verwendeten German/Swiss Inpatient Quality Indicators (G-IQI/CH-IQI) sind so ausgewählt, dass sie sowohl häufige und wichtige Krankheitsbilder als auch wichtige Verfahren abbilden. Alle Indikatoren werden aus den Routinedaten des Krankenhauses ohne zusätzliche Dokumentation abgeleitet, wodurch kein weiterer Dokumentationsaufwand entsteht.

## Was wird gemessen?

Hierbei unterscheiden wir **absolute Mengeninformationen** von **relativen Mengeninformationen**, bei denen z.B. ein Anteil bestimmter Operationsverfahren ausgewiesen wird.

Wesentlicher Messwert ist die **Sterblichkeit** bei verschiedenen Krankheitsbildern, auch wenn wir uns bewusst sind, dass Sterblichkeit im Krankenhaus auch bei bester Medizin nicht vermeidbar ist. Deswegen vergleichen wir die Sterblichkeit, wo verfügbar, mit bundesdurchschnittlichen Werten. Diese werden entweder aus Daten des **Statistischen Bundesamtes** oder aus Daten des **Forschungsdatenzentrums der statistischen Ämter des Bundes und der Länder** berechnet. Mit den Daten des Statistischen Bundesamtes wird eine **Risikogewichtung** für das **Alter** und das **Geschlecht** der Behandelten ermöglicht. Krankenhäuser mit einem hohen Anteil sehr alter Patient:innen weisen in der Regel eine andere Sterblichkeit auf als solche mit vergleichsweise jungen Patientinnen und Patienten.

Als wesentliche Orientierungshilfe zur Einordnung der Ergebnisse dient der **Erwartungswert**, da er besagt, welche Sterblichkeit bei einer Patientengruppe gleicher Alters- und Geschlechtsverteilung im Bundesdurchschnitt zu erwarten wäre. Für einige Indikatoren (G-IQI/CH-IQI 01.1, 02.1, 09.3, 14.26 und 21.311) kommen erweiterte **differenzierte Risikomodelle** zum Einsatz. Diese berücksichtigen zusätzlich Begleiterkrankungen, Erkrankungsschwere und den Zuverlegungsstatus. Insofern ergeben sich für unterschiedliche Krankenhäuser individuelle Erwartungswerte, da Unterschiede in der Alters- und Geschlechtszusammensetzung der Behandelten bestehen. Ziel der IQM-Krankenhäuser ist es, „bessere“ als die erwarteten Werte zu erreichen.

Die Beziehung zwischen erwarteter Sterblichkeit und dem tatsächlichen Wert des Krankenhauses nennt man wissenschaftlich **„standardized mortality rate“** oder kurz **„SMR“**. Liegt diese Quote unter 1, dann ist die tatsächliche Sterblichkeit im Krankenhaus für den gemessenen Indikator geringer als die zu erwartende, liegt sie über 1, ist die Sterblichkeit höher als eigentlich erwartet. Ein solcher Wert ist lediglich bei den Indikatoren errechenbar, bei denen die zu erwartende Sterblichkeit aus den Daten des Statistischen Bundesamtes ermittelt werden kann.

Liegen keine alters- und geschlechtsgewichteten Werte für einen Indikator vor, kann auch kein Erwartungswert errechnet werden. Wir sind uns ebenso bewusst, dass die Sterblichkeit bei manchen Indikatoren ein ausgesprochen seltenes Ereignis ist und nicht als alleiniger Nachweis der medizinischen Qualität gelten darf. Die im „low risk“-Bereich gemessene Sterblichkeit ermöglicht in nachfolgenden Analysen dieser seltenen Ereignisse, wichtige Verbesserungspotentiale zu heben.

## Glossar zur Ergebnisveröffentlichung

Hier finden Sie eine Erläuterung der wichtigsten Begriffe und Kennzahlen, die in dieser Veröffentlichung verwendet werden:

### **IQM Zielwert - Quellen (Herkunft und Berechnung):**

Die Referenz- bzw. Zielwerte für die Indikatoren basieren auf verschiedenen Quellen. Die jeweilige Quelle wird durch eine Nummer unter dem „IQM Zielwert“ angegeben:

- 1: Forschungsdatenzentren der statistischen Ämter des Bundes und der Länder, DRG-Statistik 2022. Eigene Berechnungen. Diese Daten bilden auch die Grundlage für die Berechnung der klinikindividuellen Erwartungswerte, standardisiert nach Alter und Geschlecht.
- 2: Gleiche Quelle wie 1; jedoch speziell für Mengenindikatoren: Die mittlere Fallzahl (Median in Klammern) für IQM-Mitgliedskrankenhäuser mit entsprechender Leistung im Jahr 2022.
- 3: Der Zielwert ist hier nicht identisch mit dem Bundeswert und wurde entnommen aus: Kaiser D (2007) Mindestmengen aus thoraxchirurgischer Sicht. Chirurg, 78(11): 1012-1017
- 4: Sentinel Event: Kennzahl wurde im G-IQI Kolloquium als Sentinel Event eingestuft (seltene Ereignisse, die man nicht erwartet). Weitere Infos dazu in den G-IQI FAQs.
- 5: Differenziertes Risikomodell zur Berechnung der Erwartungswerte; basierend auf Daten der Forschungsdatenzentren der statistischen Ämter des Bundes und der Länder, DRG-Statistik 2022. Eigene Berechnungen.
- 6: Empfehlung aus der Beschlussfassung der G-IQI Version 5.5 im Kolloquium II durch den wissenschaftlichen Beirat des IQM e.V.

### **IQM-Durchschnittswert - Fallzahl:**

Der IQM-Durchschnittswert gibt die mittleren Ergebnisse über alle Patient:innen an, die im Beobachtungszeitraum in IQM-Mitgliedskrankenhäusern (D) behandelt wurden. Mengenangaben werden als Durchschnittswert und zusätzlich in Klammern als Median dargestellt.

### **Krankenhaus Erwartungswert:**

Dieser Wert beschreibt die erwartete Sterblichkeit der Patient:innen, basierend auf Alters- und Geschlechtsverteilung. Er wird nur für Indikatoren berechnet, bei denen Vergleichszahlen des Bundesdurchschnitts vorliegen.

Für einige Indikatoren (G-IQI/CH-IQI 01.1, 02.1, 09.3, 14.26 und 21.311) kommen erweiterte differenzierte Risikomodelle zum Einsatz. Diese berücksichtigen zusätzlich Begleiterkrankungen, Erkrankungsschwere und den Zuverlegungsstatus.

### **SMR:**

Die SMR (standardized mortality ratio) ist das Verhältnis von beobachteter Sterblichkeit (Durchschnittswert) und dem Erwartungswert.

### **Hinweis zum Indikator „Obduktionsrate“:**

Die Anzahl der ausgewiesenen Obduktionen kann unvollständig sein, da nicht alle Krankenhaus-Dokumentationssysteme eine vollständige bzw. nachträgliche Kodierung nach Entlassung (bzw. Tod) unterstützen.

### **Fallzahlen und Mindestgrenzen:**

Ergebnisse einer Kennzahl werden nur dann im Detail dargestellt, wenn mindestens 4 oder mehr Fälle im Nenner aufgetreten sind. Bei Unterschreiten dieser Grenze wird dann die Angabe „<4“ ausgewiesen.

Ergebnisse, die sich auf sehr seltene Ereignisse beziehen, werden mit bis zu 4 Nachkommastellen ausgewiesen, um bei hohen Grundgesamtheiten ein Ergebnis zwischen 0 und 1 ausweisen zu können.