

### Ergebnisdarstellung und Nutzung der Indikatoren-Sets

Im Sinne einer transparenten und fundierten Qualitätsanalyse möchten wir Ihnen mit dieser Veröffentlichung eine strukturierte Orientierungshilfe zu den dargestellten Ergebnissen bieten. Die Nutzung der Indikatoren-Sets ermöglicht eine präzise Einordnung der Resultate und unterstützt eine gezielte Analyse.

Mit der Versionierung auf G-IQI/CH-IQI 5.5 wurden einige Indikatoren als **Sentinel Events** klassifiziert, um besonders kritische Ereignisse klar zu kennzeichnen. Diese sind in der Spalte „IQM Zielwert“ mit dem Zusatz „SE“ ausgewiesen.

Zudem wurde die **Bezeichnung der G-IQI/CH-IQI systematisch überarbeitet**, um eine bessere Verständlichkeit und Konsistenz zu gewährleisten. Die Anpassungen dieser Terminologie spiegeln sich auch in diesem Dokument wider.

Wir laden Sie ein, die Ergebnisse unter diesen Aspekten zu betrachten und für Ihre weiterführenden Analysen zu nutzen.

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

## **IQM Indikatoren**

[Qualitätsbericht](#)

[QSR-Mehrjahresergebnisse](#)

### **Inhaltsverzeichnis**

|                                                    |                      |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Herzerkrankungen                                   | <a href="#">2024</a> | <a href="#">2023</a> |
| Erkrankungen des Nervensystems und Schlaganfall    | <a href="#">2024</a> | <a href="#">2023</a> |
| Altersmedizin                                      | <a href="#">2024</a> | <a href="#">2023</a> |
| Lungenerkrankungen                                 | <a href="#">2024</a> | <a href="#">2023</a> |
| Erkrankungen der Bauchorgane                       | <a href="#">2024</a> | <a href="#">2023</a> |
| Gefäßoperationen                                   | <a href="#">2024</a> | <a href="#">2023</a> |
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe                   | <a href="#">2024</a> | <a href="#">2023</a> |
| Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe | <a href="#">2024</a> | <a href="#">2023</a> |
| Urologie                                           | <a href="#">2024</a> | <a href="#">2023</a> |
| Hautkrankheiten                                    | <a href="#">2024</a> | <a href="#">2023</a> |
| Intensivmedizin                                    | <a href="#">2024</a> | <a href="#">2023</a> |
| Palliativmedizin                                   | <a href="#">2024</a> | <a href="#">2023</a> |

[Lesehilfe](#)



IQM

INITIATIVE

QUALITÄTSMEDIZIN

Qualitätsergebnisse

Klinikum Konstanz

zurück zum Inhaltsverzeichnis

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

Präambel

| IQM Indikatoren                                              | IQM Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> | IQM Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik Erwartungs-<br>wert<br><a href="#">SMR</a> |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Linksherzkatheterfälle bei Kindern und Jugendlichen          | Mengeninformation                      | 28,7 (2)                                          | 57                                          |                                                   |
| Alle Patient:innen < 20 Jahre                                | 2                                      | 3.191                                             |                                             |                                                   |
| Herzrhythmusstörungen                                        |                                        |                                                   |                                             |                                                   |
| Behandlungsfälle mit Herzrhythmusstörungen als Hauptdiagnose | Mengeninformation                      | 515,0 (355)                                       | 272                                         |                                                   |
|                                                              | 2                                      | 186.941                                           |                                             |                                                   |
| Versorgung mit Schrittmacher oder Defibrillator              |                                        |                                                   |                                             |                                                   |
| Versorgung mit Herzschrittmacher oder Defibrillator          | Mengeninformation                      | 152,3 (107)                                       | 55                                          |                                                   |
|                                                              | 2                                      | 47.357                                            |                                             |                                                   |
| Versorgung mit Herzschrittmacher <u>und</u> Defibrillator    | Mengeninformation                      | 48,7 (36)                                         | 15                                          |                                                   |
|                                                              | 2                                      | 12.283                                            |                                             |                                                   |
| Ablative Therapie                                            |                                        |                                                   |                                             |                                                   |
| Behandlungsfälle mit kathetergestützter ablativer Therapie   | Mengeninformation                      | 334,8 (248)                                       | 57                                          |                                                   |
|                                                              | 2                                      | 58.250                                            |                                             |                                                   |
| Eingriffe am Herzen                                          |                                        |                                                   |                                             |                                                   |
| Behandlungsfälle mit Eingriff am Herzen                      | Mengeninformation                      | 264,9 (13)                                        | 4                                           |                                                   |
|                                                              | 2                                      | 52.711                                            |                                             |                                                   |
| davon andere Eingriffe am Herzen                             | Mengeninformation                      | 57,8 (3)                                          | 4                                           |                                                   |
|                                                              | 2                                      | 9.658                                             |                                             |                                                   |



G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

Präambel

| IQM Indikatoren                                                                                                                                           | IQM<br>Zielwert   | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                           | Quelle            | Fallzahl                 | Fallzahl           | SMR                           |
| Anteil Hauptdiagnose TIA mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung                                                                                | Information       | 76,7%                    | 29,7%              |                               |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                            | 1                 | 26.855 von 34.991        | 11 von 37          |                               |
| Anteil mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung ohne Zuverlegungen (in Anlehnung an Schlaganfallregister) bei Hauptdiagnose Hirninfarkt oder TIA | Beobachtungswert  | 78,2%                    | 40,4%              |                               |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                            | 1                 | 94.089 von 120.268       | 74 von 183         |                               |
| Anteil mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung nur Zuverlegungen (in Anlehnung an Schlaganfallregister) bei Hauptdiagnose Hirninfarkt oder TIA  | Information       | 49,9%                    | 37,5%              |                               |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                            | 1                 | 4.027 von 8.065          | 3 von 8            |                               |
| Epilepsie                                                                                                                                                 |                   |                          |                    |                               |
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Epilepsie                                                                                                              | Mengeninformation | 116,8 (44)               | 42                 |                               |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                            | 2                 | 39.466                   |                    |                               |
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Epilepsie                                                                                                              | Mengeninformation | 51,5 (18)                | 36                 |                               |
| Alle Patient:innen < 20 Jahre                                                                                                                             | 2                 | 10.510                   |                    |                               |
| Multiple Sklerose                                                                                                                                         |                   |                          |                    |                               |
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Multiple Sklerose                                                                                                      | Mengeninformation | 35,4 (22)                | n.a.               |                               |
|                                                                                                                                                           | 2                 | 8.345                    | <4                 |                               |



INITIATIVE

QUALITÄTSMEDIZIN

Qualitätsergebnisse

Klinikum Konstanz

[zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

Präambel

| IQM Indikatoren                                                                                                 | <div>IQM Zielwert</div> <div>Quelle</div> | <div>IQM Durchschnittswert</div> <div>Fallzahl</div> | <div>Klinik Ist-Wert</div> <div>Fallzahl</div> | <div>Klinik Erwartungs-wert</div> <div>SMR</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Altersmedizin                                                                                                   |                                           |                                                      |                                                |                                                  |
| Geriatrische Frührehabilitation                                                                                 |                                           |                                                      |                                                |                                                  |
| Behandlungsfälle mit geriatrischer Frührehabilitation                                                           | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div> | <div>532,4 (447)</div> <div>122.983</div>            | <div>275</div>                                 |                                                  |
| Mangelernährung bei Älteren                                                                                     |                                           |                                                      |                                                |                                                  |
| Anteil Behandlungsfälle mit erheblicher Mangelernährung und ohne Tumorerkrankung                                | <div>Information</div> <div>1</div>       | <div>0,88%</div> <div>21.895 von 2.486.668</div>     | <div>0,8%</div> <div>53 von 6.625</div>        |                                                  |
| Alle Patient:innen >= 65 Jahre                                                                                  |                                           |                                                      |                                                |                                                  |
| Anteil Behandlungsfälle mit Sonden-/Infusionsernährung bei erheblicher Mangelernährung und ohne Tumorerkrankung | <div>Information</div> <div>1</div>       | <div>1,8%</div> <div>387 von 21.895</div>            | <div>1,9%</div> <div>1 von 53</div>            |                                                  |
| Alle Patient:innen >= 65 Jahre                                                                                  |                                           |                                                      |                                                |                                                  |
| Delir                                                                                                           |                                           |                                                      |                                                |                                                  |
| Anteil Behandlungsfälle mit aufgetretenem Delir an operierten Fällen                                            | <div>Information</div> <div>1</div>       | <div>3,0%</div> <div>40.039 von 1.327.814</div>      | <div>1,7%</div> <div>78 von 4.666</div>        |                                                  |
| Alle Patient:innen >= 60 Jahre                                                                                  |                                           |                                                      |                                                |                                                  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

Präambel

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                 | Quelle          | Fallzahl                 | Fallzahl           | SMR                           |

## Lungenerkrankungen

### Lungenentzündung (Pneumonie)

|                                                                                                                                             |                                |                             |                     |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung<br>alle Altersgruppen                                                                         | < Erwartungswert<br>1          | 10,0%<br>16.307 von 162.332 | 10,0%<br>46 von 462 | 15,3%         |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung<br>ohne Zuverlegung, Tumor, Mukoviszidose<br>Alle Patient:innen >= 20 Jahre                   | < Erwartungswert<br>1          | 9,2%<br>10.353 von 112.464  | 7,9%<br>25 von 318  | 14,6%         |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung<br>ohne Zuverlegung, Tumor, Mukoviszidose, COVID-19<br>Alle Patient:innen >= 20 Jahre         | < Erwartungswert<br>1 / 5      | 8,6%<br>8.604 von 100.621   | 6,8%<br>20 von 295  | 11,4%<br>0,60 |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung<br>ohne Zuverlegung, Tumor, Mukoviszidose<br>Alle Patient:innen 1 bis 19 Jahre                | Beobachtungswert (SE)<br>1 / 4 | 0,15%<br>28 von 18.387      | 0,0%<br>0 von 50    |               |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung<br>durch Aspiration von Nahrungsmitteln oder Mageninhalt                                      | Beobachtungswert<br>1          | 27,8%<br>3.446 von 12.409   | 31,9%<br>15 von 47  |               |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Bronchitis oder<br>Bronchiolitis ohne Zuverlegungen, Tumor,<br>Mukoviszidose<br>Alle Patient:innen >= 20 Jahre | < Erwartungswert<br>1          | 1,9%<br>244 von 13.186      | 0,0%<br>0 von 14    | 2,1%          |

### COPD (Chronisch obstruktive Lungenerkrankung)

|                                                                     |                       |                          |                   |              |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose COPD<br>Alle Patient:innen >= 20 Jahre | < Erwartungswert<br>1 | 4,4%<br>2.907 von 66.452 | 2,9%<br>4 von 137 | 5,3%<br>0,55 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|--------------|

### Lungenkrebs

|                                                |                        |                      |     |  |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----|--|
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Lungenkrebs | Mengeninformation<br>2 | 191,4 (52)<br>66.602 | 221 |  |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----|--|

### Operationen an der Lunge

|                                                                                                      |                       |                        |                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|--|
| Todesfälle bei größeren operativen Entfernungen<br>von Lunge/Bronchien                               | Beobachtungswert<br>1 | 2,5%<br>329 von 13.179 | 1,9%<br>1 von 53 |  |
| Todesfälle bei operativer Teilentfernung eines<br>Lungenflügels bei Lungenkrebs                      | <2,0%<br>1            | 1,9%<br>116 von 6.079  | 0,0%<br>0 von 14 |  |
| Anteil der operativen Entfernungen eines<br>Lungenflügels bei Lungenkrebsbehandlungsfällen           | <20%<br>1 / 3         | 3,1%<br>195 von 6.274  | 0,0%<br>0 von 14 |  |
| Anteil der broncho-/angioplastischen Entfernungen<br>eines Lungenflügels bei Lungenkrebsbehandlungen | Beobachtungswert<br>1 | 7,1%<br>433 von 6.079  | 0,0%<br>0 von 14 |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

Präambel

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert<br><br><a href="#">Quelle</a> | IQM<br>Durchschnittswert<br><br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Ist-Wert<br><br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert<br><br><a href="#">SMR</a> |
|-----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|-----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

Erkrankungen der Bauchorgane

Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen (ohne Tumor)

|                                                                                          |                           |                                |                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|--|
| Anteil laparoskopischer Operationen bei Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen     | >95,1%<br><br>1           | 96,0%<br><br>50.963 von 53.069 | 99,5%<br><br>208 von 209 |  |
| Anteil Umsteiger auf offene Operationen bei Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen | Beobachtungswert<br><br>1 | 2,4%<br><br>1.269 von 53.069   | 0,0%<br><br>0 von 209    |  |
| Todesfälle bei Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen                              | <0,60% (SE)<br><br>1 / 4  | 0,4541%<br><br>241 von 53.069  | 0,0%<br><br>0 von 209    |  |

Operation von Leisten-, Schenkel- und Nabelbrüchen (Hernien)

|                                                                                                     |                           |                                |                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|--|
| Todesfälle bei Bruchoperationen ohne anteilige Darmentfernung                                       | <0,12% (SE)<br><br>1 / 4  | 0,1007%<br><br>71 von 70.497   | 0,0%<br><br>0 von 394    |  |
| Todesfälle bei Bruchoperationen mit anteiliger Darmentfernung                                       | Beobachtungswert<br><br>1 | 2,3%<br><br>144 von 6.140      | 0,0%<br><br>0 von 10     |  |
| Anteil Behandlungsfälle mit Leistenbruchoperation mit Netzeinlage<br>Alle Patient:innen < 20 Jahre  | Information<br><br>1      | 9,7%<br><br>290 von 2.984      | 36,8%<br><br>7 von 19    |  |
| Anteil Behandlungsfälle mit Leistenbruchoperation mit Netzeinlage<br>Alle Patient:innen >= 20 Jahre | Information<br><br>1      | 98,2%<br><br>44.462 von 45.266 | 99,6%<br><br>261 von 262 |  |

Eingriffe an der Schilddrüse

|                                                                                      |                               |                            |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|--|
| Behandlungsfälle mit operativer Entfernung der Schilddrüse                           | Mengeninformation<br><br>2    | 61,6 (24)<br><br>17.239    | 85                   |  |
| Behandlungsfälle mit operativer Entfernung der Schilddrüse bei Schilddrüsenkrebs     | Mengeninformation<br><br>2    | 13,2 (6)<br><br>2.639      | 13                   |  |
| Behandlungsfälle mit operativer Entfernung der Schilddrüse bei gutartiger Erkrankung | Mengeninformation<br><br>2    | 51,6 (22)<br><br>13.633    | 72                   |  |
| Anteil der Beatmungsfälle (> 24 Std.) nach Schilddrüseneingriff                      | Information (SE)<br><br>1 / 4 | 0,55%<br><br>89 von 16.263 | 0,0%<br><br>0 von 85 |  |
| Behandlungsfälle mit Radiojodtherapie                                                | Mengeninformation<br><br>2    | 271,1 (217)<br><br>10.302  | 294                  |  |

Große Operationen am Dick- und Enddarm (Kolon und Rektum)

|                                                                                     |                               |                              |                       |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Dick-/Enddarmkrebs                               | Mengeninformation<br><br>2    | 129,6 (84)<br><br>44.981     | 130                   |                  |
| Behandlungsfälle mit Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn                             | Mengeninformation<br><br>2    | 99,5 (62)<br><br>38.009      | 95                    |                  |
| Todesfälle bei operativer Entfernung des Dick-/Enddarms                             | Beobachtungswert<br><br>1     | 7,4%<br><br>2.681 von 36.051 | 4,3%<br><br>6 von 140 |                  |
| Todesfälle bei operativer Dickdarmentfernung bei Krebs ohne komplizierende Diagnose | < Erwartungswert<br><br>1 / 5 | 3,3%<br><br>293 von 8.881    | 2,6%<br><br>1 von 38  | 3,5%<br><br>0,75 |



G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

|                 |                             |                                      |                                |                                            |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| IQM Indikatoren | <div>IQM<br/>Zielwert</div> | <div>IQM<br/>Durchschnittswert</div> | <div>Klinik<br/>Ist-Wert</div> | <div>Klinik<br/>Erwartungs-<br/>wert</div> |
|                 | <a href="#">Quelle</a>      | <a href="#">Fallzahl</a>             | <a href="#">Fallzahl</a>       | <a href="#">SMR</a>                        |

Eingriffe an der Bauchspeicheldrüse und der Leber

|                                                                          |                  |      |     |       |      |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----|-------|------|-----|---|
| Todesfälle bei Eingriffen an der Bauchspeicheldrüse ohne Transplantation | Beobachtungswert | 8,0% |     |       | n.a. |     |   |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                           | 1                | 404  | von | 5.025 | <4   |     |   |
| Todesfälle bei anatomischer Leberentfernung                              | Beobachtungswert | 5,7% |     |       | 0,0% |     |   |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                           | 1                | 158  | von | 2.777 | 0    | von | 7 |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

## Präambel

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |

## Gefäßoperationen

## Eingriffe an der Halsschlagader (Carotis)

|                                                                                   |        |       |           |      |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|------|--------|--|
| Todesfälle bei ausschließlich extrakranieller Operation der Halsschlagader        | <1,09% | 0,87% |           | 0,0% |        |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                    | 1      | 83    | von 9.541 | 0    | von 48 |  |
| Todesfälle bei Stent-Implantation in extrakranielle Abschnitte der Halsschlagader | <2,1%  | 2,1%  |           | 0,0% |        |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                    | 1      | 52    | von 2.446 | 0    | von 4  |  |

## Eingriffe an der Hauptschlagader (Aorta)

|                                                                                                |                        |                        |                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|--|
| Operation an der Hauptschlagader (Aorta)                                                       | Mengeninformation<br>2 | 56,2 (30)<br>10.571    | 11              |  |
| Operation an der Bauchaorta                                                                    | Mengeninformation<br>2 | 29,6 (24)<br>5.358     | 9               |  |
| Todesfälle bei offener Operation eines nicht rupturierten Bauchaortenaneurysmas                | <7,6%<br>1             | 5,6%<br>46 von 816     | n.a.<br><4      |  |
| Todesfälle bei endovaskulärer Stentimplantation eines nicht rupturierten Bauchaortenaneurysmas | <1,4%<br>1             | 1,3%<br>39 von 3.113   | 0,0%<br>0 von 6 |  |
| Todesfälle bei endovaskulärer Stentimplantation der Bauchaorta ohne Aneurysma                  | Beobachtungswert<br>1  | 6,0%<br>23 von 383     | n.a.<br><4      |  |
| Todesfälle bei rupturiertem Aortenaneurysma                                                    | Information<br>1       | 41,9%<br>801 von 1.911 | n.a.<br><4      |  |

## Eingriffe der Becken-/Bein-Arterien

|                                                          |             |                  |          |  |
|----------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|--|
| Todesfälle bei Operationen der Becken-/Beinarterien      | Information | 5,5%             | 3,7%     |  |
|                                                          | 1           | 1.525 von 27.921 | 3 von 82 |  |
| davon Todesfälle bei Schaufensterkrankheit (Claudicatio) | <0,33% (SE) | 0,301%           | 0,0%     |  |
|                                                          | 1 / 4       | 17 von 5.647     | 0 von 26 |  |
| davon Todesfälle bei Ruheschmerz                         | <2,3%       | 1,7%             | 16,7%    |  |
|                                                          | 1           | 38 von 2.179     | 1 von 6  |  |
| davon Todesfälle bei Ulzeration/Gangrän                  | <4,5%       | 3,5%             | 0,0%     |  |
|                                                          | 1           | 118 von 3.335    | 0 von 10 |  |

## PTA (Perkutan transluminale Gefäßinterventionen)

|                                                                                       |                   |                  |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------|--|
| Todesfälle bei Wiedereröffnung eines verschlossenen Gefäßes mittels Ballonkatheter    | Beobachtungswert  | 2,9%             | 2,6%     |  |
|                                                                                       | 1                 | 1.699 von 57.910 | 2 von 78 |  |
| PTA Abdomen/Beinarterien mit arterieller Operation im gleichen stationären Aufenthalt | Mengeninformation | 49,2 (41)        | 17       |  |
|                                                                                       | 2                 | 10.032           |          |  |

## Arteriovenöser Shunt

|                                     |                        |                    |    |  |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------|----|--|
| Anlegen eines arteriovenösen Shunts | Mengeninformation<br>2 | 28,9 (16)<br>5.344 | 20 |  |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------|----|--|



G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr: 2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                                                                    | IQM<br>Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> | IQM<br>Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert<br><a href="#">SMR</a> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Anteil der Behandlungsfälle mit vaginaler Gebärmutterentfernung durch Zerkleinerung der Gebärmutter                | Information                               | 5,2%                                                 | 0,0%                                           |                                                      |
| Alle Patient:innen > 14 Jahre                                                                                      | 1                                         | 291 von 5.546                                        | 0 von 18                                       |                                                      |
| Anteil der Behandlungsfälle mit laparoskopischer Gebärmutterentfernung ohne plastische Operation                   | Information                               | 65,0%                                                | 71,3%                                          |                                                      |
| Alle Patient:innen > 14 Jahre                                                                                      | 1                                         | 14.166 von 21.793                                    | 67 von 94                                      |                                                      |
| Anteil der Behandlungsfälle mit laparoskopischer Gebärmutterentfernung durch Zerkleinerung der Gebärmutter         | Information                               | 27,3%                                                | 4,5%                                           |                                                      |
|                                                                                                                    | 1                                         | 3.872 von 14.166                                     | 3 von 67                                       |                                                      |
| Anteil der Behandlungsfälle mit Eierstock- und Gebärmutterentfernung bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose | Information                               | 5,5%                                                 | 4,3%                                           |                                                      |
| Alle Patient:innen > 14 und < 50 Jahre                                                                             | 1                                         | 391 von 7.162                                        | 1 von 23                                       |                                                      |
| Anteil der Behandlungsfälle mit Eierstock- und Gebärmutterentfernung bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose | Information                               | 33,7%                                                | 60,5%                                          |                                                      |
| Alle Patient:innen >= 50 Jahre                                                                                     | 1                                         | 2.811 von 8.334                                      | 23 von 38                                      |                                                      |

Bösartige Neubildungen der Brust und der weiblichen Geschlechtsorgane

|                                                                                             |                       |              |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|--|
| Behandlungsfälle mit Krebserkrankung der Brust oder der Geschlechtsorgane als Hauptdiagnose | Mengeninformation     | 209,8 (60)   | 318      |  |
|                                                                                             | 2                     | 71.973       |          |  |
| Behandlungsfälle mit Eierstockkrebs als Hauptdiagnose                                       | Mengeninformation     | 31,1 (12)    | 40       |  |
|                                                                                             | 2                     | 9.486        |          |  |
| Todesfälle nach Eierstockentfernung bei Eierstockkrebs                                      | Beobachtungswert      | 1,3%         | 6,3%     |  |
|                                                                                             | 1                     | 35 von 2.649 | 1 von 16 |  |
| Behandlungsfälle mit Gebärmutterkrebs als Hauptdiagnose                                     | Mengeninformation     | 52,3 (29)    | 58       |  |
|                                                                                             | 2                     | 14.604       |          |  |
| Todesfälle nach Gebärmutterentfernung bei Gebärmutterkrebs                                  | Beobachtungswert (SE) | 0,51%        | 0,0%     |  |
|                                                                                             | 1 / 4                 | 29 von 5.680 | 0 von 30 |  |
| Behandlungsfälle mit Brustkrebs als Hauptdiagnose                                           | Mengeninformation     | 133,9 (26)   | 217      |  |
|                                                                                             | 2                     | 44.064       |          |  |

Eingriffe an der Brust

|                                                    |                   |                   |             |  |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|
| Eingriffe an der Brust                             | Mengeninformation | 187,6 (150)       | 200         |  |
|                                                    | 2                 | 39.772            |             |  |
| Operationen der Brust bei Brustkrebs               | Mengeninformation | 167,7 (148)       | 165         |  |
|                                                    | 2                 | 28.682            |             |  |
| Anteil brusterhaltender Operationen bei Brustkrebs | Information       | 71,9%             | 64,2%       |  |
|                                                    | 1                 | 20.621 von 28.682 | 106 von 165 |  |

Eingriffe am Beckenboden bei der Frau

|                                                                               |                   |           |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----|--|
| Behandlungsfälle mit Beckenbodenoperationen mit und ohne plastische Operation | Mengeninformation | 78,5 (62) | 38 |  |
|                                                                               | 2                 | 20.182    |    |  |



G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

Präambel

| IQM Indikatoren                                                                                                                                   | <div><div>IQM<br/>Zielwert</div><div>Quelle</div></div> | <div><div>IQM<br/>Durchschnittswert</div><div>Fallzahl</div></div> | <div><div>Klinik<br/>Ist-Wert</div><div>Fallzahl</div></div> | <div><div>Klinik<br/>Erwartungs-<br/>wert</div><div>SMR</div></div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                   |                                                         |                                                                    |                                                              |                                                                     |
| Todesfälle bei Hüft- oder Kniegelenkersatz bei Tumorerkrankung                                                                                    | <div>Beobachtungswert</div> <div>1</div>                | <div>6,1%</div> <div>150 von 2.456</div>                           | <div>9,5%</div> <div>2 von 21</div>                          |                                                                     |
| Hüftgelenknahe Frakturen                                                                                                                          |                                                         |                                                                    |                                                              |                                                                     |
| Todesfälle nach operativer Versorgung einer Schenkelhalsfraktur als Hauptdiagnose                                                                 | <div>&lt; Erwartungswert</div> <div>1</div>             | <div>4,3%</div> <div>984 von 22.984</div>                          | <div>3,2%</div> <div>3 von 94</div>                          | <div>4,9%</div>                                                     |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                    |                                                         |                                                                    |                                                              | <div>0,65</div>                                                     |
| Todesfälle nach Gelenkersatz bei Schenkelhalsfraktur als Hauptdiagnose                                                                            | <div>Beobachtungswert</div> <div>1</div>                | <div>4,7%</div> <div>961 von 20.474</div>                          | <div>2,4%</div> <div>2 von 83</div>                          |                                                                     |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                    |                                                         |                                                                    |                                                              |                                                                     |
| Todesfälle nach Osteosynthese (Verbindung der Knochenfragmente durch Platten, Schrauben oder Nägel) bei Schenkelhalsfraktur als Hauptdiagnose     | <div>Beobachtungswert</div> <div>1</div>                | <div>0,9%</div> <div>23 von 2.510</div>                            | <div>9,1%</div> <div>1 von 11</div>                          |                                                                     |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                    |                                                         |                                                                    |                                                              |                                                                     |
| Todesfälle nach operativer Versorgung einer pertrochantären Fraktur als Hauptdiagnose                                                             | <div>&lt; Erwartungswert</div> <div>1</div>             | <div>4,6%</div> <div>873 von 19.033</div>                          | <div>5,1%</div> <div>4 von 79</div>                          | <div>6,0%</div>                                                     |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                    |                                                         |                                                                    |                                                              | <div>0,85</div>                                                     |
| Todesfälle nach Gelenkersatz bei pertrochantärer Fraktur als Hauptdiagnose                                                                        | <div>Beobachtungswert</div> <div>1</div>                | <div>5,4%</div> <div>21 von 388</div>                              | <div>0,0%</div> <div>0 von 6</div>                           |                                                                     |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                    |                                                         |                                                                    |                                                              |                                                                     |
| Todesfälle nach Osteosynthese (Verbindung der Knochenfragmente durch Platten, Schrauben oder Nägel) bei pertrochantärer Fraktur als Hauptdiagnose | <div>Beobachtungswert</div> <div>1</div>                | <div>4,6%</div> <div>852 von 18.645</div>                          | <div>5,5%</div> <div>4 von 73</div>                          |                                                                     |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                    |                                                         |                                                                    |                                                              |                                                                     |
| Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark                                                                                                  |                                                         |                                                                    |                                                              |                                                                     |
| Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark (ohne lokale Schmerztherapie)                                                                    | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div>               | <div>341,5 (227)</div> <div>115.097</div>                          | <div>98</div>                                                |                                                                     |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder Wirbelkörper-Ersatz bei Tumor (inkl. komplexe Rekonstruktionen)                                      | <div>Beobachtungswert</div> <div>1</div>                | <div>7,7%</div> <div>265 von 3.455</div>                           | <div>0,0%</div> <div>0 von 6</div>                           |                                                                     |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder Wirbelkörper-Ersatz bei Trauma (inkl. komplexe Rekonstruktionen, Rückenmarkoperation)                | <div>Beobachtungswert</div> <div>1</div>                | <div>3,5%</div> <div>505 von 14.334</div>                          | <div>0,0%</div> <div>0 von 27</div>                          |                                                                     |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Operation bei Entzündung der Bandscheibe oder des Rückenmarks                                                         | <div>Beobachtungswert</div> <div>1</div>                | <div>7,5%</div> <div>198 von 2.624</div>                           | <div>0,0%</div> <div>0 von 4</div>                           |                                                                     |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder 1 Wirbelkörper-Ersatz (ohne Tumor, Trauma oder kompl. Rekonstruktionen)                              | <div>Beobachtungswert (SE)</div> <div>1 / 4</div>       | <div>0,0739%</div> <div>10 von 13.530</div>                        | <div>0,0%</div> <div>0 von 4</div>                           |                                                                     |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder 2 Wirbelkörper-Ersatz (ohne Tumor, Trauma oder kompl. Rekonstruktionen)                              | <div>Beobachtungswert (SE)</div> <div>1 / 4</div>       | <div>0,2279%</div> <div>16 von 7.022</div>                         | <div>n.a.</div> <div>&lt;4</div>                             |                                                                     |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder 3 oder mehr Wirbelkörper-Ersatz (ohne Tumor, Trauma oder kompl. Rekonstruktionen)                    | <div>Beobachtungswert (SE)</div> <div>1 / 4</div>       | <div>0,6394%</div> <div>36 von 5.630</div>                         | <div>n.a.</div> <div>&lt;4</div>                             |                                                                     |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

Präambel

| IQM Indikatoren                                                                                                                      | IQM Zielwert                   | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert    | Klinik Erwartungs-wert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
|                                                                                                                                      | Quelle                         | Fallzahl                 | Fallzahl           | SMR                    |
| Todesfälle bei alleiniger 'Entlastung' (Dekompression) der Wirbelsäule                                                               | Beobachtungswert (SE)<br>1 / 4 | 0,1044%<br>25 von 23.952 | n.a.<br><4         |                        |
| Todesfälle bei 'einfachen' Bandscheibenentfernungen                                                                                  | <0,03% (SE)<br>1 / 4           | 0,0253%<br>4 von 15.826  | n.a.<br><4         |                        |
| Todesfälle bei Vertebro-/Kyphoplastie (ohne Tumor, Trauma, kompl. Rekonstruktion, Versteifung, WK-Ersatz oder Bandscheibeneingriffe) | <0,53% (SE)<br>1 / 4           | 0,3634%<br>24 von 6.605  | 3,125%<br>1 von 32 |                        |
| Todesfälle bei anderen Operationen an der Wirbelsäule oder am Rückenmark                                                             | Beobachtungswert<br>1          | 1,9%<br>410 von 21.255   | 5,0%<br>1 von 20   |                        |
| Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei 'einfachen' Bandscheibenentfernungen                                           | Beobachtungswert (SE)<br>1 / 4 | 0,4234%<br>67 von 15.826 | n.a.<br><4         |                        |
| Lokale Schmerztherapie an der Wirbelsäule (ohne andere Wirbelsäulen- oder Rückenmarkoperation)                                       | Mengeninformation<br>2         | 87,1 (38)<br>27.869      | 11                 |                        |
| Behandlungsfälle mit Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen als Hauptdiagnose ohne Operation oder lokale Schmerztherapie            | Mengeninformation<br>2         | 142,4 (118)<br>53.541    | 67                 |                        |
| Operationen am Bewegungsapparat inkl. Endoprothetik                                                                                  |                                |                          |                    |                        |
| Gelenkersatz am Schulter-/ Ellenbogengelenk                                                                                          | Mengeninformation<br>2         | 37,0 (27)<br>12.498      | 34                 |                        |
| Mehrfachverletzungen - Polytraumen                                                                                                   |                                |                          |                    |                        |
| Mehrfachverletzungen (Polytraumen) im Sinne der DRG-Definition                                                                       | Mengeninformation<br>2         | 21,7 (8)<br>6.970        | 12                 |                        |



Qualitätsergebnisse

Klinikum Konstanz

[zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                                                 | <div> <div>IQM<br/>Zielwert</div> <div><a href="#">Quelle</a></div> </div> | <div> <div>IQM<br/>Durchschnittswert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> </div> | <div> <div>Klinik<br/>Ist-Wert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> </div> | <div> <div>Klinik<br/>Erwartungs-<br/>wert</div> <div><a href="#">SMR</a></div> </div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Urologie                                                                                        |                                                                            |                                                                                       |                                                                                 |                                                                                        |
| Harnblase                                                                                       |                                                                            |                                                                                       |                                                                                 |                                                                                        |
| Behandlungsfälle mit Blasenkrebs als Hauptdiagnose                                              | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div>                                  | <div>133,5 (34)</div> <div>41.519</div>                                               | <div>5</div>                                                                    |                                                                                        |
| Prostata                                                                                        |                                                                            |                                                                                       |                                                                                 |                                                                                        |
| Behandlungsfälle mit Prostatakrebs als Hauptdiagnose                                            | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div>                                  | <div>113,4 (20)</div> <div>36.416</div>                                               | <div>81</div>                                                                   |                                                                                        |
| Nierensteine                                                                                    |                                                                            |                                                                                       |                                                                                 |                                                                                        |
| Behandlungsfälle mit Nierensteinen als Hauptdiagnose                                            | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div>                                  | <div>209,5 (50)</div> <div>71.430</div>                                               | <div>6</div>                                                                    |                                                                                        |
| Anteil der Behandlungsfälle mit Intervention zur Steinentfernung bei Hauptdiagnose Nierensteine | <div>Information</div> <div>1</div>                                        | <div>51,5%</div> <div>36.814 von 71.430</div>                                         | <div>0,0%</div> <div>0 von 6</div>                                              |                                                                                        |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

|                 |                             |                                      |                                |                                            |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| IQM Indikatoren | <div>IQM<br/>Zielwert</div> | <div>IQM<br/>Durchschnittswert</div> | <div>Klinik<br/>Ist-Wert</div> | <div>Klinik<br/>Erwartungs-<br/>wert</div> |
|                 | <a href="#">Quelle</a>      | <a href="#">Fallzahl</a>             | <a href="#">Fallzahl</a>       | <a href="#">SMR</a>                        |

## Hautkrankheiten

### Hautkrankheiten

|                                                             |                                           |                                       |               |  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--|
| Behandlungsfälle mit Melanom als Hauptdiagnose              | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div> | <div>47,2 (4)</div> <div>11.840</div> | <div>8</div>  |  |
| Behandlungsfälle mit Dermatitis und Ekzem als Hauptdiagnose | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div> | <div>34,3 (6)</div> <div>11.214</div> | <div>13</div> |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

Präambel

| IQM Indikatoren                                                                                                           | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert         | Klinik Ist-Wert       | Klinik Erwartungs-wert |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                                                                                           | Quelle                 | Fallzahl                      | Fallzahl              | SMR                    |
| Intensivmedizin                                                                                                           |                        |                               |                       |                        |
| Intensivmedizin                                                                                                           |                        |                               |                       |                        |
| Todesfälle bei Beatmung > 24 Stunden ohne Neugeborene                                                                     | Information<br>1       | 34,8%<br>30.431 von 87.437    | 36,7%<br>36 von 98    |                        |
| ECLS/ECMO - Herz- / Herz-Lungenunterstützung                                                                              | Mengeninformation<br>2 | 34,7 (10)<br>2.883            | n.a.<br><4            |                        |
| Todesfälle bei Beatmung > 24 Stunden ohne Neugeborene und ohne COVID-19 Fälle                                             | <35,9%<br>1            | 34,5%<br>28.853 von 83.547    | 36,5%<br>35 von 96    |                        |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger als Hauptdiagnose                                        | < Erwartungswert<br>1  | 30,5%<br>9.492 von 31.083     | 42,9%<br>21 von 49    | 34,7%<br>1,23          |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger als Hauptdiagnose mit Organkomplikation/Schock           | Beobachtungswert<br>1  | 32,3%<br>9.080 von 28.152     | 42,9%<br>18 von 42    |                        |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger als Hauptdiagnose ohne Organkomplikation/Schock          | Beobachtungswert<br>1  | 14,1%<br>412 von 2.931        | 42,9%<br>3 von 7      |                        |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger oder SIRS als Nebendiagnose                              | Beobachtungswert<br>1  | 35,5%<br>22.689 von 63.903    | 46,6%<br>41 von 88    |                        |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger oder SIRS als Nebendiagnose mit Organkomplikation/Schock | Beobachtungswert<br>1  | 36,3%<br>22.225 von 61.292    | 46,6%<br>41 von 88    |                        |
| Todesfälle bei generalisierter Entzündungsreaktion des gesamten Körpers ohne Organkomplikation (SIRS)                     | Information<br>1       | 6,4%<br>3.837 von 60.049      | 17,2%<br>65 von 378   |                        |
| Anteil Todesfälle bei nicht-bakterieller Blutvergiftung (Sepsis)                                                          | Beobachtungswert<br>1  | 31,1%<br>148 von 476          | 50,0%<br>2 von 4      |                        |
| Angeborene Gerinnungsstörung und Bluttransfusion                                                                          |                        |                               |                       |                        |
| Behandlungsfälle mit angeborenen Gerinnungsstörungen als Haupt- oder Nebendiagnose                                        | Mengeninformation<br>2 | 30,1 (14)<br>11.108           | 16                    |                        |
| davon operierte Behandlungsfälle mit angeborenen Gerinnungsstörungen als Haupt- oder Nebendiagnose                        | Mengeninformation<br>2 | 20,3 (9)<br>7.080             | 13                    |                        |
| Anteil operierter Behandlungsfälle mit Bluttransfusion                                                                    | Information<br>1       | 7,5%<br>180.424 von 2.407.413 | 5,8%<br>475 von 8.210 |                        |
| Obduktionen                                                                                                               |                        |                               |                       |                        |
| Obduktionsrate                                                                                                            | Information<br>1       | 0,79%<br>1.241 von 156.378    | 0,0%<br>0 von 392     |                        |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                         | IQM                    |                          |                          |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|                                         | Zielwert               | Durchschnittswert        | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungs-wert |
|                                         | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>    |
| Palliativmedizin                        |                        |                          |                          |                        |
| Palliativmedizin                        |                        |                          |                          |                        |
| Palliativmedizinische Komplexbehandlung | Mengeninformation<br>2 | 223,5 (139)<br>47.612    | 283                      |                        |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr: 2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

Präambel

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert | IQM Durchschnittswert | Klinik Ist-Wert | Klinik Erwartungs-wert |
|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------|------------------------|
|                 | Quelle       | Fallzahl              | Fallzahl        | SMR                    |

## Herzerkrankungen

### Herzinfarkt

|                                                                      |                  |                   |            |       |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------|-------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Herzinfarkt                             | < Erwartungswert | 7,5%              | 10,3%      | 8,8%  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | 1 / 5            | 5.337 von 70.837  | 13 von 126 | 1,18  |
| Anteil der Herzinfarkte mit Linksherzkatheter                        | Information      | 85,8%             | 77,0%      |       |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | 1                | 60.786 von 70.837 | 97 von 126 |       |
| Todesfälle bei Direktaufnahme ohne Verlegung                         | Beobachtungswert | 7,4%              | 10,5%      |       |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | 1                | 4.746 von 64.041  | 13 von 124 |       |
| Anteil transmuraler Herzinfarkte (STEMI)                             | Information      | 33,7%             | 31,0%      |       |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | 1                | 23.848 von 70.760 | 39 von 126 |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Transmuraler Herzinfarkt                | < Erwartungswert | 11,6%             | 23,1%      | 13,5% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | 1                | 2.761 von 23.848  | 9 von 39   |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Nicht-transmuraler Herzinfarkt (NSTEMI) | < Erwartungswert | 5,1%              | 2,4%       | 6,9%  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | 1                | 2.361 von 46.320  | 2 von 85   |       |
| Todesfälle bei Nebendiagnose Herzinfarkt                             | Beobachtungswert | 17,8%             | 17,9%      |       |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | 1                | 3.670 von 20.570  | 5 von 28   |       |

### Herzinsuffizienz

|                                                                                                     |                  |                    |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------|------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Herzinsuffizienz                                                       | < Erwartungswert | 8,2%               | 14,0%      | 7,4% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | 1 / 5            | 13.117 von 160.876 | 39 von 279 | 1,88 |
| Anteil Behandlungsfälle mit Beschwerden bei Linksherzinsuffizienz bereits im Ruhezustand (NYHA IV)  | Information      | 46,7%              | 55,4%      |      |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | 1                | 50.732 von 108.703 | 72 von 130 |      |
| Anteil Behandlungsfälle mit Beschwerden bei Rechtsherzinsuffizienz bereits im Ruhezustand (NYHA IV) | Information      | 5,7%               | 5,4%       |      |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | 1                | 2.812 von 49.475   | 8 von 147  |      |

### Linksherzkatheter

|                                                                                                                                                                                    |                   |                    |            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------|------|
| Anzahl aller Linksherzkatheter zur Koronaragnostik                                                                                                                                 | Mengeninformation | 853 (778)          | 265        |      |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                                                     | 2                 | 269.548            |            |      |
| Todesfälle mit Linksherzkatheter bei Herzinfarkt ohne Zuverlegungen oder Herz-Kreislauf-Stillstand vor Krankenhaus-Aufnahme und ohne Herzoperation                                 | < Erwartungswert  | 4,6%               | 4,3%       | 5,1% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                                                     | 1                 | 2.501 von 54.395   | 4 von 92   | 0,85 |
| Todesfälle bei diagnostischem Linksherzkatheter ohne Hauptdiagnose Herzinfarkt, ohne Zuverlegungen oder Herz-Kreislauf-Stillstand vor Krankenhaus-Aufnahme und ohne Herzoperation  | < Erwartungswert  | 1,1%               | 0,0%       | 1,2% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                                                     | 1                 | 1.265 von 117.048  | 0 von 106  | 0,00 |
| Todesfälle bei therapeutischem Linksherzkatheter ohne Hauptdiagnose Herzinfarkt, ohne Zuverlegungen oder Herz-Kreislauf-Stillstand vor Krankenhaus-Aufnahme und ohne Herzoperation | < Erwartungswert  | 1,3%               | 0,0%       | 1,4% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                                                     | 1                 | 973 von 73.982     | 0 von 52   |      |
| Anteil der Behandlungen mit therapeutischem Linksherzkatheter ohne Hauptdiagnose Herzinfarkt und ohne Herzoperation                                                                | Information       | 38,5%              | 31,7%      |      |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                                                     | 1                 | 75.910 von 197.238 | 53 von 167 |      |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                              | IQM<br>Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> | IQM<br>Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert<br><a href="#">SMR</a> |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                              |                                           |                                                      |                                                |                                                      |
| Linksherzkatheterfälle bei Kindern und Jugendlichen          | Mengeninformation                         | 27,7 (2)                                             | 58                                             |                                                      |
| Alle Patient:innen < 20 Jahre                                | 2                                         | 3.181                                                |                                                |                                                      |
| Herzrhythmusstörungen                                        |                                           |                                                      |                                                |                                                      |
| Behandlungsfälle mit Herzrhythmusstörungen als Hauptdiagnose | Mengeninformation                         | 496,7 (340)                                          | 282                                            |                                                      |
|                                                              | 2                                         | 177.317                                              |                                                |                                                      |
| Versorgung mit Schrittmacher oder Defibrillator              |                                           |                                                      |                                                |                                                      |
| Versorgung mit Herzschrittmacher oder Defibrillator          | Mengeninformation                         | 147,7 (104)                                          | 59                                             |                                                      |
|                                                              | 2                                         | 46.541                                               |                                                |                                                      |
| Versorgung mit Herzschrittmacher <u>und</u> Defibrillator    | Mengeninformation                         | 50,1 (36)                                            | 16                                             |                                                      |
|                                                              | 2                                         | 12.365                                               |                                                |                                                      |
| Ablative Therapie                                            |                                           |                                                      |                                                |                                                      |
| Behandlungsfälle mit kathetergestützter ablativer Therapie   | Mengeninformation                         | 299,1 (208)                                          | 58                                             |                                                      |
|                                                              | 2                                         | 51.750                                               |                                                |                                                      |
| Eingriffe am Herzen                                          |                                           |                                                      |                                                |                                                      |
| Behandlungsfälle mit Eingriff am Herzen                      | Mengeninformation                         | 263,2 (13)                                           | 4                                              |                                                      |
|                                                              | 2                                         | 50.796                                               |                                                |                                                      |
| davon andere Eingriffe am Herzen                             | Mengeninformation                         | 58,3 (3)                                             | 4                                              |                                                      |
|                                                              | 2                                         | 9.098                                                |                                                |                                                      |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr: 2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |

## Erkrankungen des Nervensystems und Schlaganfall

### Bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhaut

|                                                                         |                   |          |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------|--|
| Bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhäute als Hauptdiagnose | Mengeninformation | 34,7 (6) | n.a. |  |
|                                                                         | 2                 | 8.991    | <4   |  |

### Todesfälle bei allen Formen des Schlaganfalls

|                                           |                  |                    |            |       |
|-------------------------------------------|------------------|--------------------|------------|-------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Schlaganfall | < Erwartungswert | 9,9%               | 12,1%      | 10,8% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre            | 1                | 10.243 von 103.310 | 13 von 107 |       |

### Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirninfarkt

|                                          |                  |                  |          |      |
|------------------------------------------|------------------|------------------|----------|------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirninfarkt | < Erwartungswert | 7,3%             | 10,6%    | 8,7% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre           | 1 / 5            | 6.524 von 88.895 | 9 von 85 |      |

|                                                                                                          |             |                   |           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------|--|
| Anteil der Hirninfarkte mit medikamentöser Auflösung des Blutgerinnsels (Thrombolyse) ohne Zuverlegungen | Information | 18,3%             | 22,8%     |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                           | 1           | 15.042 von 82.056 | 18 von 79 |  |

|                                                                                                                           |                  |                  |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|--|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirninfarkt mit medikamentöser Auflösung des Blutgerinnsels (Thrombolyse) ohne Zuverlegungen | Beobachtungswert | 6,7%             | 16,7%    |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                            | 1                | 1.004 von 15.042 | 3 von 18 |  |

|                                                                                                                        |             |                  |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|--|
| Anteil Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Hirninfarkt mit Entfernung des Blutgerinnsels durch Katheter (Thrombektomie) | Information | 10,2%            | 0,0%     |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                         | 1           | 9.128 von 89.875 | 0 von 87 |  |

|                                                                                    |                  |                  |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|--|
| davon Anteil der Hirninfarkte mit Lungenentzündung, die bei Aufnahme nicht bestand | Beobachtungswert | 6,3%             | 7,0%     |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                     | 1                | 5.557 von 87.601 | 6 von 86 |  |

|                                                                                               |                  |                 |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------|--|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirninfarkt mit Lungenentzündung, die bei Aufnahme nicht bestand | Beobachtungswert | 28,8%           | 16,7%   |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                | 1                | 1.602 von 5.557 | 1 von 6 |  |

|                                                          |                  |                  |          |  |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|--|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirnblutung (intrazerebral) | Beobachtungswert | 28,5%            | 15,8%    |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                           | 1                | 3.077 von 10.795 | 3 von 19 |  |

|                                                           |                  |               |      |  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------|------|--|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirnblutung (subarachnoidal) | Beobachtungswert | 18,3%         | n.a. |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                            | 1                | 637 von 3.474 | <4   |  |

|                                                                 |        |                 |           |  |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------|--|
| Anteil nicht näher bezeichneter Schlaganfälle als Hauptdiagnose | <0,42% | 0,23%           | 0,92%     |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                  | 1      | 243 von 104.755 | 1 von 109 |  |

|                                                                        |                  |            |      |  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------|--|
| Todesfälle bei nicht näher bezeichnetem Schlaganfall als Hauptdiagnose | Beobachtungswert | 11,5%      | n.a. |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                         | 1                | 28 von 243 | <4   |  |

|                                                                         |                       |                |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------|--|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose TIA ohne Neubildungen und Kopfverletzungen | Beobachtungswert (SE) | 0,3159%        | 0,0%     |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                          | 1 / 4                 | 101 von 31.977 | 0 von 18 |  |

### Behandlung auf einer Stroke Unit

|                                                                    |                   |             |    |  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----|--|
| Behandlungsfälle mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung | Mengeninformation | 495,5 (486) | 75 |  |
|                                                                    | 2                 | 102.072     |    |  |

|                                                                                     |             |                   |           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------|--|
| Anteil Hauptdiagnose Hirninfarkte mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung | Information | 75,2%             | 63,2%     |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                      | 1           | 67.568 von 89.875 | 55 von 87 |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                                                                                                           | <div>IQM<br/>Zielwert</div> <div>Quelle</div> | <div>IQM<br/>Durchschnittswert</div> <div>Fallzahl</div> | <div>Klinik<br/>Ist-Wert</div> <div>Fallzahl</div> | <div>Klinik<br/>Erwartungs-<br/>wert</div> <div>SMR</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                           |                                               |                                                          |                                                    |                                                           |
| Anteil Hauptdiagnose TIA mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung                                                                                | Information                                   | 74,4%                                                    | 42,1%                                              |                                                           |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                            | 1                                             | 23.940 von 32.157                                        | 8 von 19                                           |                                                           |
| Anteil mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung ohne Zuverlegungen (in Anlehnung an Schlaganfallregister) bei Hauptdiagnose Hirninfarkt oder TIA | Beobachtungswert                              | 76,6%                                                    | 61,0%                                              |                                                           |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                            | 1                                             | 87.746 von 114.496                                       | 61 von 100                                         |                                                           |
| Anteil mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung nur Zuverlegungen (in Anlehnung an Schlaganfallregister) bei Hauptdiagnose Hirninfarkt oder TIA  | Information                                   | 49,9%                                                    | 33,3%                                              |                                                           |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                            | 1                                             | 3.762 von 7.536                                          | 2 von 6                                            |                                                           |
| Epilepsie                                                                                                                                                 |                                               |                                                          |                                                    |                                                           |
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Epilepsie                                                                                                              | Mengeninformation                             | 114,4 (38)                                               | 38                                                 |                                                           |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                            | 2                                             | 39.017                                                   |                                                    |                                                           |
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Epilepsie                                                                                                              | Mengeninformation                             | 48,8 (14)                                                | 45                                                 |                                                           |
| Alle Patient:innen < 20 Jahre                                                                                                                             | 2                                             | 10.050                                                   |                                                    |                                                           |
| Multiple Sklerose                                                                                                                                         |                                               |                                                          |                                                    |                                                           |
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Multiple Sklerose                                                                                                      | Mengeninformation                             | 39,3 (25)                                                | 4                                                  |                                                           |
|                                                                                                                                                           | 2                                             | 8.832                                                    |                                                    |                                                           |



INITIATIVE  
QUALITÄTSMEDIZIN

Qualitätsergebnisse  
Klinikum Konstanz

[zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

Präambel

| IQM Indikatoren                                                                                                 | <div>IQM<br/>Zielwert</div> <div>Quelle</div> | <div>IQM<br/>Durchschnittswert</div> <div>Fallzahl</div> | <div>Klinik<br/>Ist-Wert</div> <div>Fallzahl</div> | <div>Klinik<br/>Erwartungs-<br/>wert</div> <div>SMR</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Altersmedizin                                                                                                   |                                               |                                                          |                                                    |                                                           |
| Geriatrische Frührehabilitation                                                                                 |                                               |                                                          |                                                    |                                                           |
| Behandlungsfälle mit geriatrischer Frührehabilitation                                                           | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div>     | <div>483,6 (404)</div> <div>108.317</div>                | <div>185</div>                                     |                                                           |
| Mangelernährung bei Älteren                                                                                     |                                               |                                                          |                                                    |                                                           |
| Anteil Behandlungsfälle mit erheblicher Mangelernährung und ohne Tumorerkrankung                                | <div>Information</div> <div>1</div>           | <div>0,94%</div> <div>22.315 von 2.366.261</div>         | <div>0,75%</div> <div>47 von 6.259</div>           |                                                           |
| Alle Patient:innen >= 65 Jahre                                                                                  |                                               |                                                          |                                                    |                                                           |
| Anteil Behandlungsfälle mit Sonden-/Infusionsernährung bei erheblicher Mangelernährung und ohne Tumorerkrankung | <div>Information</div> <div>1</div>           | <div>2,0%</div> <div>448 von 22.315</div>                | <div>6,4%</div> <div>3 von 47</div>                |                                                           |
| Alle Patient:innen >= 65 Jahre                                                                                  |                                               |                                                          |                                                    |                                                           |
| Delir                                                                                                           |                                               |                                                          |                                                    |                                                           |
| Anteil Behandlungsfälle mit aufgetretenem Delir an operierten Fällen                                            | <div>Information</div> <div>1</div>           | <div>3,0%</div> <div>38.725 von 1.271.087</div>          | <div>1,8%</div> <div>84 von 4.554</div>            |                                                           |
| Alle Patient:innen >= 60 Jahre                                                                                  |                                               |                                                          |                                                    |                                                           |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr: 2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

Präambel

| IQM Indikatoren                                                                                     | IQM Zielwert          | IQM Durchschnittswert | Klinik Ist-Wert | Klinik Erwartungs-wert |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|
|                                                                                                     | Quelle                | Fallzahl              | Fallzahl        | SMR                    |
| Lungenerkrankungen                                                                                  |                       |                       |                 |                        |
| Lungenentzündung (Pneumonie)                                                                        |                       |                       |                 |                        |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung                                                       | < Erwartungswert      | 12,6%                 | 13,3%           | 15,2%                  |
| alle Altersgruppen                                                                                  | 1                     | 16.990 von 134.678    | 45 von 339      |                        |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung ohne Zuverlegung, Tumor, Mukoviszidose                | < Erwartungswert      | 11,7%                 | 9,5%            | 14,9%                  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | 1                     | 10.916 von 93.320     | 20 von 211      |                        |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung ohne Zuverlegung, Tumor, Mukoviszidose, COVID-19      | < Erwartungswert      | 10,2%                 | 7,7%            | 11,0%                  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | 1 / 5                 | 7.579 von 74.468      | 14 von 183      | 0,69                   |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung ohne Zuverlegung, Tumor, Mukoviszidose                | Beobachtungswert (SE) | 0,31%                 | 0,0%            |                        |
| Alle Patient:innen 1 bis 19 Jahre                                                                   | 1 / 4                 | 36 von 11.775         | 0 von 37        |                        |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung durch Aspiration von Nahrungsmitteln oder Mageninhalt | Beobachtungswert      | 28,8%                 | 45,9%           |                        |
|                                                                                                     | 1                     | 3.376 von 11.737      | 17 von 37       |                        |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Bronchitis oder Bronchiolitis ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose | < Erwartungswert      | 2,2%                  | 3,3%            | 3,3%                   |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | 1                     | 267 von 12.100        | 1 von 30        |                        |
| COPD (Chronisch obstruktive Lungenerkrankheit)                                                      |                       |                       |                 |                        |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose COPD                                                                   | < Erwartungswert      | 4,7%                  | 5,8%            | 5,7%                   |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | 1                     | 2.996 von 63.883      | 7 von 120       | 1,02                   |
| Lungenkrebs                                                                                         |                       |                       |                 |                        |
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Lungenkrebs                                                      | Mengeninformation     | 186,2 (54)            | 257             |                        |
|                                                                                                     | 2                     | 64.042                |                 |                        |
| Operationen an der Lunge                                                                            |                       |                       |                 |                        |
| Todesfälle bei größeren operativen Entfernungen von Lunge/Bronchien                                 | Beobachtungswert      | 2,5%                  | 0,0%            |                        |
|                                                                                                     | 1                     | 321 von 12.802        | 0 von 80        |                        |
| Todesfälle bei operativer Entfernung eines Lungenflügels bei Lungenkrebs                            | Beobachtungswert      | 8,3%                  | n.a.            |                        |
|                                                                                                     | 1                     | 16 von 192            | <4              |                        |
| Todesfälle bei operativer Teilentfernung eines Lungenflügels bei Lungenkrebs                        | <2,0%                 | 2,0%                  | 0,0%            |                        |
|                                                                                                     | 1                     | 116 von 5.867         | 0 von 38        |                        |
| Anteil der operativen Entfernungen eines Lungenflügels bei Lungenkrebsbehandlungsfällen             | <20%                  | 3,2%                  | 5,0%            |                        |
|                                                                                                     | 1 / 3                 | 192 von 6.059         | 2 von 40        |                        |
| Anteil der broncho-/angioplastischen Entfernungen eines Lungenflügels bei Lungenkrebsbehandlungen   | Beobachtungswert      | 7,2%                  | 0,0%            |                        |
|                                                                                                     | 1                     | 420 von 5.867         | 0 von 38        |                        |

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der
 [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungs-wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>    |

## Erkrankungen der Bauchorgane

### Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen (ohne Tumor)

|                                                                                          |                  |                   |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|--|
| Anteil laparoskopischer Operationen bei Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen     | >95,1%           | 95,8%             | 98,0%       |  |
|                                                                                          | 1                | 48.172 von 50.299 | 193 von 197 |  |
| Anteil Umsteiger auf offene Operationen bei Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen | Beobachtungswert | 2,5%              | 0,5%        |  |
|                                                                                          | 1                | 1.269 von 50.299  | 1 von 197   |  |
| Todesfälle bei Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen                              | <0,60% (SE)      | 0,4573%           | 0,0%        |  |
|                                                                                          | 1 / 4            | 230 von 50.299    | 0 von 197   |  |

### Operation von Leisten-, Schenkel- und Nabelbrüchen (Hernien)

|                                                                   |                  |                   |             |  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|--|
| Todesfälle bei Bruchoperationen ohne anteilige Darmentfernung     | <0,12% (SE)      | 0,1145%           | 0,0%        |  |
|                                                                   | 1 / 4            | 73 von 63.738     | 0 von 349   |  |
| Todesfälle bei Bruchoperationen mit anteiliger Darmentfernung     | Beobachtungswert | 2,1%              | 0,0%        |  |
|                                                                   | 1                | 146 von 6.843     | 0 von 7     |  |
| Anteil Behandlungsfälle mit Leistenbruchoperation mit Netzeinlage | Information      | 9,2%              | 4,3%        |  |
| Alle Patient:innen < 20 Jahre                                     | 1                | 205 von 2.223     | 1 von 23    |  |
| Anteil Behandlungsfälle mit Leistenbruchoperation mit Netzeinlage | Information      | 98,3%             | 100,0%      |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                    | 1                | 43.038 von 43.793 | 240 von 240 |  |

### Eingriffe an der Schilddrüse

|                                                                                      |                   |                |          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------|--|
| Behandlungsfälle mit operativer Entfernung der Schilddrüse                           | Mengeninformation | 60,5 (20)      | 65       |  |
|                                                                                      | 2                 | 17.109         |          |  |
| Behandlungsfälle mit operativer Entfernung der Schilddrüse bei Schilddrüsenkrebs     | Mengeninformation | 12,4 (5)       | 17       |  |
|                                                                                      | 2                 | 2.501          |          |  |
| Behandlungsfälle mit operativer Entfernung der Schilddrüse bei gutartiger Erkrankung | Mengeninformation | 49,8 (18)      | 48       |  |
|                                                                                      | 2                 | 13.655         |          |  |
| Anteil der Beatmungsfälle (> 24 Std.) nach Schilddrüseneingriff                      | Information (SE)  | 0,64%          | 0,0%     |  |
|                                                                                      | 1 / 4             | 103 von 16.146 | 0 von 65 |  |
| Behandlungsfälle mit Radiojodtherapie                                                | Mengeninformation | 259,9 (212)    | 289      |  |
|                                                                                      | 2                 | 10.138         |          |  |

### Große Operationen am Dick- und Enddarm (Kolon und Rektum)

|                                                                                     |                   |                  |           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------|------|
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Dick-/Enddarmkrebs                               | Mengeninformation | 126,3 (86)       | 117       |      |
|                                                                                     | 2                 | 43.444           |           |      |
| Behandlungsfälle mit Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn                             | Mengeninformation | 97,8 (63)        | 104       |      |
|                                                                                     | 2                 | 36.971           |           |      |
| Todesfälle bei operativer Entfernung des Dick-/Enddarms                             | Beobachtungswert  | 7,7%             | 5,3%      |      |
|                                                                                     | 1                 | 2.714 von 35.313 | 6 von 114 |      |
| Todesfälle bei operativer Dickdarmentfernung bei Krebs ohne komplizierende Diagnose | < Erwartungswert  | 3,8%             | 0,0%      | 2,8% |
|                                                                                     | 1 / 5             | 330 von 8.624    | 0 von 28  | 0,00 |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der**

**[Präambel](#)**

| IQM Indikatoren                                                                                              | IQM<br>Zielwert                | IQM<br>Durchschnittswert  | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                              | <a href="#">Quelle</a>         | <a href="#">Fallzahl</a>  | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |
| Todesfälle bei operativer Dickdarmentfernung bei Krebs mit komplizierender Diagnose                          | Beobachtungswert<br>1          | 11,6%<br>293 von 2.516    | 0,0%<br>0 von 10         |                               |
| Todesfälle bei operativer Enddarmentfernung bei Krebs                                                        | <3,2%<br>1                     | 2,6%<br>106 von 4.134     | 0,0%<br>0 von 10         |                               |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Divertikel ohne Abszess/Perforation                | <0,72% (SE)<br>1 / 4           | 0,7539%<br>14 von 1.857   | 0,0%<br>0 von 8          |                               |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Divertikel mit Abszess/Perforation                 | Beobachtungswert<br>1          | 5,4%<br>251 von 4.675     | 5,3%<br>1 von 19         |                               |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Darmischämie                                       | Information<br>1               | 42,3%<br>856 von 2.022    | 50,0%<br>3 von 6         |                               |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn                 | Beobachtungswert<br>1          | 3,2%<br>69 von 2.139      | 0,0%<br>0 von 4          |                               |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei anderen Diagnosen                                  | Information<br>1               | 8,5%<br>795 von 9.346     | 6,9%<br>2 von 29         |                               |
| Anteil operative Leberentfernung bei Entfernung des Dick-/Enddarms bei Dick- und Enddarmkrebs                | Information<br>1               | 4,2%<br>647 von 15.274    | 0,0%<br>0 von 48         |                               |
| Behandlungsfälle mit roboterassistiertem Eingriff bei Krebserkrankung des Darms                              | Information<br>1               | 14,6%<br>2.223 von 15.274 | 0,0%<br>0 von 48         |                               |
| <b>Erkrankungen des Magens</b>                                                                               |                                |                           |                          |                               |
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Magenkrebs (mit und ohne Magenoperation)                                  | Mengeninformation<br>2         | 45,2 (26)<br>14.509       | 34                       |                               |
| Todesfälle bei Geschwüren an Magen, Zwölffingerdarm oder Dünndarm als Hauptdiagnose (mit und ohne Operation) | Beobachtungswert<br>1          | 5,4%<br>991 von 18.467    | 4,4%<br>3 von 68         |                               |
| Behandlungsfälle mit Magenentfernungen                                                                       | Mengeninformation<br>2         | 36,9 (13)<br>9.921        | 77                       |                               |
| Todesfälle bei operativer Magenentfernung bei Magenkrebs ohne Speiseröhreneingriff                           | Beobachtungswert<br>1          | 5,1%<br>99 von 1.941      | 0,0%<br>0 von 8          |                               |
| Todesfälle bei operativer Magenentfernung bei anderer Diagnose (nicht Magenkrebs) ohne Speiseröhreneingriff  | Beobachtungswert<br>1          | 2,9%<br>227 von 7.753     | 2,9%<br>2 von 69         |                               |
| <b>Adipositaschirurgie</b>                                                                                   |                                |                           |                          |                               |
| Todesfälle im Rahmen der Adipositaschirurgie                                                                 | Beobachtungswert (SE)<br>1 / 4 | 0,0189%<br>2 von 10.594   | 0,0%<br>0 von 97         |                               |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungs-wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>    |

Eingriffe an der Bauchspeicheldrüse und der Leber

|                                                                                      |                  |               |          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------|--|
| Todesfälle bei Eingriffen an der Bauchspeicheldrüse ohne Transplantation             | Beobachtungswert | 9,3%          | 0,0%     |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                       | 1                | 445 von 4.804 | 0 von 13 |  |
| Todesfälle bei operativer Bauchspeicheldrüsenentfernung bei Bauchspeicheldrüsenkrebs | Beobachtungswert | 7,7%          | 0,0%     |  |
|                                                                                      | 1                | 220 von 2.865 | 0 von 7  |  |
| Todesfälle bei anatomischer Leberentfernung                                          | Beobachtungswert | 5,5%          | 0,0%     |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                       | 1                | 136 von 2.489 | 0 von 5  |  |

|                                                                                                                          |  |                                        |  |                                                   |  |                                             |  |                                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|
| G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025                                                                                     |  | Jahr:                                  |  | 2023                                              |  |                                             |  |                                               |  |
| Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der <a href="#">Präambel</a> |  |                                        |  |                                                   |  |                                             |  |                                               |  |
| IQM Indikatoren                                                                                                          |  | IQM Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> |  | IQM Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> |  | Klinik Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> |  | Klinik Erwartungs-wert<br><a href="#">SMR</a> |  |
| Gefäßoperationen                                                                                                         |  |                                        |  |                                                   |  |                                             |  |                                               |  |
| Eingriffe an der Halsschlagader (Carotis)                                                                                |  |                                        |  |                                                   |  |                                             |  |                                               |  |
| Todesfälle bei ausschließlich extrakranieller Operation der Halsschlagader                                               |  | <1,09%                                 |  | 1,09%                                             |  | 0,0%                                        |  |                                               |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                           |  | 1                                      |  | 100 von 9.177                                     |  | 0 von 55                                    |  |                                               |  |
| Todesfälle bei Stent-Implantation in extrakranielle Abschnitte der Halsschlagader                                        |  | <2,1%                                  |  | 2,8%                                              |  | n.a.                                        |  |                                               |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                           |  | 1                                      |  | 64 von 2.263                                      |  | <4                                          |  |                                               |  |
| Eingriffe an der Hauptschlagader (Aorta)                                                                                 |  |                                        |  |                                                   |  |                                             |  |                                               |  |
| Operation an der Hauptschlagader (Aorta)                                                                                 |  | Mengeninformation<br>2                 |  | 56,4 (30)<br>10.156                               |  | 16                                          |  |                                               |  |
| Operation an der Bauchaorta                                                                                              |  | Mengeninformation<br>2                 |  | 30,4 (26)<br>5.287                                |  | 15                                          |  |                                               |  |
| Todesfälle bei offener Operation eines nicht rupturierten Bauchaortenaneurysmas                                          |  | <7,6%                                  |  | 6,5%                                              |  | 25,0%                                       |  |                                               |  |
|                                                                                                                          |  | 1                                      |  | 53 von 818                                        |  | 2 von 8                                     |  |                                               |  |
| Todesfälle bei endovaskulärer Stentimplantation eines nicht rupturierten Bauchaortenaneurysmas                           |  | <1,4%                                  |  | 0,7%                                              |  | n.a.                                        |  |                                               |  |
|                                                                                                                          |  | 1                                      |  | 21 von 3.102                                      |  | <4                                          |  |                                               |  |
| Todesfälle bei Operation der Bauchaorta ohne Aneurysma                                                                   |  | Beobachtungswert<br>1                  |  | 6,5%<br>29 von 448                                |  | n.a.<br><4                                  |  |                                               |  |
| Todesfälle bei rupturiertem Aortenaneurysma                                                                              |  | Information<br>1                       |  | 40,8%<br>734 von 1.799                            |  | n.a.<br><4                                  |  |                                               |  |
| Todesfälle bei Operation eines rupturierten Aortenaneurysmas                                                             |  | Information<br>1                       |  | 33,7%<br>333 von 988                              |  | n.a.<br><4                                  |  |                                               |  |
| Eingriffe der Becken-/Bein-Arterien                                                                                      |  |                                        |  |                                                   |  |                                             |  |                                               |  |
| Todesfälle bei Operationen der Becken-/Beinarterien                                                                      |  | Information<br>1                       |  | 5,6%<br>1.553 von 27.545                          |  | 9,3%<br>8 von 86                            |  |                                               |  |
| davon Todesfälle bei Schaufensterkrankheit (Claudicatio)                                                                 |  | <0,33% (SE)<br>1 / 4                   |  | 0,2817%<br>16 von 5.680                           |  | 0,0%<br>0 von 32                            |  |                                               |  |
| davon Todesfälle bei Ruheschmerz                                                                                         |  | <2,3%<br>1                             |  | 1,4%<br>27 von 1.973                              |  | n.a.<br><4                                  |  |                                               |  |
| davon Todesfälle bei Ulzeration/Gangrän                                                                                  |  | <4,5%<br>1                             |  | 3,9%<br>136 von 3.498                             |  | 0,0%<br>0 von 7                             |  |                                               |  |
| PTA (Perkutan transluminale Gefäßinterventionen)                                                                         |  |                                        |  |                                                   |  |                                             |  |                                               |  |
| Todesfälle bei Wiedereröffnung eines verschlossenen Gefäßes mittels Ballonkatheter                                       |  | Beobachtungswert<br>1                  |  | 2,9%<br>1.684 von 57.653                          |  | 1,7%<br>1 von 58                            |  |                                               |  |
| PTA Abdomen/Beinarterien mit arterieller Operation im gleichen stationären Aufenthalt                                    |  | Mengeninformation<br>2                 |  | 47,6 (38)<br>9.810                                |  | 11                                          |  |                                               |  |
| Arteriovenöser Shunt                                                                                                     |  |                                        |  |                                                   |  |                                             |  |                                               |  |
| Anlegen eines arteriovenösen Shunts                                                                                      |  | Mengeninformation<br>2                 |  | 27,7 (17)<br>5.213                                |  | 19                                          |  |                                               |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr: 2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

Präambel

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungs-<br>wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>        |

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Geburtshilfe

|                                                                                  |                       |                             |                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| Mütterliche Todesfälle bei der Geburt                                            | <0,005% (SE)<br>1 / 4 | 0,0045%<br>10 von 219.975   | 0,0%<br>0 von 877    |  |
| Anteil vaginale Geburten mit Dammriss 4. Grades                                  | <0,125% (SE)<br>1 / 4 | 0,1109%<br>163 von 146.933  | 0,0%<br>0 von 589    |  |
| Anteil vaginale Geburten mit Dammschnitt                                         | Information<br>1      | 9,7%<br>14.200 von 146.933  | 3,2%<br>19 von 589   |  |
| Anteil Kaiserschnitt an allen Geburten                                           | Information<br>1      | 33,2%<br>73.042 von 219.975 | 32,8%<br>288 von 877 |  |
| Anteil sanfter Kaiserschnitt (nach Misgav-Ladach) an allen Kaiserschnittgeburten | Information<br>1      | 78,8%<br>57.535 von 73.042  | 66,3%<br>191 von 288 |  |
| Anteil Kaiserschnitte bei risikoarmer Geburt                                     | Information<br>1      | 27,9%<br>53.760 von 192.567 | 28,4%<br>222 von 781 |  |
| davon Anteil Kaiserschnitte bei risikoarmer Geburt                               | Information<br>1      | 25,8%<br>36.583 von 141.813 | 27,1%<br>150 von 554 |  |
| Alle Patient:innen < 35 Jahre                                                    |                       |                             |                      |  |
| davon Anteil Kaiserschnitte bei risikoarmer Geburt                               | Information<br>1      | 33,8%<br>17.177 von 50.754  | 31,7%<br>72 von 227  |  |
| Alle Patient:innen > 34 Jahre                                                    |                       |                             |                      |  |

Neugeborene

|                                                                |                        |                         |            |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|--|
| Neugeborene mit Geburtsgewicht < 1.250 Gramm                   | Mengeninformation<br>2 | 23,4 (24)<br>2.150      | n.a.<br><4 |  |
| davon Neugeborene mit Geburtsgewicht < 500 Gramm               | Mengeninformation<br>2 | 3,4 (3)<br>218          | n.a.<br><4 |  |
| davon Neugeborene mit Geburtsgewicht von 1.250 bis 1.499 Gramm | Mengeninformation<br>2 | 9,8 (8)<br>895          | n.a.<br><4 |  |
| davon Neugeborene mit Geburtsgewicht von 1.500 bis 2.499 Gramm | Mengeninformation<br>2 | 68,1 (26)<br>13.422     | 58         |  |
| davon Neugeborene mit Geburtsgewicht > 2.500 Gramm             | Mengeninformation<br>2 | 1039,3 (779)<br>218.259 | 889        |  |

Frauenheilkunde

|                                                                                                            |                      |                            |                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|
| Todesfälle bei operativer Entfernung der Gebärmutter bei gutartigen Erkrankungen                           | <0,04% (SE)<br>1 / 4 | 0,0526%<br>11 von 20.893   | 1,0309%<br>1 von 97 |  |
| Alle Patient:innen > 14 Jahre                                                                              |                      |                            |                     |  |
| Anteil der Behandlungsfälle mit vaginaler/laparoskopischer Gebärmutterentfernung ohne plastische Operation | >88,4%<br>1          | 89,3%<br>18.501 von 20.710 | 81,4%<br>79 von 97  |  |
| Alle Patient:innen > 14 Jahre                                                                              |                      |                            |                     |  |
| Anteil der Behandlungsfälle mit vaginaler Entfernung durch Zerkleinerung der Gebärmutter                   | Information<br>1     | 28,2%<br>5.848 von 20.710  | 23,7%<br>23 von 97  |  |
| Alle Patient:innen > 14 Jahre                                                                              |                      |                            |                     |  |
| Anteil der Behandlungsfälle mit vaginaler Gebärmutterentfernung durch Zerkleinerung der Gebärmutter        | Information<br>1     | 5,7%<br>334 von 5.848      | 0,0%<br>0 von 23    |  |
| Alle Patient:innen > 14 Jahre                                                                              |                      |                            |                     |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

Präambel

| IQM Indikatoren                                                                                                    | IQM Zielwert          | IQM Durchschnittswert |     |        | Klinik Ist-Wert |     |     | Klinik Erwartungs-wert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----|--------|-----------------|-----|-----|------------------------|
|                                                                                                                    | Quelle                | Fallzahl              |     |        | Fallzahl        |     |     | SMR                    |
|                                                                                                                    |                       |                       |     |        |                 |     |     |                        |
| Anteil der Behandlungsfälle mit laparoskopischer Gebärmutterentfernung ohne plastische Operation                   | Information           | 61,1%                 |     |        | 57,7%           |     |     |                        |
| Alle Patient:innen > 14 Jahre                                                                                      | 1                     | 12.653                | von | 20.710 | 56              | von | 97  |                        |
| Anteil der Behandlungsfälle mit laparoskopischer Gebärmutterentfernung durch Zerkleinerung der Gebärmutter         | Information           | 27,3%                 |     |        | 8,9%            |     |     |                        |
|                                                                                                                    | 1                     | 3.455                 | von | 12.653 | 5               | von | 56  |                        |
| Anteil der Behandlungsfälle mit Eierstock- und Gebärmutterentfernung bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose | Information           | 5,7%                  |     |        | 9,7%            |     |     |                        |
| Alle Patient:innen > 14 und < 50 Jahre                                                                             | 1                     | 387                   | von | 6.804  | 3               | von | 31  |                        |
| Anteil der Behandlungsfälle mit Eierstock- und Gebärmutterentfernung bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose | Information           | 32,6%                 |     |        | 68,3%           |     |     |                        |
| Alle Patient:innen >= 50 Jahre                                                                                     | 1                     | 2.626                 | von | 8.063  | 28              | von | 41  |                        |
| Bösartige Neubildungen der Brust und der weiblichen Geschlechtsorgane                                              |                       |                       |     |        |                 |     |     |                        |
| Behandlungsfälle mit Krebserkrankung der Brust oder der Geschlechtsorgane als Hauptdiagnose                        | Mengeninformation     | 213,7 (72)            |     |        | 328             |     |     |                        |
|                                                                                                                    | 2                     | 70.101                |     |        |                 |     |     |                        |
| Behandlungsfälle mit Eierstockkrebs als Hauptdiagnose                                                              | Mengeninformation     | 30,3 (14)             |     |        | 23              |     |     |                        |
|                                                                                                                    | 2                     | 8.765                 |     |        |                 |     |     |                        |
| Todesfälle nach Eierstockentfernung bei Eierstockkrebs                                                             | Beobachtungswert      | 1,4%                  |     |        | 0,0%            |     |     |                        |
|                                                                                                                    | 1                     | 34                    | von | 2.482  | 0               | von | 7   |                        |
| Behandlungsfälle mit Gebärmutterkrebs als Hauptdiagnose                                                            | Mengeninformation     | 51,9 (29)             |     |        | 67              |     |     |                        |
|                                                                                                                    | 2                     | 14.432                |     |        |                 |     |     |                        |
| Todesfälle nach Gebärmutterentfernung bei Gebärmutterkrebs                                                         | Beobachtungswert (SE) | 0,73%                 |     |        | 0,0%            |     |     |                        |
|                                                                                                                    | 1 / 4                 | 41                    | von | 5.620  | 0               | von | 28  |                        |
| Behandlungsfälle mit Brustkrebs als Hauptdiagnose                                                                  | Mengeninformation     | 135,1 (34)            |     |        | 218             |     |     |                        |
|                                                                                                                    | 2                     | 43.095                |     |        |                 |     |     |                        |
| Eingriffe an der Brust                                                                                             |                       |                       |     |        |                 |     |     |                        |
| Eingriffe an der Brust                                                                                             | Mengeninformation     | 168,0 (126)           |     |        | 196             |     |     |                        |
|                                                                                                                    | 2                     | 38.463                |     |        |                 |     |     |                        |
| Operationen der Brust bei Brustkrebs                                                                               | Mengeninformation     | 148,2 (125)           |     |        | 158             |     |     |                        |
|                                                                                                                    | 2                     | 28.157                |     |        |                 |     |     |                        |
| Anteil brusterhaltender Operationen bei Brustkrebs                                                                 | Information           | 71,3%                 |     |        | 70,9%           |     |     |                        |
|                                                                                                                    | 1                     | 20.085                | von | 28.157 | 112             | von | 158 |                        |
| Eingriffe am Beckenboden bei der Frau                                                                              |                       |                       |     |        |                 |     |     |                        |
| Behandlungsfälle mit Beckenbodenoperationen mit und ohne plastische Operation                                      | Mengeninformation     | 73,8 (54)             |     |        | 44              |     |     |                        |
|                                                                                                                    | 2                     | 18.971                |     |        |                 |     |     |                        |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr: 2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

Präambel

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungs-wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>    |

## Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe

### Bösartige Neubildungen des Bewegungsapparates

|                                                                                                                                    |                   |          |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----|--|
| Behandlungsfälle mit bösartiger Neubildung an Knochen, Gelenkknorpel, peripheren Nerven, Retroperitoneum, Bindegewebe, Weichteilen | Mengeninformation | 45,7 (5) | 16 |  |
|                                                                                                                                    | 2                 | 14.026   |    |  |

### Gelenkersatz (Endoprothetik)

|                                                                                                                                           |                       |                  |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|--|
| Todesfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung                                        | <0,13% (SE)           | 0,0843%          | 0,2301%    |  |
|                                                                                                                                           | 1 / 4                 | 49 von 58.126    | 2 von 869  |  |
| Todesfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei hüftgelenknahen Frakturen                                                          | Beobachtungswert      | 5,1%             | 6,7%       |  |
|                                                                                                                                           | 1                     | 1.033 von 20.145 | 6 von 90   |  |
| Todesfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei anderen Diagnosen                                                                  | Beobachtungswert      | 5,5%             | 2,6%       |  |
|                                                                                                                                           | 1                     | 351 von 6.336    | 1 von 38   |  |
| Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung | Beobachtungswert      | 2,4%             | 1,2%       |  |
|                                                                                                                                           | 1                     | 1.373 von 58.126 | 10 von 869 |  |
| Todesfälle bei Wechsel eines Hüftgelenkersatzes ohne Fraktur oder Infektion                                                               | <1,42% (SE)           | 1,37%            | 0,0%       |  |
|                                                                                                                                           | 1 / 4                 | 64 von 4.685     | 0 von 83   |  |
| davon Todesfälle bei Wechsel eines Hüftgelenkersatzes mit Sonderprothesen                                                                 | Information           | 1,0%             | 0,0%       |  |
|                                                                                                                                           | 1                     | 9 von 918        | 0 von 12   |  |
| Todesfälle bei Wechsel eines Hüftgelenkersatzes wegen Fraktur oder Infektion                                                              | Beobachtungswert      | 4,5%             | 4,5%       |  |
|                                                                                                                                           | 1                     | 177 von 3.930    | 2 von 44   |  |
| Todesfälle bei Kniegelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung                                        | <0,06% (SE)           | 0,044%           | 0,0%       |  |
|                                                                                                                                           | 1 / 4                 | 26 von 59.081    | 0 von 589  |  |
| Todesfälle bei Kniegelenkersatz (Erstimplantation) bei anderen Diagnosen                                                                  | Beobachtungswert (SE) | 0,3447%          | 0,0%       |  |
|                                                                                                                                           | 1 / 4                 | 12 von 3.481     | 0 von 48   |  |
| Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei Kniegelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung | Beobachtungswert      | 1,5%             | 1,2%       |  |
|                                                                                                                                           | 1                     | 915 von 59.081   | 7 von 589  |  |
| Todesfälle bei Wechsel eines Kniegelenk oder -teilersatzes ohne Fraktur oder Infektion                                                    | <0,20% (SE)           | 0,3709%          | 0,0%       |  |
|                                                                                                                                           | 1 / 4                 | 18 von 4.853     | 0 von 70   |  |
| davon Todesfälle bei Wechsel eines Kniegelenkersatzes mit Sonderprothesen                                                                 | Information (SE)      | 0,4008%          | 0,0%       |  |
|                                                                                                                                           | 1 / 4                 | 6 von 1.497      | 0 von 29   |  |
| Todesfälle bei Wechsel eines Kniegelenkersatzes wegen Fraktur oder Infektion                                                              | Beobachtungswert      | 3,2%             | 0,0%       |  |
|                                                                                                                                           | 1                     | 65 von 2.040     | 0 von 23   |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr: 2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

Präambel

| IQM Indikatoren                                                                                                                                   | IQM Zielwert          | IQM Durchschnittswert |     |        | Klinik Ist-Wert | Klinik Erwartungs-wert |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----|--------|-----------------|------------------------|
|                                                                                                                                                   | Quelle                | Fallzahl              |     |        | Fallzahl        | SMR                    |
| Todesfälle bei Hüft- oder Kniegelenkersatz bei Tumorerkrankung                                                                                    | Beobachtungswert      | 7,0%                  |     |        | 0,0%            |                        |
|                                                                                                                                                   | 1                     | 166                   | von | 2.359  | 0               | von 40                 |
| Hüftgelenknahe Frakturen                                                                                                                          |                       |                       |     |        |                 |                        |
| Todesfälle nach operativer Versorgung einer Schenkelhalsfraktur als Hauptdiagnose                                                                 | < Erwartungswert      | 4,7%                  |     |        | 5,9%            |                        |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                    | 1                     | 1.035                 | von | 22.251 | 6               | von 101                |
| Todesfälle nach Gelenkersatz bei Schenkelhalsfraktur als Hauptdiagnose                                                                            | Beobachtungswert      | 5,0%                  |     |        | 7,5%            |                        |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                    | 1                     | 995                   | von | 19.716 | 6               | von 80                 |
| Todesfälle nach Osteosynthese (Verbindung der Knochenfragmente durch Platten, Schrauben oder Nägel) bei Schenkelhalsfraktur als Hauptdiagnose     | Beobachtungswert      | 1,6%                  |     |        | 0,0%            |                        |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                    | 1                     | 40                    | von | 2.535  | 0               | von 21                 |
| Todesfälle nach operativer Versorgung einer pertrochantären Fraktur als Hauptdiagnose                                                             | < Erwartungswert      | 4,7%                  |     |        | 3,8%            |                        |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                    | 1                     | 875                   | von | 18.558 | 3               | von 78                 |
| Todesfälle nach Gelenkersatz bei pertrochantärer Fraktur als Hauptdiagnose                                                                        | Beobachtungswert      | 9,0%                  |     |        | 0,0%            |                        |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                    | 1                     | 36                    | von | 399    | 0               | von 10                 |
| Todesfälle nach Osteosynthese (Verbindung der Knochenfragmente durch Platten, Schrauben oder Nägel) bei pertrochantärer Fraktur als Hauptdiagnose | Beobachtungswert      | 4,6%                  |     |        | 4,4%            |                        |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                    | 1                     | 839                   | von | 18.159 | 3               | von 68                 |
| Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark                                                                                                  |                       |                       |     |        |                 |                        |
| Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark (ohne lokale Schmerztherapie)                                                                    | Mengeninformation     | 331,5 (212)           |     |        | 86              |                        |
|                                                                                                                                                   | 2                     | 109.058               |     |        |                 |                        |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder Wirbelkörper-Ersatz bei Tumor (inkl. komplexe Rekonstruktionen)                                      | Beobachtungswert      | 8,0%                  |     |        | n.a.            |                        |
|                                                                                                                                                   | 1                     | 269                   | von | 3.366  | <4              |                        |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder Wirbelkörper-Ersatz bei Trauma (inkl. komplexe Rekonstruktionen, Rückenmarkoperation)                | Beobachtungswert      | 3,6%                  |     |        | 0,0%            |                        |
|                                                                                                                                                   | 1                     | 497                   | von | 13.832 | 0               | von 23                 |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder 1 Wirbelkörper-Ersatz (ohne Tumor, Trauma oder kompl. Rekonstruktionen)                              | Beobachtungswert (SE) | 0,1621%               |     |        | 0,0%            |                        |
|                                                                                                                                                   | 1 / 4                 | 20                    | von | 12.339 | 0               | von 5                  |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder 2 Wirbelkörper-Ersatz (ohne Tumor, Trauma oder kompl. Rekonstruktionen)                              | Beobachtungswert (SE) | 0,1822%               |     |        | n.a.            |                        |
|                                                                                                                                                   | 1 / 4                 | 12                    | von | 6.586  | <4              |                        |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder 3 oder mehr Wirbelkörper-Ersatz (ohne Tumor, Trauma oder kompl. Rekonstruktionen)                    | Beobachtungswert (SE) | 0,7644%               |     |        | n.a.            |                        |
|                                                                                                                                                   | 1 / 4                 | 40                    | von | 5.233  | <4              |                        |
| Todesfälle bei alleiniger 'Entlastung' (Dekompression) der Wirbelsäule                                                                            | Beobachtungswert (SE) | 0,062%                |     |        | n.a.            |                        |
|                                                                                                                                                   | 1 / 4                 | 14                    | von | 22.563 | <4              |                        |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                                                                                      | IQM Zielwert                   | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungs-wert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                      | <a href="#">Quelle</a>         | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>    |
| Todesfälle bei 'einfachen' Bandscheibenentfernungen                                                                                  | <0,03% (SE)<br>1 / 4           | 0,0067%<br>1 von 14.848  | n.a.<br><4               |                        |
| Todesfälle bei Vertebro-/Kyphoplastie (ohne Tumor, Trauma, kompl. Rekonstruktion, Versteifung, WK-Ersatz oder Bandscheibeneingriffe) | <0,53% (SE)<br>1 / 4           | 0,4888%<br>32 von 6.547  | 3,0303%<br>1 von 33      |                        |
| Todesfälle bei anderen Operationen an der Wirbelsäule oder am Rückenmark                                                             | Beobachtungswert<br>1          | 1,8%<br>374 von 20.396   | 0,0%<br>0 von 15         |                        |
| Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei 'einfachen' Bandscheibenentfernungen                                           | Beobachtungswert (SE)<br>1 / 4 | 0,5119%<br>76 von 14.848 | n.a.<br><4               |                        |
| Lokale Schmerztherapie an der Wirbelsäule (ohne andere Wirbelsäulen- oder Rückenmarkoperation)                                       | Mengeninformation<br>2         | 84,6 (32)<br>27.056      | 20                       |                        |
| Behandlungsfälle mit Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen als Hauptdiagnose ohne Operation oder lokale Schmerztherapie            | Mengeninformation<br>2         | 133,9 (115)<br>49.963    | 60                       |                        |
| Operationen am Bewegungsapparat inkl. Endoprothetik                                                                                  |                                |                          |                          |                        |
| Gelenkersatz am Schulter-/ Ellenbogengelenk                                                                                          | Mengeninformation<br>2         | 34,8 (27)<br>11.390      | 30                       |                        |
| Mehrfachverletzungen - Polytraumen                                                                                                   |                                |                          |                          |                        |
| Mehrfachverletzungen (Polytraumen) im Sinne der DRG-Definition                                                                       | Mengeninformation<br>2         | 21,7 (8)<br>6.866        | 14                       |                        |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |

Urologie

Harnblase

|                                                                                                 |                        |                            |                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------|--|
| Behandlungsfälle mit Blasenkrebs als Hauptdiagnose                                              | Mengeninformation<br>2 | 140,1 (54)<br>41.898       | 6                |  |
| Prostata                                                                                        |                        |                            |                  |  |
| Behandlungsfälle mit Prostatakrebs als Hauptdiagnose                                            | Mengeninformation<br>2 | 109,0 (26)<br>34.228       | 53               |  |
| Nierensteine                                                                                    |                        |                            |                  |  |
| Behandlungsfälle mit Nierensteinen als Hauptdiagnose                                            | Mengeninformation<br>2 | 205,6 (52)<br>69.911       | 12               |  |
| Anteil der Behandlungsfälle mit Intervention zur Steinentfernung bei Hauptdiagnose Nierensteine | Information<br>1       | 53,0%<br>37.084 von 69.911 | 0,0%<br>0 von 12 |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

IQM Indikatoren

| IQM<br>Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> | IQM<br>Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert<br><a href="#">SMR</a> |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Hautkrankheiten

Hautkrankheiten

|                                                             |                        |                    |    |  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----|--|
| Behandlungsfälle mit Melanom als Hauptdiagnose              | Mengeninformation<br>2 | 45,7 (5)<br>11.646 | 14 |  |
| Behandlungsfälle mit Dermatitis und Ekzem als Hauptdiagnose | Mengeninformation<br>2 | 33,9 (6)<br>10.779 | 8  |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

Präambel

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |

## Intensivmedizin

### Intensivmedizin

|                                                                                                                           |                       |                            |                     |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| Todesfälle bei Beatmung > 24 Stunden ohne Neugeborene                                                                     | Information<br>1      | 35,4%<br>30.990 von 87.630 | 39,2%<br>51 von 130 |               |
| Todesfälle bei Beatmung > 24 Stunden ohne Neugeborene und ohne COVID-19 Fälle                                             | <35,9%<br>1           | 34,8%<br>28.096 von 80.798 | 39,8%<br>49 von 123 |               |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger als Hauptdiagnose                                        | < Erwartungswert<br>1 | 33,3%<br>9.575 von 28.731  | 45,2%<br>28 von 62  | 33,6%<br>1,34 |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger als Hauptdiagnose mit Organkomplikation/Schock           | Beobachtungswert<br>1 | 35,5%<br>9.156 von 25.801  | 47,5%<br>28 von 59  |               |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger als Hauptdiagnose ohne Organkomplikation/Schock          | Beobachtungswert<br>1 | 14,3%<br>419 von 2.930     | n.a.<br><4          |               |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger oder SIRS als Nebendiagnose                              | Beobachtungswert<br>1 | 37,4%<br>22.659 von 60.510 | 36,3%<br>29 von 80  |               |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger oder SIRS als Nebendiagnose mit Organkomplikation/Schock | Beobachtungswert<br>1 | 38,5%<br>22.214 von 57.675 | 36,4%<br>28 von 77  |               |
| Todesfälle bei generalisierter Entzündungsreaktion des gesamten Körpers ohne Organkomplikation (SIRS)                     | Information<br>1      | 7,2%<br>3.384 von 47.318   | 14,9%<br>60 von 402 |               |
| Anteil Todesfälle bei nicht-bakterieller Blutvergiftung (Sepsis)                                                          | Beobachtungswert<br>1 | 34,8%<br>155 von 446       | n.a.<br><4          |               |

### Angeborene Gerinnungsstörung und Bluttransfusion

|                                                                                                    |                        |                               |                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|
| Behandlungsfälle mit angeborenen Gerinnungsstörungen als Haupt- oder Nebendiagnose                 | Mengeninformation<br>2 | 28,9 (14)<br>10.632           | 23                    |  |
| davon operierte Behandlungsfälle mit angeborenen Gerinnungsstörungen als Haupt- oder Nebendiagnose | Mengeninformation<br>2 | 19,5 (9)<br>6.847             | 16                    |  |
| Anteil operierter Behandlungsfälle mit Bluttransfusion                                             | Information<br>1       | 7,5%<br>175.709 von 2.336.953 | 6,1%<br>488 von 8.057 |  |

### Obduktionen

|                |                  |                            |                   |  |
|----------------|------------------|----------------------------|-------------------|--|
| Obduktionsrate | Information<br>1 | 0,84%<br>1.310 von 156.425 | 0,0%<br>0 von 447 |  |
|----------------|------------------|----------------------------|-------------------|--|

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                         | IQM                    |                          |                          |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|                                         | Zielwert               | Durchschnittswert        | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungs-wert |
|                                         | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>    |
| Palliativmedizin                        |                        |                          |                          |                        |
| Palliativmedizin                        |                        |                          |                          |                        |
| Palliativmedizinische Komplexbehandlung | Mengeninformation<br>2 | 208,7 (132)<br>43.404    | 284                      |                        |

## Leseanleitung zu den IQM-Indikatoren



### Lesebeispiel

Beim nachfolgenden Indikator „Todesfälle bei Hauptdiagnose Transmuraler Herzinfarkt (Alle Patient:innen  $\geq 20$  Jahre)“ liegt der Wert der durchschnittlichen Krankenhaussterblichkeit in der Bundesrepublik bei 12,2 % (Quelle: Statistisches Bundesamt). Daraus ergibt sich rechnerisch für das Beispielkrankenhaus aufgrund des Alters und Geschlechts der Patientinnen und Patienten des ausgewerteten Jahres eine zu erwartende Krankenhaussterblichkeit von 10,8 % **4** als Erwartungswert. Ziel der IQM-Mitgliedskrankenhäuser ist es, im Ergebnis unter diesem Erwartungswert zu liegen **1**. Der für das Beispielkrankenhaus tatsächlich gemessene Ist-Wert betrug in diesem Jahr 19,4 % **3** und lag damit über dem Krankenhaus-Erwartungswert für den Qualitätsindikator „Todesfälle bei Hauptdiagnose Transmuraler Herzinfarkt“. Der Durchschnittswert aller IQM-Mitgliedskrankenhäuser liegt bei diesem Indikator bei 11,0 % **2**.

|                                                                                                                          |                                        |                                                   |                                             |                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025                                                                                     |                                        | Jahr:                                             |                                             | 2024                                         |  |
| Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der <a href="#">Präambel</a> |                                        |                                                   |                                             |                                              |  |
| IQM Indikatoren                                                                                                          | IQM Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> | IQM Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik Erwartungswert<br><a href="#">SMR</a> |  |
| Herzerkrankungen                                                                                                         | 1                                      | 2                                                 | 3                                           | 4                                            |  |
| Herzinfarkt                                                                                                              |                                        |                                                   |                                             |                                              |  |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Transmuraler Herzinfarkt                                                                    | < Erwartungswert                       | 11,0%                                             | 19,4%                                       | 10,8%                                        |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                           | 1                                      | 2.623 von 23.934                                  | 99 von 511                                  |                                              |  |

### Die Indikatoren

Die von IQM verwendeten German/Swiss Inpatient Quality Indicators (G-IQI/CH-IQI) sind so ausgewählt, dass sie sowohl häufige und wichtige Krankheitsbilder als auch wichtige Verfahren abbilden. Alle Indikatoren werden aus den Routinedaten des Krankenhauses ohne zusätzliche Dokumentation abgeleitet, wodurch kein weiterer Dokumentationsaufwand entsteht.

## Was wird gemessen?

Hierbei unterscheiden wir **absolute Mengeninformationen** von **relativen Mengeninformationen**, bei denen z.B. ein Anteil bestimmter Operationsverfahren ausgewiesen wird.

Wesentlicher Messwert ist die **Sterblichkeit** bei verschiedenen Krankheitsbildern, auch wenn wir uns bewusst sind, dass Sterblichkeit im Krankenhaus auch bei bester Medizin nicht vermeidbar ist. Deswegen vergleichen wir die Sterblichkeit, wo verfügbar, mit bundesdurchschnittlichen Werten. Diese werden entweder aus Daten des **Statistischen Bundesamtes** oder aus Daten des **Forschungsdatenzentrums der statistischen Ämter des Bundes und der Länder** berechnet. Mit den Daten des Statistischen Bundesamtes wird eine **Risikogewichtung** für das **Alter** und das **Geschlecht** der Behandelten ermöglicht. Krankenhäuser mit einem hohen Anteil sehr alter Patient:innen weisen in der Regel eine andere Sterblichkeit auf als solche mit vergleichsweise jungen Patientinnen und Patienten.

Als wesentliche Orientierungshilfe zur Einordnung der Ergebnisse dient der **Erwartungswert**, da er besagt, welche Sterblichkeit bei einer Patientengruppe gleicher Alters- und Geschlechtsverteilung im Bundesdurchschnitt zu erwarten wäre. Für einige Indikatoren (G-IQI/CH-IQI 01.1, 02.1, 09.3, 14.26 und 21.311) kommen erweiterte **differenzierte Risikomodelle** zum Einsatz. Diese berücksichtigen zusätzlich Begleiterkrankungen, Erkrankungsschwere und den Zuverlegungsstatus. Insofern ergeben sich für unterschiedliche Krankenhäuser individuelle Erwartungswerte, da Unterschiede in der Alters- und Geschlechtszusammensetzung der Behandelten bestehen. Ziel der IQM-Krankenhäuser ist es, „bessere“ als die erwarteten Werte zu erreichen.

Die Beziehung zwischen erwarteter Sterblichkeit und dem tatsächlichen Wert des Krankenhauses nennt man wissenschaftlich **„standardized mortality rate“** oder kurz **„SMR“**. Liegt diese Quote unter 1, dann ist die tatsächliche Sterblichkeit im Krankenhaus für den gemessenen Indikator geringer als die zu erwartende, liegt sie über 1, ist die Sterblichkeit höher als eigentlich erwartet. Ein solcher Wert ist lediglich bei den Indikatoren errechenbar, bei denen die zu erwartende Sterblichkeit aus den Daten des Statistischen Bundesamtes ermittelt werden kann.

Liegen keine alters- und geschlechtsgewichteten Werte für einen Indikator vor, kann auch kein Erwartungswert errechnet werden. Wir sind uns ebenso bewusst, dass die Sterblichkeit bei manchen Indikatoren ein ausgesprochen seltenes Ereignis ist und nicht als alleiniger Nachweis der medizinischen Qualität gelten darf. Die im „low risk“-Bereich gemessene Sterblichkeit ermöglicht in nachfolgenden Analysen dieser seltenen Ereignisse, wichtige Verbesserungspotentiale zu heben.

## Glossar zur Ergebnisveröffentlichung



Hier finden Sie eine Erläuterung der wichtigsten Begriffe und Kennzahlen, die in dieser Veröffentlichung verwendet werden:

### **IQM Zielwert - Quellen (Herkunft und Berechnung):**

Die Referenz- bzw. Zielwerte für die Indikatoren basieren auf verschiedenen Quellen. Die jeweilige Quelle wird durch eine Nummer unter dem „IQM Zielwert“ angegeben:

1: Forschungsdatenzentren der statistischen Ämter des Bundes und der Länder, DRG-Statistik 2022. Eigene Berechnungen. Diese Daten bilden auch die Grundlage für die Berechnung der klinikindividuellen Erwartungswerte, standardisiert nach Alter und Geschlecht.

2: Gleiche Quelle wie 1; jedoch speziell für Mengenindikatoren: Die mittlere Fallzahl (Median in Klammern) für IQM-Mitgliedskrankenhäuser mit entsprechender Leistung im Jahr 2022.

3: Der Zielwert ist hier nicht identisch mit dem Bundeswert und wurde entnommen aus: Kaiser D (2007) Mindestmengen aus thoraxchirurgischer Sicht. Chirurg, 78(11): 1012-1017

4: Sentinel Event: Kennzahl wurde im G-IQI Kolloquium als Sentinel Event eingestuft (seltene Ereignisse, die man nicht erwartet). Weitere Infos dazu in den G-IQI FAQs.

5: Differenziertes Risikomodell zur Berechnung der Erwartungswerte; basierend auf Daten der Forschungsdatenzentren der statistischen Ämter des Bundes und der Länder, DRG-Statistik 2022. Eigene Berechnungen.

6: Empfehlung aus der Beschlussfassung der G-IQI Version 5.5 im Kolloquium II durch den wissenschaftlichen Beirat des IQM e.V.

### **IQM-Durchschnittswert - Fallzahl:**

Der IQM-Durchschnittswert gibt die mittleren Ergebnisse über alle Patient:innen an, die im Beobachtungszeitraum in IQM-Mitgliedskrankenhäusern (D) behandelt wurden. Mengenangaben werden als Durchschnittswert und zusätzlich in Klammern als Median dargestellt.

### **Krankenhaus Erwartungswert:**

Dieser Wert beschreibt die erwartete Sterblichkeit der Patient:innen, basierend auf Alters- und Geschlechtsverteilung. Er wird nur für Indikatoren berechnet, bei denen Vergleichszahlen des Bundesdurchschnitts vorliegen.

Für einige Indikatoren (G-IQI/CH-IQI 01.1, 02.1, 09.3, 14.26 und 21.311) kommen erweiterte differenzierte Risikomodelle zum Einsatz. Diese berücksichtigen zusätzlich Begleiterkrankungen, Erkrankungsschwere und den Zuverlegungsstatus.

### **SMR:**

Die SMR (standardized mortality ratio) ist das Verhältnis von beobachteter Sterblichkeit (Durchschnittswert) und dem Erwartungswert.

### **Hinweis zum Indikator „Obduktionsrate“:**

Die Anzahl der ausgewiesenen Obduktionen kann unvollständig sein, da nicht alle Krankenhaus-Dokumentationssysteme eine vollständige bzw. nachträgliche Kodierung nach Entlassung (bzw. Tod) unterstützen.

### **Fallzahlen und Mindestgrenzen:**

Ergebnisse einer Kennzahl werden nur dann im Detail dargestellt, wenn mindestens 4 oder mehr Fälle im Nenner aufgetreten sind. Bei Unterschreiten dieser Grenze wird dann die Angabe „<4“ ausgewiesen.

Ergebnisse, die sich auf sehr seltene Ereignisse beziehen, werden mit bis zu 4 Nachkommastellen ausgewiesen, um bei hohen Grundgesamtheiten ein Ergebnis zwischen 0 und 1 ausweisen zu können.