

### **Ergebnisdarstellung und Nutzung der Indikatoren-Sets**

Im Sinne einer transparenten und fundierten Qualitätsanalyse möchten wir Ihnen mit dieser Veröffentlichung eine strukturierte Orientierungshilfe zu den dargestellten Ergebnissen bieten. Die Nutzung der Indikatoren-Sets ermöglicht eine präzise Einordnung der Resultate und unterstützt eine gezielte Analyse.

Mit der Versionierung auf G-IQI/CH-IQI 5.5 wurden einige Indikatoren als **Sentinel Events** klassifiziert, um besonders kritische Ereignisse klar zu kennzeichnen. Diese sind in der Spalte „IQM Zielwert“ mit dem Zusatz „SE“ ausgewiesen.

Zudem wurde die **Bezeichnung der G-IQI/CH-IQI systematisch überarbeitet**, um eine bessere Verständlichkeit und Konsistenz zu gewährleisten. Die Anpassungen dieser Terminologie spiegeln sich auch in diesem Dokument wider.

Wir laden Sie ein, die Ergebnisse unter diesen Aspekten zu betrachten und für Ihre weiterführenden Analysen zu nutzen.

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

## IQM Indikatoren

[Qualitätsbericht](#)

[QSR-Mehrjahresergebnisse](#)

### Inhaltsverzeichnis

|                                                    |                      |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Herzerkrankungen                                   | <a href="#">2024</a> | <a href="#">2023</a> |
| Erkrankungen des Nervensystems und Schlaganfall    | <a href="#">2024</a> | <a href="#">2023</a> |
| Altersmedizin                                      | <a href="#">2024</a> | <a href="#">2023</a> |
| Lungenerkrankungen                                 | <a href="#">2024</a> | <a href="#">2023</a> |
| Erkrankungen der Bauchorgane                       | <a href="#">2024</a> | <a href="#">2023</a> |
| Gefäßoperationen                                   |                      | <a href="#">2023</a> |
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe                   | <a href="#">2024</a> |                      |
| Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe | <a href="#">2024</a> | <a href="#">2023</a> |
| Hautkrankheiten                                    | <a href="#">2024</a> |                      |
| Intensivmedizin                                    | <a href="#">2024</a> | <a href="#">2023</a> |

[Lesehilfe](#)



G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                           | IQM<br>Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> | IQM<br>Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert<br><a href="#">SMR</a> |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                           |                                           |                                                      |                                                |                                                      |
| Versorgung mit Schrittmacher oder Defibrillator           |                                           |                                                      |                                                |                                                      |
| Versorgung mit Herzschrittmacher oder Defibrillator       | Mengeninformation<br>2                    | 152,3 (107)<br>47.357                                | n.a.<br><4                                     |                                                      |
| Versorgung mit Herzschrittmacher <u>und</u> Defibrillator | Mengeninformation<br>2                    | 48,7 (36)<br>12.283                                  | n.a.<br><4                                     |                                                      |



G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                      | IQM                    |                          |                          |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|                                                      | Zielwert               | Durchschnittswert        | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungs-wert |
|                                                      | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>    |
| Multiple Sklerose                                    |                        |                          |                          |                        |
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Multiple Sklerose | Mengeninformation      | 35,4 (22)                | n.a.                     |                        |
|                                                      | 2                      | 8.345                    | <4                       |                        |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | <div>IQM<br/>Zielwert</div> <div><a href="#">Quelle</a></div> | <div>IQM<br/>Durchschnittswert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Ist-Wert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Erwartungs-<br/>wert</div> <div><a href="#">SMR</a></div> |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

Altersmedizin

Mangelernährung bei Älteren

|                                                                                  |             |                      |             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|--|
| Anteil Behandlungsfälle mit erheblicher Mangelernährung und ohne Tumorerkrankung | Information | 0,88%                | 0,0%        |  |
| Alle Patient:innen >= 65 Jahre                                                   | 1           | 21.895 von 2.486.668 | 0 von 1.390 |  |

Delir

|                                                                      |             |                      |          |  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------|--|
| Anteil Behandlungsfälle mit aufgetretenem Delir an operierten Fällen | Information | 3,0%                 | 10,0%    |  |
| Alle Patient:innen >= 60 Jahre                                       | 1           | 40.039 von 1.327.814 | 2 von 20 |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungs-wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>    |

Lungenerkrankungen

Lungenentzündung (Pneumonie)

|                                                                                                     |                  |                    |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------|-------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung                                                       | < Erwartungswert | 10,0%              | 3,6%      | 15,4% |
| alle Altersgruppen                                                                                  | 1                | 16.307 von 162.332 | 7 von 195 |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung ohne Zuverlegung, Tumor, Mukoviszidose                | < Erwartungswert | 9,2%               | 0,9%      | 11,1% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | 1                | 10.353 von 112.464 | 1 von 116 |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung ohne Zuverlegung, Tumor, Mukoviszidose, COVID-19      | < Erwartungswert | 8,6%               | 0,9%      | 8,0%  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | 1 / 5            | 8.604 von 100.621  | 1 von 109 | 0,12  |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung durch Aspiration von Nahrungsmitteln oder Mageninhalt | Beobachtungswert | 27,8%              | 11,8%     |       |
|                                                                                                     | 1                | 3.446 von 12.409   | 2 von 17  |       |

COPD (Chronisch obstruktive Lungenerkrankung)

|                                   |                  |                  |          |      |
|-----------------------------------|------------------|------------------|----------|------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose COPD | < Erwartungswert | 4,4%             | 3,3%     | 5,6% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre    | 1                | 2.907 von 66.452 | 1 von 30 | 0,59 |

Lungenkrebs

|                                                |                   |            |      |  |
|------------------------------------------------|-------------------|------------|------|--|
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Lungenkrebs | Mengeninformation | 191,4 (52) | n.a. |  |
|                                                | 2                 | 66.602     | <4   |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | <div>IQM<br/>Zielwert</div> <div><a href="#">Quelle</a></div> | <div>IQM<br/>Durchschnittswert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Ist-Wert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Erwartungs-<br/>wert</div> <div><a href="#">SMR</a></div> |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

Erkrankungen der Bauchorgane

Große Operationen am Dick- und Enddarm (Kolon und Rektum)

|                                                         |                   |           |   |  |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---|--|
| Behandlungsfälle mit Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn | Mengeninformation | 99,5 (62) | 7 |  |
|                                                         | 2                 | 38.009    |   |  |

Erkrankungen des Magens

|                                                                                                              |                  |                |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------|--|
| Todesfälle bei Geschwüren an Magen, Zwölffingerdarm oder Dünndarm als Hauptdiagnose (mit und ohne Operation) | Beobachtungswert | 5,1%           | n.a. |  |
|                                                                                                              | 1                | 983 von 19.463 | <4   |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Bösartige Neubildungen der Brust und der weiblichen Geschlechtsorgane

|                                                                                             |                   |            |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------|--|
| Behandlungsfälle mit Krebserkrankung der Brust oder der Geschlechtsorgane als Hauptdiagnose | Mengeninformation | 209,8 (60) | n.a. |  |
|                                                                                             | 2                 | 71.973     | <4   |  |
| Behandlungsfälle mit Brustkrebs als Hauptdiagnose                                           | Mengeninformation | 133,9 (26) | n.a. |  |
|                                                                                             | 2                 | 44.064     | <4   |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |

Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe

Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark

|                                                                                                                           |                        |                        |                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|--|
| Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark (ohne lokale Schmerztherapie)                                            | Mengeninformation<br>2 | 341,5 (227)<br>115.097 | 6                |  |
| Todesfälle bei anderen Operationen an der Wirbelsäule oder am Rückenmark                                                  | Beobachtungswert<br>1  | 1,9%<br>410 von 21.255 | 16,7%<br>1 von 6 |  |
| Behandlungsfälle mit Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen als Hauptdiagnose ohne Operation oder lokale Schmerztherapie | Mengeninformation<br>2 | 142,4 (118)<br>53.541  | n.a.<br><4       |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

|                 |                        |                          |                          |                               |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |

Hautkrankheiten

Hautkrankheiten

|                                                |                   |          |      |  |
|------------------------------------------------|-------------------|----------|------|--|
| Behandlungsfälle mit Melanom als Hauptdiagnose | Mengeninformation | 47,2 (4) | n.a. |  |
|                                                | 2                 | 11.840   | <4   |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungs-wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>    |

Intensivmedizin

Intensivmedizin

|                                                                                                                           |                       |                            |                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|--|
| Todesfälle bei Beatmung > 24 Stunden ohne Neugeborene                                                                     | Information<br>1      | 34,8%<br>30.431 von 87.437 | 18,6%<br>18 von 97 |  |
| Todesfälle bei Beatmung > 24 Stunden ohne Neugeborene und ohne COVID-19 Fälle                                             | <35,9%<br>1           | 34,5%<br>28.853 von 83.547 | 18,3%<br>17 von 93 |  |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger oder SIRS als Nebendiagnose                              | Beobachtungswert<br>1 | 35,5%<br>22.689 von 63.903 | n.a.<br><4         |  |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger oder SIRS als Nebendiagnose mit Organkomplikation/Schock | Beobachtungswert<br>1 | 36,3%<br>22.225 von 61.292 | n.a.<br><4         |  |

Angeborene Gerinnungsstörung und Bluttransfusion

|                                                                                    |                        |                               |                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|--|
| Behandlungsfälle mit angeborenen Gerinnungsstörungen als Haupt- oder Nebendiagnose | Mengeninformation<br>2 | 30,1 (14)<br>11.108           | 17                |  |
| Anteil operierter Behandlungsfälle mit Bluttransfusion                             | Information<br>1       | 7,5%<br>180.424 von 2.407.413 | 29,2%<br>7 von 24 |  |

Obduktionen

|                |                  |                            |                  |  |
|----------------|------------------|----------------------------|------------------|--|
| Obduktionsrate | Information<br>1 | 0,79%<br>1.241 von 156.378 | 0,0%<br>0 von 55 |  |
|----------------|------------------|----------------------------|------------------|--|

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungs-wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>    |

Herzerkrankungen

Herzinfarkt

|                                                                      |                  |                   |           |       |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------|-------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Herzinfarkt                             | < Erwartungswert | 7,5%              | 0,0%      | 3,7%  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | 1 / 5            | 5.337 von 70.837  | 0 von 97  | 0,00  |
| Anteil der Herzinfarkte mit Linksherzkatheter                        | Information      | 85,8%             | 0,0%      |       |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | 1                | 60.786 von 70.837 | 0 von 97  |       |
| Todesfälle bei Direktaufnahme ohne Verlegung                         | Beobachtungswert | 7,4%              | n.a.      |       |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | 1                | 4.746 von 64.041  | <4        |       |
| Anteil transmuraler Herzinfarkte (STEMI)                             | Information      | 33,7%             | 27,8%     |       |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | 1                | 23.848 von 70.760 | 27 von 97 |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Transmuraler Herzinfarkt                | < Erwartungswert | 11,6%             | 0,0%      | 13,9% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | 1                | 2.761 von 23.848  | 0 von 27  |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Nicht-transmuraler Herzinfarkt (NSTEMI) | < Erwartungswert | 5,1%              | 0,0%      | 5,0%  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | 1                | 2.361 von 46.320  | 0 von 70  |       |
| Todesfälle bei Nebendiagnose Herzinfarkt                             | Beobachtungswert | 17,8%             | 0,0%      |       |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | 1                | 3.670 von 20.570  | 0 von 35  |       |

Herzinsuffizienz

|                                                                                                     |                  |                    |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------|------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Herzinsuffizienz                                                       | < Erwartungswert | 8,2%               | 2,1%       | 5,2% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | 1 / 5            | 13.117 von 160.876 | 6 von 281  | 0,41 |
| Anteil Behandlungsfälle mit Beschwerden bei Linksherzinsuffizienz bereits im Ruhezustand (NYHA IV)  | Information      | 46,7%              | 17,5%      |      |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | 1                | 50.732 von 108.703 | 24 von 137 |      |
| Anteil Behandlungsfälle mit Beschwerden bei Rechtsherzinsuffizienz bereits im Ruhezustand (NYHA IV) | Information      | 5,7%               | 0,0%       |      |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | 1                | 2.812 von 49.475   | 0 von 144  |      |

Linksherzkatheter

|                                                                                                                     |                   |                    |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------|--|
| Anzahl aller Linksherzkatheter zur Koronaragnostik                                                                  | Mengeninformation | 853 (778)          | n.a. |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                      | 2                 | 269.548            | <4   |  |
| Anteil der Behandlungen mit therapeutischem Linksherzkatheter ohne Hauptdiagnose Herzinfarkt und ohne Herzoperation | Information       | 38,5%              | n.a. |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                      | 1                 | 75.910 von 197.238 | <4   |  |

Herzrhythmusstörungen

|                                                              |                   |             |    |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----|--|
| Behandlungsfälle mit Herzrhythmusstörungen als Hauptdiagnose | Mengeninformation | 496,7 (340) | 86 |  |
|                                                              | 2                 | 177.317     |    |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

IQM Indikatoren

IQM  
Zielwert

[Quelle](#)

IQM  
Durchschnittswert

[Fallzahl](#)

Klinik  
Ist-Wert

[Fallzahl](#)

Klinik  
Erwartungs-  
wert

[SMR](#)

## Erkrankungen des Nervensystems und Schlaganfall

### Todesfälle bei allen Formen des Schlaganfalls

|                                           |                  |                    |            |      |
|-------------------------------------------|------------------|--------------------|------------|------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Schlaganfall | < Erwartungswert | 9,9%               | 10,7%      | 7,2% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre            | 1                | 10.243 von 103.310 | 13 von 121 |      |

### Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirninfarkt

|                                          |                  |                  |          |      |
|------------------------------------------|------------------|------------------|----------|------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirninfarkt | < Erwartungswert | 7,3%             | 11,0%    | 7,4% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre           | 1 / 5            | 6.524 von 88.895 | 8 von 73 |      |

|                                                                                                          |             |                   |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------|--|
| Anteil der Hirninfarkte mit medikamentöser Auflösung des Blutgerinnsels (Thrombolyse) ohne Zuverlegungen | Information | 18,3%             | n.a. |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                           | 1           | 15.042 von 82.056 | <4   |  |

|                                                                                                                        |             |                  |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|--|
| Anteil Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Hirninfarkt mit Entfernung des Blutgerinnsels durch Katheter (Thrombektomie) | Information | 10,2%            | 0,0%     |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                         | 1           | 9.128 von 89.875 | 0 von 73 |  |

|                                                                                    |                  |                  |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|--|
| davon Anteil der Hirninfarkte mit Lungenentzündung, die bei Aufnahme nicht bestand | Beobachtungswert | 6,3%             | 14,8%    |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                     | 1                | 5.557 von 87.601 | 9 von 61 |  |

|                                                                                               |                  |                 |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------|--|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirninfarkt mit Lungenentzündung, die bei Aufnahme nicht bestand | Beobachtungswert | 28,8%           | 22,2%   |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                | 1                | 1.602 von 5.557 | 2 von 9 |  |

|                                                          |                  |                  |          |  |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|--|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirnblutung (intrazerebral) | Beobachtungswert | 28,5%            | 15,6%    |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                           | 1                | 3.077 von 10.795 | 5 von 32 |  |

|                                                           |                  |               |          |  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------|--|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirnblutung (subarachnoidal) | Beobachtungswert | 18,3%         | 0,0%     |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                            | 1                | 637 von 3.474 | 0 von 16 |  |

|                                                                 |        |                 |           |  |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------|--|
| Anteil nicht näher bezeichneter Schlaganfälle als Hauptdiagnose | <0,42% | 0,23%           | 0,0%      |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                  | 1      | 243 von 104.755 | 0 von 122 |  |

### Behandlung auf einer Stroke Unit

|                                                                                     |             |                   |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------|--|
| Anteil Hauptdiagnose Hirninfarkte mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung | Information | 75,2%             | 0,0%     |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                      | 1           | 67.568 von 89.875 | 0 von 73 |  |

|                                                                                                                                                           |                  |                    |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------|--|
| Anteil mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung ohne Zuverlegungen (in Anlehnung an Schlaganfallregister) bei Hauptdiagnose Hirninfarkt oder TIA | Beobachtungswert | 76,6%              | n.a. |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                            | 1                | 87.746 von 114.496 | <4   |  |

|                                                                                                                                                          |             |                 |          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------|--|
| Anteil mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung nur Zuverlegungen (in Anlehnung an Schlaganfallregister) bei Hauptdiagnose Hirninfarkt oder TIA | Information | 49,9%           | 0,0%     |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                           | 1           | 3.762 von 7.536 | 0 von 71 |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                      | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                                                      | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |
| Epilepsie                                            |                        |                          |                          |                               |
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Epilepsie         | Mengeninformation      | 114,4 (38)               | n.a.                     |                               |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                       | 2                      | 39.017                   | <4                       |                               |
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Epilepsie         | Mengeninformation      | 48,8 (14)                | n.a.                     |                               |
| Alle Patient:innen < 20 Jahre                        | 2                      | 10.050                   | <4                       |                               |
| Multiple Sklerose                                    |                        |                          |                          |                               |
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Multiple Sklerose | Mengeninformation      | 39,3 (25)                | n.a.                     |                               |
|                                                      | 2                      | 8.832                    | <4                       |                               |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |

Altersmedizin

Mangelernährung bei Älteren

|                                                                                                                 |             |                      |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|--|
| Anteil Behandlungsfälle mit erheblicher Mangelernährung und ohne Tumorerkrankung                                | Information | 0,94%                | 0,07%       |  |
| Alle Patient:innen >= 65 Jahre                                                                                  | 1           | 22.315 von 2.366.261 | 1 von 1.364 |  |
| Anteil Behandlungsfälle mit Sonden-/Infusionsernährung bei erheblicher Mangelernährung und ohne Tumorerkrankung | Information | 2,0%                 | n.a.        |  |
| Alle Patient:innen >= 65 Jahre                                                                                  | 1           | 448 von 22.315       | <4          |  |

Delir

|                                                                      |             |                      |          |  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------|--|
| Anteil Behandlungsfälle mit aufgetretenem Delir an operierten Fällen | Information | 3,0%                 | 3,6%     |  |
| Alle Patient:innen >= 60 Jahre                                       | 1           | 38.725 von 1.271.087 | 1 von 28 |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    |  | Klinik Ist-Wert          |  | Klinik Erwartungs-wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--|------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> |  | <a href="#">Fallzahl</a> |  | <a href="#">SMR</a>    |

Lungenerkrankungen

Lungenentzündung (Pneumonie)

|                                                                                                     |                       |        |             |       |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-------------|-------|---------|-------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung                                                       | < Erwartungswert      | 12,6%  |             | 1,2%  |         | 16,2% |
| alle Altersgruppen                                                                                  | 1                     | 16.990 | von 134.678 | 2     | von 161 |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung ohne Zuverlegung, Tumor, Mukoviszidose                | < Erwartungswert      | 11,7%  |             | 0,0%  |         | 13,0% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | 1                     | 10.916 | von 93.320  | 0     | von 85  |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung ohne Zuverlegung, Tumor, Mukoviszidose, COVID-19      | < Erwartungswert      | 10,2%  |             | 0,0%  |         | 10,2% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | 1 / 5                 | 7.579  | von 74.468  | 0     | von 82  | 0,00  |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung ohne Zuverlegung, Tumor, Mukoviszidose                | Beobachtungswert (SE) | 0,31%  |             | n.a.  |         |       |
| Alle Patient:innen 1 bis 19 Jahre                                                                   | 1 / 4                 | 36     | von 11.775  | <4    |         |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung durch Aspiration von Nahrungsmitteln oder Mageninhalt | Beobachtungswert      | 28,8%  |             | 22,2% |         |       |
|                                                                                                     | 1                     | 3.376  | von 11.737  | 2     | von 9   |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Bronchitis oder Bronchiolitis ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose | < Erwartungswert      | 2,2%   |             | n.a.  |         |       |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | 1                     | 267    | von 12.100  | <4    |         |       |

COPD (Chronisch obstruktive Lungenkrankheit)

|                                   |                  |       |            |      |        |      |
|-----------------------------------|------------------|-------|------------|------|--------|------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose COPD | < Erwartungswert | 4,7%  |            | 0,0% |        | 5,8% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre    | 1                | 2.996 | von 63.883 | 0    | von 38 | 0,00 |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | <div>IQM<br/>Zielwert</div> <div><a href="#">Quelle</a></div> | <div>IQM<br/>Durchschnittswert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Ist-Wert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Erwartungs-<br/>wert</div> <div><a href="#">SMR</a></div> |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

Erkrankungen der Bauchorgane

Große Operationen am Dick- und Enddarm (Kolon und Rektum)

|                                                         |                   |           |   |  |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---|--|
| Behandlungsfälle mit Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn | Mengeninformation | 97,8 (63) | 9 |  |
|                                                         | 2                 | 36.971    |   |  |

Erkrankungen des Magens

|                                                                                                              |                  |                |          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------|--|
| Todesfälle bei Geschwüren an Magen, Zwölffingerdarm oder Dünndarm als Hauptdiagnose (mit und ohne Operation) | Beobachtungswert | 5,4%           | 0,0%     |  |
|                                                                                                              | 1                | 991 von 18.467 | 0 von 12 |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |

Gefäßoperationen

Eingriffe an der Hauptschlagader (Aorta)

|                                             |                  |                        |            |  |
|---------------------------------------------|------------------|------------------------|------------|--|
| Todesfälle bei rupturiertem Aortenaneurysma | Information<br>1 | 40,8%<br>734 von 1.799 | n.a.<br><4 |  |
|---------------------------------------------|------------------|------------------------|------------|--|

Arteriovenöser Shunt

|                                     |                        |                    |            |  |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------|------------|--|
| Anlegen eines arteriovenösen Shunts | Mengeninformation<br>2 | 27,7 (17)<br>5.213 | n.a.<br><4 |  |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------|------------|--|

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |

Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe

Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark

|                                                                                                                           |                   |                |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------|--|
| Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark (ohne lokale Schmerztherapie)                                            | Mengeninformation | 331,5 (212)    | 9       |  |
|                                                                                                                           | 2                 | 109.058        |         |  |
| Todesfälle bei anderen Operationen an der Wirbelsäule oder am Rückenmark                                                  | Beobachtungswert  | 1,8%           | 0,0%    |  |
|                                                                                                                           | 1                 | 374 von 20.396 | 0 von 9 |  |
| Behandlungsfälle mit Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen als Hauptdiagnose ohne Operation oder lokale Schmerztherapie | Mengeninformation | 133,9 (115)    | n.a.    |  |
|                                                                                                                           | 2                 | 49.963         | <4      |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

IQM Indikatoren

IQM  
Zielwert

[Quelle](#)

IQM  
Durchschnittswert

[Fallzahl](#)

Klinik  
Ist-Wert

[Fallzahl](#)

Klinik  
Erwartungs-  
wert

[SMR](#)

## Intensivmedizin

### Intensivmedizin

|                                                                                                                           |                       |                            |                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|--|
| Todesfälle bei Beatmung > 24 Stunden ohne Neugeborene                                                                     | Information<br>1      | 35,4%<br>30.990 von 87.630 | 21,3%<br>20 von 94 |  |
| Todesfälle bei Beatmung > 24 Stunden ohne Neugeborene und ohne COVID-19 Fälle                                             | <35,9%<br>1           | 34,8%<br>28.096 von 80.798 | 21,3%<br>19 von 89 |  |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger oder SIRS als Nebendiagnose                              | Beobachtungswert<br>1 | 37,4%<br>22.659 von 60.510 | 28,6%<br>2 von 7   |  |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger oder SIRS als Nebendiagnose mit Organkomplikation/Schock | Beobachtungswert<br>1 | 38,5%<br>22.214 von 57.675 | 28,6%<br>2 von 7   |  |
| Todesfälle bei generalisierter Entzündungsreaktion des gesamten Körpers ohne Organkomplikation (SIRS)                     | Information<br>1      | 7,2%<br>3.384 von 47.318   | 0,0%<br>0 von 8    |  |
| Anteil Todesfälle bei nicht-bakterieller Blutvergiftung (Sepsis)                                                          | Beobachtungswert<br>1 | 34,8%<br>155 von 446       | n.a.<br><4         |  |

### Angeborene Gerinnungsstörung und Bluttransfusion

|                                                                                                    |                        |                               |                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|--|
| Behandlungsfälle mit angeborenen Gerinnungsstörungen als Haupt- oder Nebendiagnose                 | Mengeninformation<br>2 | 28,9 (14)<br>10.632           | 17                |  |
| davon operierte Behandlungsfälle mit angeborenen Gerinnungsstörungen als Haupt- oder Nebendiagnose | Mengeninformation<br>2 | 19,5 (9)<br>6.847             | n.a.<br><4        |  |
| Anteil operierter Behandlungsfälle mit Bluttransfusion                                             | Information<br>1       | 7,5%<br>175.709 von 2.336.953 | 18,8%<br>6 von 32 |  |

### Obduktionen

|                |                  |                            |                  |  |
|----------------|------------------|----------------------------|------------------|--|
| Obduktionsrate | Information<br>1 | 0,84%<br>1.310 von 156.425 | 0,0%<br>0 von 40 |  |
|----------------|------------------|----------------------------|------------------|--|

## Leseanleitung zu den IQM-Indikatoren

### Lesebeispiel

Beim nachfolgenden Indikator „Todesfälle bei Hauptdiagnose Transmuraler Herzinfarkt (Alle Patient:innen  $\geq 20$  Jahre)“ liegt der Wert der durchschnittlichen Krankenhaussterblichkeit in der Bundesrepublik bei 12,2 % (Quelle: Statistisches Bundesamt). Daraus ergibt sich rechnerisch für das Beispielkrankenhaus aufgrund des Alters und Geschlechts der Patientinnen und Patienten des ausgewerteten Jahres eine zu erwartende Krankenhaussterblichkeit von 10,8 % **4** als Erwartungswert. Ziel der IQM-Mitgliedskrankenhäuser ist es, im Ergebnis unter diesem Erwartungswert zu liegen **1**. Der für das Beispielkrankenhaus tatsächlich gemessene Ist-Wert betrug in diesem Jahr 19,4 % **3** und lag damit über dem Krankenhaus-Erwartungswert für den Qualitätsindikator „Todesfälle bei Hauptdiagnose Transmuraler Herzinfarkt“. Der Durchschnittswert aller IQM-Mitgliedskrankenhäuser liegt bei diesem Indikator bei 11,0 % **2**.

|                                                                                                                          |                        |                          |                          |                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--|
| G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025                                                                                     |                        | Jahr:                    |                          | 2024                  |  |
| Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der <a href="#">Präambel</a> |                        |                          |                          |                       |  |
| IQM Indikatoren                                                                                                          | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungswert |  |
|                                                                                                                          | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>   |  |
| Herzerkrankungen                                                                                                         | 1                      | 2                        | 3                        | 4                     |  |
| Herzinfarkt                                                                                                              |                        |                          |                          |                       |  |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Transmuraler Herzinfarkt                                                                    | < Erwartungswert       | 11,0%                    | 19,4%                    | 10,8%                 |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                           | 1                      | 2.623 von 23.934         | 99 von 511               |                       |  |

### Die Indikatoren

Die von IQM verwendeten German/Swiss Inpatient Quality Indicators (G-IQI/CH-IQI) sind so ausgewählt, dass sie sowohl häufige und wichtige Krankheitsbilder als auch wichtige Verfahren abbilden. Alle Indikatoren werden aus den Routinedaten des Krankenhauses ohne zusätzliche Dokumentation abgeleitet, wodurch kein weiterer Dokumentationsaufwand entsteht.

## Was wird gemessen?

Hierbei unterscheiden wir **absolute Mengeninformationen** von **relativen Mengeninformationen**, bei denen z.B. ein Anteil bestimmter Operationsverfahren ausgewiesen wird.

Wesentlicher Messwert ist die **Sterblichkeit** bei verschiedenen Krankheitsbildern, auch wenn wir uns bewusst sind, dass Sterblichkeit im Krankenhaus auch bei bester Medizin nicht vermeidbar ist. Deswegen vergleichen wir die Sterblichkeit, wo verfügbar, mit bundesdurchschnittlichen Werten. Diese werden entweder aus Daten des **Statistischen Bundesamtes** oder aus Daten des **Forschungsdatenzentrums der statistischen Ämter des Bundes und der Länder** berechnet. Mit den Daten des Statistischen Bundesamtes wird eine **Risikogewichtung** für das **Alter** und das **Geschlecht** der Behandelten ermöglicht. Krankenhäuser mit einem hohen Anteil sehr alter Patient:innen weisen in der Regel eine andere Sterblichkeit auf als solche mit vergleichsweise jungen Patientinnen und Patienten.

Als wesentliche Orientierungshilfe zur Einordnung der Ergebnisse dient der **Erwartungswert**, da er besagt, welche Sterblichkeit bei einer Patientengruppe gleicher Alters- und Geschlechtsverteilung im Bundesdurchschnitt zu erwarten wäre. Für einige Indikatoren (G-IQI/CH-IQI 01.1, 02.1, 09.3, 14.26 und 21.311) kommen erweiterte **differenzierte Risikomodelle** zum Einsatz. Diese berücksichtigen zusätzlich Begleiterkrankungen, Erkrankungsschwere und den Zuverlegungsstatus. Insofern ergeben sich für unterschiedliche Krankenhäuser individuelle Erwartungswerte, da Unterschiede in der Alters- und Geschlechtszusammensetzung der Behandelten bestehen. Ziel der IQM-Krankenhäuser ist es, „bessere“ als die erwarteten Werte zu erreichen.

Die Beziehung zwischen erwarteter Sterblichkeit und dem tatsächlichen Wert des Krankenhauses nennt man wissenschaftlich **„standardized mortality rate“** oder kurz **„SMR“**. Liegt diese Quote unter 1, dann ist die tatsächliche Sterblichkeit im Krankenhaus für den gemessenen Indikator geringer als die zu erwartende, liegt sie über 1, ist die Sterblichkeit höher als eigentlich erwartet. Ein solcher Wert ist lediglich bei den Indikatoren errechenbar, bei denen die zu erwartende Sterblichkeit aus den Daten des Statistischen Bundesamtes ermittelt werden kann.

Liegen keine alters- und geschlechtsgewichteten Werte für einen Indikator vor, kann auch kein Erwartungswert errechnet werden. Wir sind uns ebenso bewusst, dass die Sterblichkeit bei manchen Indikatoren ein ausgesprochen seltenes Ereignis ist und nicht als alleiniger Nachweis der medizinischen Qualität gelten darf. Die im „low risk“-Bereich gemessene Sterblichkeit ermöglicht in nachfolgenden Analysen dieser seltenen Ereignisse, wichtige Verbesserungspotentiale zu heben.

## Glossar zur Ergebnisveröffentlichung

Hier finden Sie eine Erläuterung der wichtigsten Begriffe und Kennzahlen, die in dieser Veröffentlichung verwendet werden:

### **IQM Zielwert - Quellen (Herkunft und Berechnung):**

Die Referenz- bzw. Zielwerte für die Indikatoren basieren auf verschiedenen Quellen. Die jeweilige Quelle wird durch eine Nummer unter dem „IQM Zielwert“ angegeben:

- 1: Forschungsdatenzentren der statistischen Ämter des Bundes und der Länder, DRG-Statistik 2022. Eigene Berechnungen. Diese Daten bilden auch die Grundlage für die Berechnung der klinikindividuellen Erwartungswerte, standardisiert nach Alter und Geschlecht.
- 2: Gleiche Quelle wie 1; jedoch speziell für Mengenindikatoren: Die mittlere Fallzahl (Median in Klammern) für IQM-Mitgliedskrankenhäuser mit entsprechender Leistung im Jahr 2022.
- 3: Der Zielwert ist hier nicht identisch mit dem Bundeswert und wurde entnommen aus: Kaiser D (2007) Mindestmengen aus thoraxchirurgischer Sicht. Chirurg, 78(11): 1012-1017
- 4: Sentinel Event: Kennzahl wurde im G-IQI Kolloquium als Sentinel Event eingestuft (seltene Ereignisse, die man nicht erwartet). Weitere Infos dazu in den G-IQI FAQs.
- 5: Differenziertes Risikomodell zur Berechnung der Erwartungswerte; basierend auf Daten der Forschungsdatenzentren der statistischen Ämter des Bundes und der Länder, DRG-Statistik 2022. Eigene Berechnungen.
- 6: Empfehlung aus der Beschlussfassung der G-IQI Version 5.5 im Kolloquium II durch den wissenschaftlichen Beirat des IQM e.V.

### **IQM-Durchschnittswert - Fallzahl:**

Der IQM-Durchschnittswert gibt die mittleren Ergebnisse über alle Patient:innen an, die im Beobachtungszeitraum in IQM-Mitgliedskrankenhäusern (D) behandelt wurden. Mengenangaben werden als Durchschnittswert und zusätzlich in Klammern als Median dargestellt.

### **Krankenhaus Erwartungswert:**

Dieser Wert beschreibt die erwartete Sterblichkeit der Patient:innen, basierend auf Alters- und Geschlechtsverteilung. Er wird nur für Indikatoren berechnet, bei denen Vergleichszahlen des Bundesdurchschnitts vorliegen.

Für einige Indikatoren (G-IQI/CH-IQI 01.1, 02.1, 09.3, 14.26 und 21.311) kommen erweiterte differenzierte Risikomodelle zum Einsatz. Diese berücksichtigen zusätzlich Begleiterkrankungen, Erkrankungsschwere und den Zuverlegungsstatus.

### **SMR:**

Die SMR (standardized mortality ratio) ist das Verhältnis von beobachteter Sterblichkeit (Durchschnittswert) und dem Erwartungswert.

### **Hinweis zum Indikator „Obduktionsrate“:**

Die Anzahl der ausgewiesenen Obduktionen kann unvollständig sein, da nicht alle Krankenhaus-Dokumentationssysteme eine vollständige bzw. nachträgliche Kodierung nach Entlassung (bzw. Tod) unterstützen.

### **Fallzahlen und Mindestgrenzen:**

Ergebnisse einer Kennzahl werden nur dann im Detail dargestellt, wenn mindestens 4 oder mehr Fälle im Nenner aufgetreten sind. Bei Unterschreiten dieser Grenze wird dann die Angabe „<4“ ausgewiesen.

Ergebnisse, die sich auf sehr seltene Ereignisse beziehen, werden mit bis zu 4 Nachkommastellen ausgewiesen, um bei hohen Grundgesamtheiten ein Ergebnis zwischen 0 und 1 ausweisen zu können.