

## Ergebnisdarstellung und Nutzung der Indikatoren-Sets

Im Sinne einer transparenten und fundierten Qualitätsanalyse möchten wir Ihnen mit dieser Veröffentlichung eine strukturierte Orientierungshilfe zu den dargestellten Ergebnissen bieten. Die Nutzung der Indikatoren-Sets ermöglicht eine präzise Einordnung der Resultate und unterstützt eine gezielte Analyse.

Mit der Versionierung auf G-IQI/CH-IQI 5.5 wurden einige Indikatoren als **Sentinel Events** klassifiziert, um besonders kritische Ereignisse klar zu kennzeichnen. Diese sind in der Spalte „IQM Zielwert“ mit dem Zusatz „SE“ ausgewiesen.

Zudem wurde die **Bezeichnung der G-IQI/CH-IQI systematisch überarbeitet**, um eine bessere Verständlichkeit und Konsistenz zu gewährleisten. Die Anpassungen dieser Terminologie spiegeln sich auch in diesem Dokument wider.

Wir laden Sie ein, die Ergebnisse unter diesen Aspekten zu betrachten und für Ihre weiterführenden Analysen zu nutzen.

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

## IQM Indikatoren

[Qualitätsbericht](#)

[QSR-Mehrjahresergebnisse](#)

### Inhaltsverzeichnis

|                                                    |                      |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Herzerkrankungen                                   | <a href="#">2024</a> | <a href="#">2023</a> |
| Erkrankungen des Nervensystems und Schlaganfall    | <a href="#">2024</a> | <a href="#">2023</a> |
| Altersmedizin                                      | <a href="#">2024</a> | <a href="#">2023</a> |
| Lungenerkrankungen                                 | <a href="#">2024</a> | <a href="#">2023</a> |
| Erkrankungen der Bauchorgane                       | <a href="#">2024</a> | <a href="#">2023</a> |
| Gefäßoperationen                                   | <a href="#">2024</a> | <a href="#">2023</a> |
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe                   | <a href="#">2024</a> | <a href="#">2023</a> |
| Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe | <a href="#">2024</a> | <a href="#">2023</a> |
| Urologie                                           | <a href="#">2024</a> | <a href="#">2023</a> |
| Hautkrankheiten                                    | <a href="#">2024</a> | <a href="#">2023</a> |
| Intensivmedizin                                    | <a href="#">2024</a> | <a href="#">2023</a> |
| Palliativmedizin                                   | <a href="#">2024</a> | <a href="#">2023</a> |
| Roboterassistierte Eingriffe                       | <a href="#">2024</a> | <a href="#">2023</a> |

[Lesehilfe](#)

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

Präambel

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |

## Herzerkrankungen

### Herzinfarkt

|                                                                      |                  |                   |           |       |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------|-------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Herzinfarkt                             | < Erwartungswert | 7,1%              | 0,0%      | 5,6%  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | 1 / 5            | 5.037 von 70.894  | 0 von 30  | 0,00  |
| Anteil der Herzinfarkte mit Linksherzkatheter                        | Information      | 86,0%             | 0,0%      |       |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | 1                | 60.951 von 70.894 | 0 von 30  |       |
| Todesfälle bei Direktaufnahme ohne Verlegung                         | Beobachtungswert | 7,1%              | 0,0%      |       |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | 1                | 4.544 von 64.327  | 0 von 30  |       |
| Anteil transmuraler Herzinfarkte (STEMI)                             | Information      | 33,8%             | 40,0%     |       |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | 1                | 23.934 von 70.824 | 12 von 30 |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Transmuraler Herzinfarkt                | < Erwartungswert | 11,0%             | 0,0%      | 10,1% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | 1                | 2.623 von 23.934  | 0 von 12  |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Nicht-transmuraler Herzinfarkt (NSTEMI) | < Erwartungswert | 4,7%              | 0,0%      | 5,9%  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | 1                | 2.188 von 46.325  | 0 von 17  |       |
| Todesfälle bei Nebendiagnose Herzinfarkt                             | Beobachtungswert | 17,3%             | 11,1%     |       |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | 1                | 3.490 von 20.146  | 1 von 9   |       |

### Herzinsuffizienz

|                                                                                                     |                  |                    |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------|-------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Herzinsuffizienz                                                       | < Erwartungswert | 7,6%               | 5,3%      | 11,1% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | 1 / 5            | 12.766 von 166.959 | 2 von 38  | 0,47  |
| Anteil Behandlungsfälle mit Beschwerden bei Linksherzinsuffizienz bereits im Ruhezustand (NYHA IV)  | Information      | 46,6%              | 72,7%     |       |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | 1                | 53.334 von 114.561 | 16 von 22 |       |
| Anteil Behandlungsfälle mit Beschwerden bei Rechtsherzinsuffizienz bereits im Ruhezustand (NYHA IV) | Information      | 5,5%               | 0,0%      |       |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | 1                | 2.710 von 49.553   | 0 von 15  |       |

### Herzrhythmusstörungen

|                                                              |                   |             |    |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----|--|
| Behandlungsfälle mit Herzrhythmusstörungen als Hauptdiagnose | Mengeninformation | 515,0 (355) | 11 |  |
|                                                              | 2                 | 186.941     |    |  |

### Versorgung mit Schrittmacher oder Defibrillator

|                                                     |                   |             |   |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------|---|--|
| Versorgung mit Herzschrittmacher oder Defibrillator | Mengeninformation | 152,3 (107) | 5 |  |
|                                                     | 2                 | 47.357      |   |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |

Erkrankungen des Nervensystems und Schlaganfall

Todesfälle bei allen Formen des Schlaganfalls

|                                           |                  |                    |         |      |
|-------------------------------------------|------------------|--------------------|---------|------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Schlaganfall | < Erwartungswert | 9,7%               | 0,0%    | 6,2% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre            | 1                | 10.387 von 107.151 | 0 von 6 |      |

Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirninfarkt

|                                          |                  |                  |         |      |
|------------------------------------------|------------------|------------------|---------|------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirninfarkt | < Erwartungswert | 7,1%             | 0,0%    | 7,8% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre           | 1 / 5            | 6.511 von 92.264 | 0 von 5 |      |

|                                                                                                          |             |                   |         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------|--|
| Anteil der Hirninfarkte mit medikamentöser Auflösung des Blutgerinnsels (Thrombolyse) ohne Zuverlegungen | Information | 18,4%             | 0,0%    |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                           | 1           | 15.600 von 84.989 | 0 von 5 |  |

|                                                                                                                        |             |                  |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------|--|
| Anteil Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Hirninfarkt mit Entfernung des Blutgerinnsels durch Katheter (Thrombektomie) | Information | 10,7%            | 0,0%    |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                         | 1           | 9.955 von 93.342 | 0 von 5 |  |

|                                                                 |        |                 |         |  |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------|--|
| Anteil nicht näher bezeichneter Schlaganfälle als Hauptdiagnose | <0,42% | 0,24%           | 16,67%  |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                  | 1      | 259 von 108.712 | 1 von 6 |  |

|                                                                        |                  |            |      |  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------|--|
| Todesfälle bei nicht näher bezeichnetem Schlaganfall als Hauptdiagnose | Beobachtungswert | 7,3%       | n.a. |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                         | 1                | 19 von 259 | <4   |  |

|                                                                         |                       |               |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------|--|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose TIA ohne Neubildungen und Kopfverletzungen | Beobachtungswert (SE) | 0,2763%       | n.a. |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                          | 1 / 4                 | 96 von 34.751 | <4   |  |

Behandlung auf einer Stroke Unit

|                                                                                     |             |                   |         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------|--|
| Anteil Hauptdiagnose Hirninfarkte mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung | Information | 76,3%             | 0,0%    |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                      | 1           | 71.261 von 93.342 | 0 von 5 |  |

|                                                                            |             |                   |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------|--|
| Anteil Hauptdiagnose TIA mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung | Information | 76,7%             | n.a. |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                             | 1           | 26.855 von 34.991 | <4   |  |

|                                                                                                                                                           |                  |                    |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------|--|
| Anteil mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung ohne Zuverlegungen (in Anlehnung an Schlaganfallregister) bei Hauptdiagnose Hirninfarkt oder TIA | Beobachtungswert | 78,2%              | 0,0%    |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                            | 1                | 94.089 von 120.268 | 0 von 6 |  |

Multiple Sklerose

|                                                      |                   |           |      |  |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------|--|
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Multiple Sklerose | Mengeninformation | 35,4 (22) | n.a. |  |
|                                                      | 2                 | 8.345     | <4   |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungs-wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>    |

Altersmedizin

Mangelernährung bei Älteren

|                                                                                                                 |             |                      |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|--|
| Anteil Behandlungsfälle mit erheblicher Mangelernährung und ohne Tumorerkrankung                                | Information | 0,88%                | 0,45%        |  |
| Alle Patient:innen >= 65 Jahre                                                                                  | 1           | 21.895 von 2.486.668 | 11 von 2.458 |  |
| Anteil Behandlungsfälle mit Sonden-/Infusionsernährung bei erheblicher Mangelernährung und ohne Tumorerkrankung | Information | 1,8%                 | 18,2%        |  |
| Alle Patient:innen >= 65 Jahre                                                                                  | 1           | 387 von 21.895       | 2 von 11     |  |

Delir

|                                                                      |             |                      |              |  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|--|
| Anteil Behandlungsfälle mit aufgetretenem Delir an operierten Fällen | Information | 3,0%                 | 2,2%         |  |
| Alle Patient:innen >= 60 Jahre                                       | 1           | 40.039 von 1.327.814 | 63 von 2.896 |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

Präambel

| IQM Indikatoren                                                                                     | IQM Zielwert          | IQM Durchschnittswert |             | Klinik Ist-Wert |        | Klinik Erwartungs-wert |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------|--------|------------------------|
|                                                                                                     | Quelle                | Fallzahl              |             | Fallzahl        |        | SMR                    |
| Lungenerkrankungen                                                                                  |                       |                       |             |                 |        |                        |
| Lungenentzündung (Pneumonie)                                                                        |                       |                       |             |                 |        |                        |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung                                                       | < Erwartungswert      | 10,0%                 |             | 4,9%            |        | 14,9%                  |
| alle Altersgruppen                                                                                  | 1                     | 16.307                | von 162.332 | 4               | von 81 |                        |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung ohne Zuverlegung, Tumor, Mukoviszidose                | < Erwartungswert      | 9,2%                  |             | 2,9%            |        | 11,9%                  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | 1                     | 10.353                | von 112.464 | 2               | von 68 |                        |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung ohne Zuverlegung, Tumor, Mukoviszidose, COVID-19      | < Erwartungswert      | 8,6%                  |             | 3,1%            |        | 10,3%                  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | 1 / 5                 | 8.604                 | von 100.621 | 2               | von 64 | 0,30                   |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung ohne Zuverlegung, Tumor, Mukoviszidose                | Beobachtungswert (SE) | 0,15%                 |             | n.a.            |        |                        |
| Alle Patient:innen 1 bis 19 Jahre                                                                   | 1 / 4                 | 28                    | von 18.387  | <4              |        |                        |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung durch Aspiration von Nahrungsmitteln oder Mageninhalt | Beobachtungswert      | 27,8%                 |             | 25,0%           |        |                        |
|                                                                                                     | 1                     | 3.446                 | von 12.409  | 1               | von 4  |                        |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Bronchitis oder Bronchiolitis ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose | < Erwartungswert      | 1,9%                  |             | n.a.            |        |                        |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | 1                     | 244                   | von 13.186  | <4              |        |                        |
| COPD (Chronisch obstruktive Lungenerkrankheit)                                                      |                       |                       |             |                 |        |                        |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose COPD                                                                   | < Erwartungswert      | 4,4%                  |             | 15,4%           |        | 6,5%                   |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | 1                     | 2.907                 | von 66.452  | 2               | von 13 | 2,38                   |
| Lungenkrebs                                                                                         |                       |                       |             |                 |        |                        |
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Lungenkrebs                                                      | Mengeninformation     | 191,4 (52)            |             | 11              |        |                        |
|                                                                                                     | 2                     | 66.602                |             |                 |        |                        |
| Operationen an der Lunge                                                                            |                       |                       |             |                 |        |                        |
| Todesfälle bei größeren operativen Entfernungen von Lunge/Bronchien                                 | Beobachtungswert      | 2,5%                  |             | n.a.            |        |                        |
|                                                                                                     | 1                     | 329                   | von 13.179  | <4              |        |                        |
| Todesfälle bei operativer Teilentfernung eines Lungenflügels bei Lungenkrebs                        | <2,0%                 | 1,9%                  |             | n.a.            |        |                        |
|                                                                                                     | 1                     | 116                   | von 6.079   | <4              |        |                        |
| Anteil der operativen Entfernungen eines Lungenflügels bei Lungenkrebsbehandlungsfällen             | <20%                  | 3,1%                  |             | n.a.            |        |                        |
|                                                                                                     | 1 / 3                 | 195                   | von 6.274   | <4              |        |                        |
| Anteil der broncho-/angioplastischen Entfernungen eines Lungenflügels bei Lungenkrebsbehandlungen   | Beobachtungswert      | 7,1%                  |             | n.a.            |        |                        |
|                                                                                                     | 1                     | 433                   | von 6.079   | <4              |        |                        |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    |  |  | Klinik Ist-Wert          |  |  | Klinik Erwartungswert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--|--|--------------------------|--|--|-----------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> |  |  | <a href="#">Fallzahl</a> |  |  | <a href="#">SMR</a>   |

Erkrankungen der Bauchorgane

Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen (ohne Tumor)

|                                                                                      |             |         |     |        |        |     |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----|--------|--------|-----|-----|--|
| Anteil laparoskopischer Operationen bei Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen | >95,1%      | 96,0%   |     |        | 100,0% |     |     |  |
|                                                                                      | 1           | 50.963  | von | 53.069 | 172    | von | 172 |  |
| Todesfälle bei Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen                          | <0,60% (SE) | 0,4541% |     |        | 0,0%   |     |     |  |
|                                                                                      | 1 / 4       | 241     | von | 53.069 | 0      | von | 172 |  |

Operation von Leisten-, Schenkel- und Nabelbrüchen (Hernien)

|                                                                   |                  |         |     |        |        |     |     |  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----|--------|--------|-----|-----|--|
| Todesfälle bei Bruchoperationen ohne anteilige Darmentfernung     | <0,12% (SE)      | 0,1007% |     |        | 0,0%   |     |     |  |
|                                                                   | 1 / 4            | 71      | von | 70.497 | 0      | von | 491 |  |
| Todesfälle bei Bruchoperationen mit anteiliger Darmentfernung     | Beobachtungswert | 2,3%    |     |        | n.a.   |     |     |  |
|                                                                   | 1                | 144     | von | 6.140  | <4     |     |     |  |
| Anteil Behandlungsfälle mit Leistenbruchoperation mit Netzeinlage | Information      | 9,7%    |     |        | n.a.   |     |     |  |
| Alle Patient:innen < 20 Jahre                                     | 1                | 290     | von | 2.984  | <4     |     |     |  |
| Anteil Behandlungsfälle mit Leistenbruchoperation mit Netzeinlage | Information      | 98,2%   |     |        | 100,0% |     |     |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                    | 1                | 44.462  | von | 45.266 | 324    | von | 324 |  |

Eingriffe an der Schilddrüse

|                                                                                      |                   |           |     |        |      |     |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----|--------|------|-----|----|--|
| Behandlungsfälle mit operativer Entfernung der Schilddrüse                           | Mengeninformation | 61,6 (24) |     |        | 25   |     |    |  |
|                                                                                      | 2                 | 17.239    |     |        |      |     |    |  |
| Behandlungsfälle mit operativer Entfernung der Schilddrüse bei Schilddrüsenkrebs     | Mengeninformation | 13,2 (6)  |     |        | n.a. |     |    |  |
|                                                                                      | 2                 | 2.639     |     |        | <4   |     |    |  |
| Behandlungsfälle mit operativer Entfernung der Schilddrüse bei gutartiger Erkrankung | Mengeninformation | 51,6 (22) |     |        | 20   |     |    |  |
|                                                                                      | 2                 | 13.633    |     |        |      |     |    |  |
| Anteil der Beatmungsfälle (> 24 Std.) nach Schilddrüseneingriff                      | Information (SE)  | 0,55%     |     |        | 0,0% |     |    |  |
|                                                                                      | 1 / 4             | 89        | von | 16.263 | 0    | von | 23 |  |

Große Operationen am Dick- und Enddarm (Kolon und Rektum)

|                                                                                     |                   |            |     |        |      |     |    |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----|--------|------|-----|----|------|
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Dick-/Enddarmkrebs                               | Mengeninformation | 129,6 (84) |     |        | 41   |     |    |      |
|                                                                                     | 2                 | 44.981     |     |        |      |     |    |      |
| Behandlungsfälle mit Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn                             | Mengeninformation | 99,5 (62)  |     |        | 33   |     |    |      |
|                                                                                     | 2                 | 38.009     |     |        |      |     |    |      |
| Todesfälle bei operativer Entfernung des Dick-/Enddarms                             | Beobachtungswert  | 7,4%       |     |        | 4,3% |     |    |      |
|                                                                                     | 1                 | 2.681      | von | 36.051 | 3    | von | 70 |      |
| Todesfälle bei operativer Dickdarmentfernung bei Krebs ohne komplizierende Diagnose | < Erwartungswert  | 3,3%       |     |        | 4,8% |     |    | 2,5% |
|                                                                                     | 1 / 5             | 293        | von | 8.881  | 1    | von | 21 | 1,92 |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                                                              | IQM Zielwert      | IQM Durchschnittswert |     |        | Klinik Ist-Wert |     |    | Klinik Erwartungs-<br>wert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----|--------|-----------------|-----|----|----------------------------|
|                                                                                                              | Quelle            | Fallzahl              |     |        | Fallzahl        |     |    | SMR                        |
|                                                                                                              |                   |                       |     |        |                 |     |    |                            |
| Todesfälle bei operativer Dickdarmentfernung bei Krebs mit komplizierender Diagnose                          | Beobachtungswert  | 10,5%                 |     |        | n.a.            |     |    |                            |
|                                                                                                              | 1                 | 272                   | von | 2.590  | <4              |     |    |                            |
| Todesfälle bei operativer Enddarmentfernung bei Krebs                                                        | <3,2%             | 2,5%                  |     |        | 0,0%            |     |    |                            |
|                                                                                                              | 1                 | 105                   | von | 4.184  | 0               | von | 4  |                            |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Divertikel ohne Abszess/Perforation                | <0,72% (SE)       | 0,6938%               |     |        | 0,0%            |     |    |                            |
|                                                                                                              | 1 / 4             | 14                    | von | 2.018  | 0               | von | 12 |                            |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Divertikel mit Abszess/Perforation                 | Beobachtungswert  | 5,5%                  |     |        | 0,0%            |     |    |                            |
|                                                                                                              | 1                 | 259                   | von | 4.729  | 0               | von | 14 |                            |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Darmischämie                                       | Information       | 42,9%                 |     |        | n.a.            |     |    |                            |
|                                                                                                              | 1                 | 904                   | von | 2.109  | <4              |     |    |                            |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn                 | Beobachtungswert  | 2,6%                  |     |        | n.a.            |     |    |                            |
|                                                                                                              | 1                 | 54                    | von | 2.076  | <4              |     |    |                            |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei anderen Diagnosen                                  | Information       | 8,2%                  |     |        | 8,3%            |     |    |                            |
|                                                                                                              | 1                 | 780                   | von | 9.464  | 1               | von | 12 |                            |
| Anteil operative Leberentfernung bei Entfernung des Dick-/Enddarms bei Dick- und Enddarmkrebs                | Information       | 4,1%                  |     |        | 0,0%            |     |    |                            |
|                                                                                                              | 1                 | 648                   | von | 15.655 | 0               | von | 28 |                            |
| Behandlungsfälle mit roboterassistiertem Eingriff bei Krebserkrankung des Darms                              | Information       | 20,1%                 |     |        | 0,0%            |     |    |                            |
|                                                                                                              | 1                 | 3.153                 | von | 15.655 | 0               | von | 28 |                            |
| Erkrankungen des Magens                                                                                      |                   |                       |     |        |                 |     |    |                            |
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Magenkrebs (mit und ohne Magenoperation)                                  | Mengeninformation | 44,9 (25)             |     |        | 6               |     |    |                            |
|                                                                                                              | 2                 | 14.822                |     |        |                 |     |    |                            |
| Todesfälle bei Geschwüren an Magen, Zwölffingerdarm oder Dünndarm als Hauptdiagnose (mit und ohne Operation) | Beobachtungswert  | 5,1%                  |     |        | 0,0%            |     |    |                            |
|                                                                                                              | 1                 | 983                   | von | 19.463 | 0               | von | 6  |                            |
| Behandlungsfälle mit Magenentfernungen                                                                       | Mengeninformation | 38,2 (11)             |     |        | 136             |     |    |                            |
|                                                                                                              | 2                 | 10.463                |     |        |                 |     |    |                            |
| Todesfälle bei operativer Magenentfernung bei Magenkrebs ohne Speiseröhreneingriff                           | Beobachtungswert  | 5,3%                  |     |        | 0,0%            |     |    |                            |
|                                                                                                              | 1                 | 100                   | von | 1.881  | 0               | von | 4  |                            |



G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                                                             | <div>IQM Zielwert</div> <div><a href="#">Quelle</a></div> | <div>IQM Durchschnittswert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik Ist-Wert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik Erwartungs-wert</div> <div><a href="#">SMR</a></div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             |                                                           |                                                                      |                                                                |                                                                  |
| Todesfälle bei operativer Magenentfernung bei anderer Diagnose (nicht Magenkrebs) ohne Speiseröhreneingriff | <div>Beobachtungswert</div> <div>1</div>                  | <div>2,9%</div> <div>244 von 8.389</div>                             | <div>0,0%</div> <div>0 von 132</div>                           |                                                                  |
| Adipositaschirurgie                                                                                         |                                                           |                                                                      |                                                                |                                                                  |
| Todesfälle im Rahmen der Adipositaschirurgie                                                                | <div>Beobachtungswert (SE)</div> <div>1 / 4</div>         | <div>0,0635%</div> <div>7 von 11.029</div>                           | <div>0,0%</div> <div>0 von 128</div>                           |                                                                  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungs-wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>    |

Gefäßoperationen

Eingriffe an der Hauptschlagader (Aorta)

|                                             |             |       |     |       |      |    |  |
|---------------------------------------------|-------------|-------|-----|-------|------|----|--|
| Todesfälle bei rupturiertem Aortenaneurysma | Information | 41,9% |     |       | n.a. |    |  |
|                                             | 1           | 801   | von | 1.911 |      | <4 |  |

Eingriffe der Becken-/Bein-Arterien

|                                                          |             |        |     |        |      |     |   |
|----------------------------------------------------------|-------------|--------|-----|--------|------|-----|---|
| Todesfälle bei Operationen der Becken-/Beinarterien      | Information | 5,5%   |     |        | 0,0% |     |   |
|                                                          | 1           | 1.525  | von | 27.921 | 0    | von | 8 |
| davon Todesfälle bei Schaufensterkrankheit (Claudicatio) | <0,33% (SE) | 0,301% |     |        | 0,0% |     |   |
|                                                          | 1 / 4       | 17     | von | 5.647  | 0    | von | 4 |
| davon Todesfälle bei Ruheschmerz                         | <2,3%       | 1,7%   |     |        | n.a. |     |   |
|                                                          | 1           | 38     | von | 2.179  |      | <4  |   |

PTA (Perkutan transluminale Gefäßinterventionen)

|                                                                                    |                  |       |     |        |      |     |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-----|--------|------|-----|----|
| Todesfälle bei Wiedereröffnung eines verschlossenen Gefäßes mittels Ballonkatheter | Beobachtungswert | 2,9%  |     |        | 0,0% |     |    |
|                                                                                    | 1                | 1.699 | von | 57.910 | 0    | von | 33 |

Arteriovenöser Shunt

|                                     |                   |           |  |  |      |    |  |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|--|--|------|----|--|
| Anlegen eines arteriovenösen Shunts | Mengeninformation | 28,9 (16) |  |  | n.a. |    |  |
|                                     | 2                 | 5.344     |  |  |      | <4 |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

Präambel

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |

## Frauenheilkunde und Geburtshilfe

### Geburtshilfe

|                                                    |                       |                             |                      |  |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| Mütterliche Todesfälle bei der Geburt              | <0,005% (SE)<br>1 / 4 | 0,0041%<br>9 von 219.797    | 0,0%<br>0 von 609    |  |
| Anteil vaginale Geburten mit Dammriss 4. Grades    | <0,125% (SE)<br>1 / 4 | 0,1066%<br>155 von 145.432  | 0,3289%<br>1 von 304 |  |
| Anteil vaginale Geburten mit Dammschnitt           | Information<br>1      | 9,1%<br>13.162 von 145.432  | 16,4%<br>50 von 304  |  |
| Anteil Kaiserschnitt an allen Geburten             | Information<br>1      | 33,8%<br>74.365 von 219.797 | 50,1%<br>305 von 609 |  |
| Anteil Kaiserschnitte bei risikoarmer Geburt       | Information<br>1      | 28,7%<br>55.478 von 193.134 | 46,0%<br>257 von 559 |  |
| davon Anteil Kaiserschnitte bei risikoarmer Geburt | Information<br>1      | 26,4%<br>37.312 von 141.193 | 44,6%<br>180 von 404 |  |
| Alle Patient:innen < 35 Jahre                      |                       |                             |                      |  |
| davon Anteil Kaiserschnitte bei risikoarmer Geburt | Information<br>1      | 35,0%<br>18.166 von 51.941  | 49,7%<br>77 von 155  |  |
| Alle Patient:innen > 34 Jahre                      |                       |                             |                      |  |

### Neugeborene

|                                                                |                        |                         |            |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|--|
| davon Neugeborene mit Geburtsgewicht von 1.250 bis 1.499 Gramm | Mengeninformation<br>2 | 10,0 (9)<br>894         | n.a.<br><4 |  |
| davon Neugeborene mit Geburtsgewicht von 1.500 bis 2.499 Gramm | Mengeninformation<br>2 | 66,4 (24)<br>13.148     | 9          |  |
| davon Neugeborene mit Geburtsgewicht > 2.500 Gramm             | Mengeninformation<br>2 | 1056,9 (776)<br>218.786 | 603        |  |

### Frauenheilkunde

|                                                                                                            |                      |                            |                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|--|
| Todesfälle bei operativer Entfernung der Gebärmutter bei gutartigen Erkrankungen                           | <0,04% (SE)<br>1 / 4 | 0,0364%<br>8 von 21.973    | 0,0%<br>0 von 157    |  |
| Alle Patient:innen > 14 Jahre                                                                              |                      |                            |                      |  |
| Anteil der Behandlungsfälle mit vaginaler/laparoskopischer Gebärmutterentfernung ohne plastische Operation | >88,4%<br>1          | 90,5%<br>19.712 von 21.793 | 94,9%<br>149 von 157 |  |
| Alle Patient:innen > 14 Jahre                                                                              |                      |                            |                      |  |
| Anteil der Behandlungsfälle mit vaginaler Entfernung durch Zerkleinerung der Gebärmutter                   | Information<br>1     | 25,4%<br>5.546 von 21.793  | 16,6%<br>26 von 157  |  |
| Alle Patient:innen > 14 Jahre                                                                              |                      |                            |                      |  |
| Anteil der Behandlungsfälle mit laparoskopischer Gebärmutterentfernung ohne plastische Operation           | Information<br>1     | 65,0%<br>14.166 von 21.793 | 78,3%<br>123 von 157 |  |
| Alle Patient:innen > 14 Jahre                                                                              |                      |                            |                      |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                                                                    | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungswert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                    | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>   |
| Anteil der Behandlungsfälle mit Eierstock- und Gebärmutterentfernung bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose | Information            | 5,5%                     | 11,1%                    |                       |
| Alle Patient:innen > 14 und < 50 Jahre                                                                             | 1                      | 391 von 7.162            | 4 von 36                 |                       |
| Anteil der Behandlungsfälle mit Eierstock- und Gebärmutterentfernung bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose | Information            | 33,7%                    | 28,9%                    |                       |
| Alle Patient:innen >= 50 Jahre                                                                                     | 1                      | 2.811 von 8.334          | 13 von 45                |                       |
| Bösartige Neubildungen der Brust und der weiblichen Geschlechtsorgane                                              |                        |                          |                          |                       |
| Behandlungsfälle mit Krebserkrankung der Brust oder der Geschlechtsorgane als Hauptdiagnose                        | Mengeninformation      | 209,8 (60)               | 305                      |                       |
|                                                                                                                    | 2                      | 71.973                   |                          |                       |
| Behandlungsfälle mit Eierstockkrebs als Hauptdiagnose                                                              | Mengeninformation      | 31,1 (12)                | 4                        |                       |
|                                                                                                                    | 2                      | 9.486                    |                          |                       |
| Behandlungsfälle mit Gebärmutterkrebs als Hauptdiagnose                                                            | Mengeninformation      | 52,3 (29)                | 12                       |                       |
|                                                                                                                    | 2                      | 14.604                   |                          |                       |
| Todesfälle nach Gebärmutterentfernung bei Gebärmutterkrebs                                                         | Beobachtungswert (SE)  | 0,51%                    | 0,0%                     |                       |
|                                                                                                                    | 1 / 4                  | 29 von 5.680             | 0 von 10                 |                       |
| Behandlungsfälle mit Brustkrebs als Hauptdiagnose                                                                  | Mengeninformation      | 133,9 (26)               | 286                      |                       |
|                                                                                                                    | 2                      | 44.064                   |                          |                       |
| Eingriffe an der Brust                                                                                             |                        |                          |                          |                       |
| Eingriffe an der Brust                                                                                             | Mengeninformation      | 187,6 (150)              | 476                      |                       |
|                                                                                                                    | 2                      | 39.772                   |                          |                       |
| Operationen der Brust bei Brustkrebs                                                                               | Mengeninformation      | 167,7 (148)              | 294                      |                       |
|                                                                                                                    | 2                      | 28.682                   |                          |                       |
| Anteil brusterhaltender Operationen bei Brustkrebs                                                                 | Information            | 71,9%                    | 75,9%                    |                       |
|                                                                                                                    | 1                      | 20.621 von 28.682        | 223 von 294              |                       |
| Eingriffe am Beckenboden bei der Frau                                                                              |                        |                          |                          |                       |
| Behandlungsfälle mit Beckenbodenoperationen mit und ohne plastische Operation                                      | Mengeninformation      | 78,5 (62)                | 187                      |                       |
|                                                                                                                    | 2                      | 20.182                   |                          |                       |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |

Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe

Bösartige Neubildungen des Bewegungsapparates

|                                                                                                                                    |                   |          |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------|--|
| Behandlungsfälle mit bösartiger Neubildung an Knochen, Gelenkknorpel, peripheren Nerven, Retroperitoneum, Bindegewebe, Weichteilen | Mengeninformation | 46,8 (5) | n.a. |  |
|                                                                                                                                    | 2                 | 14.169   | <4   |  |

Gelenkersatz (Endoprothetik)

|                                                                                                                                           |                                |                          |                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|--|
| Todesfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung                                        | <0,13% (SE)<br>1 / 4           | 0,0846%<br>51 von 60.250 | 0,0%<br>0 von 164 |  |
| Todesfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei hüftgelenksnahen Frakturen                                                         | Beobachtungswert<br>1          | 4,7%<br>985 von 20.903   | 3,8%<br>1 von 26  |  |
| Todesfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei anderen Diagnosen                                                                  | Beobachtungswert<br>1          | 4,7%<br>319 von 6.857    | 0,0%<br>0 von 6   |  |
| Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung | Beobachtungswert<br>1          | 2,0%<br>1.222 von 60.250 | 1,8%<br>3 von 164 |  |
| Todesfälle bei Wechsel eines Hüftgelenkersatzes ohne Fraktur oder Infektion                                                               | <1,42% (SE)<br>1 / 4           | 1,36%<br>65 von 4.781    | 0,0%<br>0 von 6   |  |
| Todesfälle bei Wechsel eines Hüftgelenkersatzes wegen Fraktur oder Infektion                                                              | Beobachtungswert<br>1          | 4,1%<br>169 von 4.150    | n.a.<br><4        |  |
| Todesfälle bei Kniegelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung                                        | <0,06% (SE)<br>1 / 4           | 0,0278%<br>18 von 64.683 | 0,0%<br>0 von 260 |  |
| Todesfälle bei Kniegelenkersatz (Erstimplantation) bei anderen Diagnosen                                                                  | Beobachtungswert (SE)<br>1 / 4 | 0,5193%<br>19 von 3.659  | 0,0%<br>0 von 21  |  |
| Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei Kniegelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung | Beobachtungswert<br>1          | 1,4%<br>874 von 64.683   | 0,4%<br>1 von 260 |  |
| Todesfälle bei Wechsel eines Kniegelenk oder -teilersatzes ohne Fraktur oder Infektion                                                    | <0,20% (SE)<br>1 / 4           | 0,3095%<br>16 von 5.169  | 0,0%<br>0 von 9   |  |
| Todesfälle bei Wechsel eines Kniegelenkersatzes wegen Fraktur oder Infektion                                                              | Beobachtungswert<br>1          | 2,0%<br>45 von 2.206     | n.a.<br><4        |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

Präambel

| IQM Indikatoren                                                                                                                                   | IQM Zielwert          | IQM Durchschnittswert |     |        | Klinik Ist-Wert | Klinik Erwartungs-wert |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----|--------|-----------------|------------------------|
|                                                                                                                                                   | Quelle                | Fallzahl              |     |        | Fallzahl        | SMR                    |
| Todesfälle bei Hüft- oder Kniegelenkersatz bei Tumorerkrankung                                                                                    | Beobachtungswert      | 6,1%                  |     |        | 0,0%            |                        |
|                                                                                                                                                   | 1                     | 150                   | von | 2.456  | 0               | von 5                  |
| Hüftgelenknahe Frakturen                                                                                                                          |                       |                       |     |        |                 |                        |
| Todesfälle nach operativer Versorgung einer Schenkelhalsfraktur als Hauptdiagnose                                                                 | < Erwartungswert      | 4,3%                  |     |        | 3,6%            |                        |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                    | 1                     | 984                   | von | 22.984 | 1               | von 28                 |
|                                                                                                                                                   |                       |                       |     |        |                 | 0,68                   |
| Todesfälle nach Gelenkersatz bei Schenkelhalsfraktur als Hauptdiagnose                                                                            | Beobachtungswert      | 4,7%                  |     |        | 4,0%            |                        |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                    | 1                     | 961                   | von | 20.474 | 1               | von 25                 |
| Todesfälle nach Osteosynthese (Verbindung der Knochenfragmente durch Platten, Schrauben oder Nägel) bei Schenkelhalsfraktur als Hauptdiagnose     | Beobachtungswert      | 0,9%                  |     |        | n.a.            |                        |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                    | 1                     | 23                    | von | 2.510  | <4              |                        |
| Todesfälle nach operativer Versorgung einer pertrochantären Fraktur als Hauptdiagnose                                                             | < Erwartungswert      | 4,6%                  |     |        | 0,0%            |                        |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                    | 1                     | 873                   | von | 19.033 | 0               | von 19                 |
|                                                                                                                                                   |                       |                       |     |        |                 | 0,00                   |
| Todesfälle nach Gelenkersatz bei pertrochantärer Fraktur als Hauptdiagnose                                                                        | Beobachtungswert      | 5,4%                  |     |        | n.a.            |                        |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                    | 1                     | 21                    | von | 388    | <4              |                        |
| Todesfälle nach Osteosynthese (Verbindung der Knochenfragmente durch Platten, Schrauben oder Nägel) bei pertrochantärer Fraktur als Hauptdiagnose | Beobachtungswert      | 4,6%                  |     |        | 0,0%            |                        |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                    | 1                     | 852                   | von | 18.645 | 0               | von 18                 |
| Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark                                                                                                  |                       |                       |     |        |                 |                        |
| Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark (ohne lokale Schmerztherapie)                                                                    | Mengeninformation     | 341,5 (227)           |     |        | 919             |                        |
|                                                                                                                                                   | 2                     | 115.097               |     |        |                 |                        |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder Wirbelkörper-Ersatz bei Tumor (inkl. komplexe Rekonstruktionen)                                      | Beobachtungswert      | 7,7%                  |     |        | 0,0%            |                        |
|                                                                                                                                                   | 1                     | 265                   | von | 3.455  | 0               | von 8                  |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder Wirbelkörper-Ersatz bei Trauma (inkl. komplexe Rekonstruktionen, Rückenmarkoperation)                | Beobachtungswert      | 3,5%                  |     |        | 0,0%            |                        |
|                                                                                                                                                   | 1                     | 505                   | von | 14.334 | 0               | von 35                 |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Operation bei Entzündung der Bandscheibe oder des Rückenmarks                                                         | Beobachtungswert      | 7,5%                  |     |        | 0,0%            |                        |
|                                                                                                                                                   | 1                     | 198                   | von | 2.624  | 0               | von 6                  |
| Todesfälle bei komplexen Rekonstruktionen der Wirbelsäule (ohne Tumor oder Trauma)                                                                | Beobachtungswert (SE) | 0,2315%               |     |        | n.a.            |                        |
|                                                                                                                                                   | 1 / 4                 | 2                     | von | 864    | <4              |                        |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder 1 Wirbelkörper-Ersatz (ohne Tumor, Trauma oder kompl. Rekonstruktionen)                              | Beobachtungswert (SE) | 0,0739%               |     |        | 0,0%            |                        |
|                                                                                                                                                   | 1 / 4                 | 10                    | von | 13.530 | 0               | von 139                |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                                                                                      | IQM Zielwert                   | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungs-wert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                      | <a href="#">Quelle</a>         | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>    |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder 2 Wirbelkörper-Ersatz (ohne Tumor, Trauma oder kompl. Rekonstruktionen)                 | Beobachtungswert (SE)<br>1 / 4 | 0,2279%<br>16 von 7.022  | 0,0%<br>0 von 86         |                        |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder 3 oder mehr Wirbelkörper-Ersatz (ohne Tumor, Trauma oder kompl. Rekonstruktionen)       | Beobachtungswert (SE)<br>1 / 4 | 0,6394%<br>36 von 5.630  | 0,0%<br>0 von 76         |                        |
| Todesfälle bei alleiniger 'Entlastung' (Dekompression) der Wirbelsäule                                                               | Beobachtungswert (SE)<br>1 / 4 | 0,1044%<br>25 von 23.952 | n.a.<br><4               |                        |
| Todesfälle bei 'einfachen' Bandscheibenentfernungen                                                                                  | <0,03% (SE)<br>1 / 4           | 0,0253%<br>4 von 15.826  | 0,0%<br>0 von 193        |                        |
| Todesfälle bei Vertebro-/Kyphoplastie (ohne Tumor, Trauma, kompl. Rekonstruktion, Versteifung, WK-Ersatz oder Bandscheibeneingriffe) | <0,53% (SE)<br>1 / 4           | 0,3634%<br>24 von 6.605  | 2,7778%<br>1 von 36      |                        |
| Todesfälle bei anderen Operationen an der Wirbelsäule oder am Rückenmark                                                             | Beobachtungswert<br>1          | 1,9%<br>410 von 21.255   | 0,3%<br>1 von 338        |                        |
| Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei 'einfachen' Bandscheibenentfernungen                                           | Beobachtungswert (SE)<br>1 / 4 | 0,4234%<br>67 von 15.826 | 0,0%<br>0 von 193        |                        |
| Lokale Schmerztherapie an der Wirbelsäule (ohne andere Wirbelsäulen- oder Rückenmarkoperation)                                       | Mengeninformation<br>2         | 87,1 (38)<br>27.869      | 34                       |                        |
| Behandlungsfälle mit Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen als Hauptdiagnose ohne Operation oder lokale Schmerztherapie            | Mengeninformation<br>2         | 142,4 (118)<br>53.541    | 55                       |                        |
| Operationen am Bewegungsapparat inkl. Endoprothetik                                                                                  |                                |                          |                          |                        |
| Gelenkersatz am Schulter-/ Ellenbogengelenk                                                                                          | Mengeninformation<br>2         | 37,0 (27)<br>12.498      | 14                       |                        |
| Mehrfachverletzungen - Polytraumen                                                                                                   |                                |                          |                          |                        |
| Mehrfachverletzungen (Polytraumen) im Sinne der DRG-Definition                                                                       | Mengeninformation<br>2         | 21,7 (8)<br>6.970        | n.a.<br><4               |                        |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

Präambel

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert | IQM Durchschnittswert |  |  | Klinik Ist-Wert | Klinik Erwartungs-wert |
|-----------------|--------------|-----------------------|--|--|-----------------|------------------------|
|                 | Quelle       | Fallzahl              |  |  | Fallzahl        | SMR                    |

## Urologie

### Operationen der Niere

|                                                                                             |                       |         |     |       |       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-----|-------|-------|--------|
| Todesfälle bei Totalentfernung der Niere bei bösartiger Neubildung                          | <1,8%                 | 1,7%    |     |       | 0,0%  |        |
|                                                                                             | 1                     | 54      | von | 3.262 | 0     | von 9  |
| Anteil laparoskopischer Operationen bei Totalentfernung der Niere bei bösartiger Neubildung | Information           | 51,4%   |     |       | 77,8% |        |
|                                                                                             | 1                     | 1.678   | von | 3.262 | 7     | von 9  |
| Todesfälle bei Teilentfernung der Niere bei bösartiger Neubildung                           | <0,35% (SE)           | 0,255%  |     |       | n.a.  |        |
|                                                                                             | 1 / 4                 | 9       | von | 3.530 | <4    |        |
| Anteil laparoskopischer Operationen bei Teilentfernung der Niere bei bösartiger Neubildung  | Information           | 68,2%   |     |       | n.a.  |        |
|                                                                                             | 1                     | 2.409   | von | 3.530 | <4    |        |
| Anteil der Teilentfernungen der Niere bei bösartiger Neubildung                             | Information           | 52,0%   |     |       | 25,0% |        |
|                                                                                             | 1                     | 3.530   | von | 6.792 | 3     | von 12 |
| Todesfälle bei Totalentfernung der Niere bei anderer Diagnose                               | Beobachtungswert      | 3,8%    |     |       | n.a.  |        |
|                                                                                             | 1                     | 81      | von | 2.111 | <4    |        |
| Todesfälle bei Teilentfernung der Niere bei anderer Diagnose                                | Beobachtungswert (SE) | 0,2981% |     |       | n.a.  |        |
|                                                                                             | 1 / 4                 | 4       | von | 1.342 | <4    |        |
| Behandlungsfälle mit roboterassistierter Nierenentfernung bei bösartiger Neubildung         | Information           | 47,0%   |     |       | 83,3% |        |
|                                                                                             | 1                     | 3.194   | von | 6.792 | 10    | von 12 |

### Harnblase

|                                                                                                       |                   |             |     |        |       |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----|--------|-------|---------|
| Behandlungsfälle mit Blasenkrebs als Hauptdiagnose                                                    | Mengeninformation | 133,5 (34)  |     |        | 129   |         |
|                                                                                                       | 2                 | 41.519      |     |        |       |         |
| Operationen an der Harnblase durch die Harnröhre                                                      | Mengeninformation | 223,6 (213) |     |        | 378   |         |
|                                                                                                       | 2                 | 43.155      |     |        |       |         |
| Operationen an der Harnblase durch die Harnröhre bei Blasenkrebs                                      | Mengeninformation | 177,8 (156) |     |        | 112   |         |
|                                                                                                       | 2                 | 30.056      |     |        |       |         |
| Operationen an der Harnblase durch die Harnröhre bei Blasenkrebs mit Einbringen von Chemotherapeutika | Beobachtungswert  | 18,1%       |     |        | 21,4% |         |
|                                                                                                       | 1                 | 5.445       | von | 30.056 | 24    | von 112 |
| Todesfälle bei Entfernung der Harnblase                                                               | <4,8%             | 3,9%        |     |        | 0,0%  |         |
|                                                                                                       | 1                 | 111         | von | 2.840  | 0     | von 9   |
| Behandlungsfälle mit roboterassistierter Harnblasenentfernung                                         | Information       | 18,1%       |     |        | 11,1% |         |
|                                                                                                       | 1                 | 615         | von | 3.397  | 1     | von 9   |



G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                                                                        | <div>IQM<br/>Zielwert</div> <div><a href="#">Quelle</a></div> | <div>IQM<br/>Durchschnittswert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Ist-Wert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Erwartungs-<br/>wert</div> <div><a href="#">SMR</a></div> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        |                                                               |                                                                          |                                                                    |                                                                           |
| Prostata                                                                                                               |                                                               |                                                                          |                                                                    |                                                                           |
| Todesfälle bei Operationen der Prostata durch die Harnröhre bei gutartigen Erkrankungen                                | <div>&lt;0,20% (SE)</div> <div>1 / 4</div>                    | <div>0,1034%</div> <div>27 von 26.117</div>                              | <div>0,0%</div> <div>0 von 294</div>                               |                                                                           |
| Todesfälle bei Operationen der Prostata durch die Harnröhre bei bösartigen Erkrankungen                                | <div>Beobachtungswert (SE)</div> <div>1 / 4</div>             | <div>0,7547%</div> <div>52 von 6.890</div>                               | <div>0,0%</div> <div>0 von 74</div>                                |                                                                           |
| Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei Behandlungsfällen mit Operation der Prostata durch die Harnröhre | <div>Beobachtungswert</div> <div>1</div>                      | <div>3,1%</div> <div>1.039 von 33.007</div>                              | <div>0,5%</div> <div>2 von 368</div>                               |                                                                           |
| Behandlungsfälle mit Prostatakrebs als Hauptdiagnose                                                                   | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div>                     | <div>113,4 (20)</div> <div>36.416</div>                                  | <div>140</div>                                                     |                                                                           |
| Todesfälle bei radikaler Prostataentfernung                                                                            | <div>&lt;0,16% (SE)</div> <div>1 / 4</div>                    | <div>0,1599%</div> <div>22 von 13.761</div>                              | <div>0,0%</div> <div>0 von 83</div>                                |                                                                           |
| Behandlungsfälle mit roboterassistierter Prostataentfernung                                                            | <div>Information</div> <div>1</div>                           | <div>81,8%</div> <div>11.251 von 13.761</div>                            | <div>85,5%</div> <div>71 von 83</div>                              |                                                                           |
| Nierensteine                                                                                                           |                                                               |                                                                          |                                                                    |                                                                           |
| Behandlungsfälle mit Nierensteinen als Hauptdiagnose                                                                   | <div>Mengeninformation</div> <div>2</div>                     | <div>209,5 (50)</div> <div>71.430</div>                                  | <div>192</div>                                                     |                                                                           |
| Anteil der Behandlungsfälle mit Intervention zur Steinentfernung bei Hauptdiagnose Nierensteine                        | <div>Information</div> <div>1</div>                           | <div>51,5%</div> <div>36.814 von 71.430</div>                            | <div>57,3%</div> <div>110 von 192</div>                            |                                                                           |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |

Hautkrankheiten

Hautkrankheiten

|                                                             |                        |                    |            |  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------|--|
| Behandlungsfälle mit Melanom als Hauptdiagnose              | Mengeninformation<br>2 | 47,2 (4)<br>11.840 | 4          |  |
| Behandlungsfälle mit Dermatitis und Ekzem als Hauptdiagnose | Mengeninformation<br>2 | 34,3 (6)<br>11.214 | n.a.<br><4 |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    |  | Klinik Ist-Wert          |  | Klinik Erwartungs-wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--|------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> |  | <a href="#">Fallzahl</a> |  | <a href="#">SMR</a>    |

Intensivmedizin

Intensivmedizin

|                                                                                                                           |                       |                            |                   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|---------------|
| Todesfälle bei Beatmung > 24 Stunden ohne Neugeborene                                                                     | Information<br>1      | 34,8%<br>30.431 von 87.437 | 45,5%<br>5 von 11 |               |
| Todesfälle bei Beatmung > 24 Stunden ohne Neugeborene und ohne COVID-19 Fälle                                             | <35,9%<br>1           | 34,5%<br>28.853 von 83.547 | 45,5%<br>5 von 11 |               |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger als Hauptdiagnose                                        | < Erwartungswert<br>1 | 30,5%<br>9.492 von 31.083  | 11,8%<br>4 von 34 | 33,3%<br>0,35 |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger als Hauptdiagnose mit Organkomplikation/Schock           | Beobachtungswert<br>1 | 32,3%<br>9.080 von 28.152  | 14,8%<br>4 von 27 |               |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger als Hauptdiagnose ohne Organkomplikation/Schock          | Beobachtungswert<br>1 | 14,1%<br>412 von 2.931     | 0,0%<br>0 von 7   |               |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger oder SIRS als Nebendiagnose                              | Beobachtungswert<br>1 | 35,5%<br>22.689 von 63.903 | 28,6%<br>6 von 21 |               |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger oder SIRS als Nebendiagnose mit Organkomplikation/Schock | Beobachtungswert<br>1 | 36,3%<br>22.225 von 61.292 | 27,8%<br>5 von 18 |               |

Angeborene Gerinnungsstörung und Bluttransfusion

|                                                                                                    |                        |                               |                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|--|
| Behandlungsfälle mit angeborenen Gerinnungsstörungen als Haupt- oder Nebendiagnose                 | Mengeninformation<br>2 | 30,1 (14)<br>11.108           | 11                   |  |
| davon operierte Behandlungsfälle mit angeborenen Gerinnungsstörungen als Haupt- oder Nebendiagnose | Mengeninformation<br>2 | 20,3 (9)<br>7.080             | 9                    |  |
| Anteil operierter Behandlungsfälle mit Bluttransfusion                                             | Information<br>1       | 7,5%<br>180.424 von 2.407.413 | 1,6%<br>95 von 5.963 |  |

Obduktionen

|                |                  |                            |                  |  |
|----------------|------------------|----------------------------|------------------|--|
| Obduktionsrate | Information<br>1 | 0,79%<br>1.241 von 156.378 | 0,0%<br>0 von 45 |  |
|----------------|------------------|----------------------------|------------------|--|

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                         | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                                         | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |
| Palliativmedizin                        |                        |                          |                          |                               |
| Palliativmedizin                        |                        |                          |                          |                               |
| Palliativmedizinische Komplexbehandlung | Mengeninformation<br>2 | 223,5 (139)<br>47.612    | 6                        |                               |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | <div>IQM<br/>Zielwert</div> <div><a href="#">Quelle</a></div> | <div>IQM<br/>Durchschnittswert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Ist-Wert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Erwartungs-<br/>wert</div> <div><a href="#">SMR</a></div> |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

Roboterassistierte Eingriffe

Roboterassistierte Eingriffe

|                                                                                                                               |                   |             |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----|--|
| Viszeralchirurgische und urologische Eingriffe<br>mittels Roboterchirurgie (Darm-, Nieren-, Blasen-<br>oder Prostataeingriff) | Mengeninformation | 154,1 (125) | 82 |  |
|                                                                                                                               | 2                 | 18.185      |    |  |
| Behandlungsfälle mit roboterassistiertem Eingriff<br>GESAMT                                                                   | Mengeninformation | 268,4 (229) | 91 |  |
|                                                                                                                               | 2                 | 34.350      |    |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungs-wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>    |

Herzerkrankungen

Herzinfarkt

|                                                                      |                  |                   |          |      |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------|------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Herzinfarkt                             | < Erwartungswert | 7,5%              | 0,0%     | 4,4% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | 1 / 5            | 5.337 von 70.837  | 0 von 35 | 0,00 |
| Anteil der Herzinfarkte mit Linksherzkatheter                        | Information      | 85,8%             | 0,0%     |      |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | 1                | 60.786 von 70.837 | 0 von 35 |      |
| Todesfälle bei Direktaufnahme ohne Verlegung                         | Beobachtungswert | 7,4%              | 0,0%     |      |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | 1                | 4.746 von 64.041  | 0 von 35 |      |
| Anteil transmuraler Herzinfarkte (STEMI)                             | Information      | 33,7%             | 25,7%    |      |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | 1                | 23.848 von 70.760 | 9 von 35 |      |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Transmuraler Herzinfarkt                | < Erwartungswert | 11,6%             | 0,0%     | 9,0% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | 1                | 2.761 von 23.848  | 0 von 9  |      |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Nicht-transmuraler Herzinfarkt (NSTEMI) | < Erwartungswert | 5,1%              | 0,0%     | 4,1% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | 1                | 2.361 von 46.320  | 0 von 25 |      |
| Todesfälle bei Nebendiagnose Herzinfarkt                             | Beobachtungswert | 17,8%             | 0,0%     |      |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | 1                | 3.670 von 20.570  | 0 von 12 |      |

Herzinsuffizienz

|                                                                                                     |                  |                    |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------|------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Herzinsuffizienz                                                       | < Erwartungswert | 8,2%               | 6,8%      | 8,0% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | 1 / 5            | 13.117 von 160.876 | 3 von 44  | 0,85 |
| Anteil Behandlungsfälle mit Beschwerden bei Linksherzinsuffizienz bereits im Ruhezustand (NYHA IV)  | Information      | 46,7%              | 68,4%     |      |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | 1                | 50.732 von 108.703 | 13 von 19 |      |
| Anteil Behandlungsfälle mit Beschwerden bei Rechtsherzinsuffizienz bereits im Ruhezustand (NYHA IV) | Information      | 5,7%               | 0,0%      |      |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | 1                | 2.812 von 49.475   | 0 von 22  |      |

Herzrhythmusstörungen

|                                                              |                   |             |    |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----|--|
| Behandlungsfälle mit Herzrhythmusstörungen als Hauptdiagnose | Mengeninformation | 496,7 (340) | 24 |  |
|                                                              | 2                 | 177.317     |    |  |

Versorgung mit Schrittmacher oder Defibrillator

|                                                     |                   |             |    |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------|----|--|
| Versorgung mit Herzschrittmacher oder Defibrillator | Mengeninformation | 147,7 (104) | 15 |  |
|                                                     | 2                 | 46.541      |    |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | <b>IQM<br/>Zielwert</b> | <b>IQM<br/>Durchschnittswert</b> | <b>Klinik<br/>Ist-Wert</b> | <b>Klinik<br/>Erwartungs-<br/>wert</b> |
|-----------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a>  | <a href="#">Fallzahl</a>         | <a href="#">Fallzahl</a>   | <a href="#">SMR</a>                    |

Erkrankungen des Nervensystems und Schlaganfall

Todesfälle bei allen Formen des Schlaganfalls

|                                           |                  |                    |              |             |
|-------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------|-------------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Schlaganfall | < Erwartungswert | <b>9,9%</b>        | <b>10,5%</b> | <b>7,2%</b> |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre            | 1                | 10.243 von 103.310 | 2 von 19     |             |

Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirninfarkt

|                                          |                  |                  |              |             |
|------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirninfarkt | < Erwartungswert | <b>7,3%</b>      | <b>16,7%</b> | <b>6,3%</b> |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre           | 1 / 5            | 6.524 von 88.895 | 2 von 12     |             |

|                                                                                                          |             |                   |             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--|
| Anteil der Hirninfarkte mit medikamentöser Auflösung des Blutgerinnsels (Thrombolyse) ohne Zuverlegungen | Information | <b>18,3%</b>      | <b>0,0%</b> |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                           | 1           | 15.042 von 82.056 | 0 von 12    |  |

|                                                                                                                        |             |                  |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|--|
| Anteil Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Hirninfarkt mit Entfernung des Blutgerinnsels durch Katheter (Thrombektomie) | Information | <b>10,2%</b>     | <b>0,0%</b> |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                         | 1           | 9.128 von 89.875 | 0 von 12    |  |

|                                                          |                  |                  |             |  |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|--|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirnblutung (intrazerebral) | Beobachtungswert | <b>28,5%</b>     | <b>n.a.</b> |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                           | 1                | 3.077 von 10.795 | <4          |  |

|                                                                 |        |                 |               |  |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|--|
| Anteil nicht näher bezeichneter Schlaganfälle als Hauptdiagnose | <0,42% | <b>0,23%</b>    | <b>26,32%</b> |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                  | 1      | 243 von 104.755 | 5 von 19      |  |

|                                                                        |                  |              |             |  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--|
| Todesfälle bei nicht näher bezeichnetem Schlaganfall als Hauptdiagnose | Beobachtungswert | <b>11,5%</b> | <b>0,0%</b> |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                         | 1                | 28 von 243   | 0 von 5     |  |

|                                                                         |                       |                |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|--|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose TIA ohne Neubildungen und Kopfverletzungen | Beobachtungswert (SE) | <b>0,3159%</b> | <b>n.a.</b> |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                          | 1 / 4                 | 101 von 31.977 | <4          |  |

Behandlung auf einer Stroke Unit

|                                                                                     |             |                   |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--|
| Anteil Hauptdiagnose Hirninfarkte mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung | Information | <b>75,2%</b>      | <b>0,0%</b> |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                      | 1           | 67.568 von 89.875 | 0 von 12    |  |

|                                                                            |             |                   |             |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--|
| Anteil Hauptdiagnose TIA mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung | Information | <b>74,4%</b>      | <b>n.a.</b> |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                             | 1           | 23.940 von 32.157 | <4          |  |

|                                                                                                                                                           |                  |                    |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------|--|
| Anteil mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung ohne Zuverlegungen (in Anlehnung an Schlaganfallregister) bei Hauptdiagnose Hirninfarkt oder TIA | Beobachtungswert | <b>76,6%</b>       | <b>0,0%</b> |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                            | 1                | 87.746 von 114.496 | 0 von 14    |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |

Altersmedizin

Mangelernährung bei Älteren

|                                                                                                                 |             |                      |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|--|
| Anteil Behandlungsfälle mit erheblicher Mangelernährung und ohne Tumorerkrankung                                | Information | 0,94%                | 0,13%       |  |
| Alle Patient:innen >= 65 Jahre                                                                                  | 1           | 22.315 von 2.366.261 | 3 von 2.298 |  |
| Anteil Behandlungsfälle mit Sonden-/Infusionsernährung bei erheblicher Mangelernährung und ohne Tumorerkrankung | Information | 2,0%                 | n.a.        |  |
| Alle Patient:innen >= 65 Jahre                                                                                  | 1           | 448 von 22.315       | <4          |  |

Delir

|                                                                      |             |                      |              |  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|--|
| Anteil Behandlungsfälle mit aufgetretenem Delir an operierten Fällen | Information | 3,0%                 | 1,9%         |  |
| Alle Patient:innen >= 60 Jahre                                       | 1           | 38.725 von 1.271.087 | 51 von 2.628 |  |



G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    |  | Klinik Ist-Wert          |  | Klinik Erwartungs-wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--|------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> |  | <a href="#">Fallzahl</a> |  | <a href="#">SMR</a>    |

Lungenerkrankungen

Lungenentzündung (Pneumonie)

|                                                                                                     |                  |        |             |      |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------------|------|--------|-------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung                                                       | < Erwartungswert | 12,6%  |             | 1,7% |        | 16,1% |
| alle Altersgruppen                                                                                  | 1                | 16.990 | von 134.678 | 1    | von 59 |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung ohne Zuverlegung, Tumor, Mukoviszidose                | < Erwartungswert | 11,7%  |             | 2,0% |        | 13,1% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | 1                | 10.916 | von 93.320  | 1    | von 51 |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung ohne Zuverlegung, Tumor, Mukoviszidose, COVID-19      | < Erwartungswert | 10,2%  |             | 2,1% |        | 11,4% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | 1 / 5            | 7.579  | von 74.468  | 1    | von 48 | 0,18  |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung durch Aspiration von Nahrungsmitteln oder Mageninhalt | Beobachtungswert | 28,8%  |             | 0,0% |        |       |
|                                                                                                     | 1                | 3.376  | von 11.737  | 0    | von 5  |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Bronchitis oder Bronchiolitis ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose | < Erwartungswert | 2,2%   |             | 0,0% |        | 3,1%  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | 1                | 267    | von 12.100  | 0    | von 4  |       |

COPD (Chronisch obstruktive Lungenerkrankung)

|                                   |                  |       |            |      |        |      |
|-----------------------------------|------------------|-------|------------|------|--------|------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose COPD | < Erwartungswert | 4,7%  |            | 0,0% |        | 6,6% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre    | 1                | 2.996 | von 63.883 | 0    | von 17 | 0,00 |

Lungenkrebs

|                                                |                   |            |  |   |  |  |
|------------------------------------------------|-------------------|------------|--|---|--|--|
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Lungenkrebs | Mengeninformation | 186,2 (54) |  | 7 |  |  |
|                                                | 2                 | 64.042     |  |   |  |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungswert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>   |

## Erkrankungen der Bauchorgane

### Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen (ohne Tumor)

|                                                                                      |             |                   |             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--|
| Anteil laparoskopischer Operationen bei Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen | >95,1%      | 95,8%             | 98,9%       |  |
|                                                                                      | 1           | 48.172 von 50.299 | 176 von 178 |  |
| Todesfälle bei Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen                          | <0,60% (SE) | 0,4573%           | 0,0%        |  |
|                                                                                      | 1 / 4       | 230 von 50.299    | 0 von 178   |  |

### Operation von Leisten-, Schenkel- und Nabelbrüchen (Hernien)

|                                                                   |                  |                   |             |  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|--|
| Todesfälle bei Bruchoperationen ohne anteilige Darmentfernung     | <0,12% (SE)      | 0,1145%           | 0,0%        |  |
|                                                                   | 1 / 4            | 73 von 63.738     | 0 von 463   |  |
| Todesfälle bei Bruchoperationen mit anteiliger Darmentfernung     | Beobachtungswert | 2,1%              | 0,0%        |  |
|                                                                   | 1                | 146 von 6.843     | 0 von 6     |  |
| Anteil Behandlungsfälle mit Leistenbruchoperation mit Netzeinlage | Information      | 9,2%              | n.a.        |  |
| Alle Patient:innen < 20 Jahre                                     | 1                | 205 von 2.223     | <4          |  |
| Anteil Behandlungsfälle mit Leistenbruchoperation mit Netzeinlage | Information      | 98,3%             | 99,3%       |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                    | 1                | 43.038 von 43.793 | 296 von 298 |  |

### Eingriffe an der Schilddrüse

|                                                                                      |                   |                |          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------|--|
| Behandlungsfälle mit operativer Entfernung der Schilddrüse                           | Mengeninformation | 60,5 (20)      | 20       |  |
|                                                                                      | 2                 | 17.109         |          |  |
| Behandlungsfälle mit operativer Entfernung der Schilddrüse bei Schilddrüsenkrebs     | Mengeninformation | 12,4 (5)       | n.a.     |  |
|                                                                                      | 2                 | 2.501          | <4       |  |
| Behandlungsfälle mit operativer Entfernung der Schilddrüse bei gutartiger Erkrankung | Mengeninformation | 49,8 (18)      | 17       |  |
|                                                                                      | 2                 | 13.655         |          |  |
| Anteil der Beatmungsfälle (> 24 Std.) nach Schilddrüseneingriff                      | Information (SE)  | 0,64%          | 0,0%     |  |
|                                                                                      | 1 / 4             | 103 von 16.146 | 0 von 20 |  |

### Große Operationen am Dick- und Enddarm (Kolon und Rektum)

|                                                                                     |                   |                  |          |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------|------|
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Dick-/Enddarmkrebs                               | Mengeninformation | 126,3 (86)       | 58       |      |
|                                                                                     | 2                 | 43.444           |          |      |
| Behandlungsfälle mit Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn                             | Mengeninformation | 97,8 (63)        | 26       |      |
|                                                                                     | 2                 | 36.971           |          |      |
| Todesfälle bei operativer Entfernung des Dick-/Enddarms                             | Beobachtungswert  | 7,7%             | 1,1%     |      |
|                                                                                     | 1                 | 2.714 von 35.313 | 1 von 89 |      |
| Todesfälle bei operativer Dickdarmentfernung bei Krebs ohne komplizierende Diagnose | < Erwartungswert  | 3,8%             | 0,0%     | 2,4% |
|                                                                                     | 1 / 5             | 330 von 8.624    | 0 von 20 | 0,00 |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                                               | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert     |  |  | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungswert |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--|--|--------------------------|-----------------------|--|--|
|                                                                                               | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a>  |  |  | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>   |  |  |
| Todesfälle bei operativer Dickdarmentfernung bei Krebs mit komplizierender Diagnose           | Beobachtungswert<br>1  | 11,6%<br>293 von 2.516    |  |  | 9,1%<br>1 von 11         |                       |  |  |
| Todesfälle bei operativer Enddarmentfernung bei Krebs                                         | <3,2%<br>1             | 2,6%<br>106 von 4.134     |  |  | 0,0%<br>0 von 10         |                       |  |  |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Divertikel ohne Abszess/Perforation | <0,72% (SE)<br>1 / 4   | 0,7539%<br>14 von 1.857   |  |  | 0,0%<br>0 von 11         |                       |  |  |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Divertikel mit Abszess/Perforation  | Beobachtungswert<br>1  | 5,4%<br>251 von 4.675     |  |  | 0,0%<br>0 von 18         |                       |  |  |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn  | Beobachtungswert<br>1  | 3,2%<br>69 von 2.139      |  |  | 0,0%<br>0 von 4          |                       |  |  |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei anderen Diagnosen                   | Information<br>1       | 8,5%<br>795 von 9.346     |  |  | 0,0%<br>0 von 15         |                       |  |  |
| Anteil operative Leberentfernung bei Entfernung des Dick-/Enddarms bei Dick- und Enddarmkrebs | Information<br>1       | 4,2%<br>647 von 15.274    |  |  | 2,4%<br>1 von 41         |                       |  |  |
| Behandlungsfälle mit roboterassistiertem Eingriff bei Krebserkrankung des Darms               | Information<br>1       | 14,6%<br>2.223 von 15.274 |  |  | 0,0%<br>0 von 41         |                       |  |  |

## Erkrankungen des Magens

|                                                                                                              |                        |                        |  |  |                   |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--|--|-------------------|--|--|--|
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Magenkrebs (mit und ohne Magenoperation)                                  | Mengeninformation<br>2 | 45,2 (26)<br>14.509    |  |  | 4                 |  |  |  |
| Todesfälle bei Geschwüren an Magen, Zwölffingerdarm oder Dünndarm als Hauptdiagnose (mit und ohne Operation) | Beobachtungswert<br>1  | 5,4%<br>991 von 18.467 |  |  | 0,0%<br>0 von 9   |  |  |  |
| Behandlungsfälle mit Magenentfernungen                                                                       | Mengeninformation<br>2 | 36,9 (13)<br>9.921     |  |  | 161               |  |  |  |
| Todesfälle bei operativer Magenentfernung bei Magenkrebs ohne Speiseröhreneingriff                           | Beobachtungswert<br>1  | 5,1%<br>99 von 1.941   |  |  | n.a.<br><4        |  |  |  |
| Todesfälle bei operativer Magenentfernung bei anderer Diagnose (nicht Magenkrebs) ohne Speiseröhreneingriff  | Beobachtungswert<br>1  | 2,9%<br>227 von 7.753  |  |  | 0,0%<br>0 von 158 |  |  |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                              | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|----------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                                              | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |
| Adipositaschirurgie                          |                        |                          |                          |                               |
| Todesfälle im Rahmen der Adipositaschirurgie | Beobachtungswert (SE)  | 0,0189%                  | 0,0%                     |                               |
|                                              | 1 / 4                  | 2 von 10.594             | 0 von 155                |                               |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | <b>IQM<br/>Zielwert</b> | <b>IQM<br/>Durchschnittswert</b> | <b>Klinik<br/>Ist-Wert</b> | <b>Klinik<br/>Erwartungs-<br/>wert</b> |
|-----------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a>  | <a href="#">Fallzahl</a>         | <a href="#">Fallzahl</a>   | <a href="#">SMR</a>                    |

Gefäßoperationen

Eingriffe an der Halsschlagader (Carotis)

|                                                                            |        |               |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|--|
| Todesfälle bei ausschließlich extrakranieller Operation der Halsschlagader | <1,09% | 1,09%         | n.a. |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                             | 1      | 100 von 9.177 | <4   |  |

Eingriffe der Becken-/Bein-Arterien

|                                                          |             |                  |      |  |
|----------------------------------------------------------|-------------|------------------|------|--|
| Todesfälle bei Operationen der Becken-/Beinarterien      | Information | 5,6%             | n.a. |  |
|                                                          | 1           | 1.553 von 27.545 | <4   |  |
| davon Todesfälle bei Schaufensterkrankheit (Claudicatio) | <0,33% (SE) | 0,2817%          | n.a. |  |
|                                                          | 1 / 4       | 16 von 5.680     | <4   |  |

PTA (Perkutan transluminale Gefäßinterventionen)

|                                                                                    |                  |                  |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|--|
| Todesfälle bei Wiedereröffnung eines verschlossenen Gefäßes mittels Ballonkatheter | Beobachtungswert | 2,9%             | 0,0%     |  |
|                                                                                    | 1                | 1.684 von 57.653 | 0 von 42 |  |

Arteriovenöser Shunt

|                                     |                   |           |   |  |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|---|--|
| Anlegen eines arteriovenösen Shunts | Mengeninformation | 27,7 (17) | 7 |  |
|                                     | 2                 | 5.213     |   |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

IQM Indikatoren

IQM  
Zielwert

[Quelle](#)

IQM  
Durchschnittswert

[Fallzahl](#)

Klinik  
Ist-Wert

[Fallzahl](#)

Klinik  
Erwartungs-  
wert

[SMR](#)

## Frauenheilkunde und Geburtshilfe

### Geburtshilfe

|                                                    |                       |                             |                      |  |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| Mütterliche Todesfälle bei der Geburt              | <0,005% (SE)<br>1 / 4 | 0,0045%<br>10 von 219.975   | 0,0%<br>0 von 661    |  |
| Anteil vaginale Geburten mit Dammriss 4. Grades    | <0,125% (SE)<br>1 / 4 | 0,1109%<br>163 von 146.933  | 0,0%<br>0 von 326    |  |
| Anteil vaginale Geburten mit Dammschnitt           | Information<br>1      | 9,7%<br>14.200 von 146.933  | 13,5%<br>44 von 326  |  |
| Anteil Kaiserschnitt an allen Geburten             | Information<br>1      | 33,2%<br>73.042 von 219.975 | 50,7%<br>335 von 661 |  |
| Anteil Kaiserschnitte bei risikoarmer Geburt       | Information<br>1      | 27,9%<br>53.760 von 192.567 | 46,5%<br>277 von 596 |  |
| davon Anteil Kaiserschnitte bei risikoarmer Geburt | Information<br>1      | 25,8%<br>36.583 von 141.813 | 43,2%<br>189 von 437 |  |
| Alle Patient:innen < 35 Jahre                      |                       |                             |                      |  |
| davon Anteil Kaiserschnitte bei risikoarmer Geburt | Information<br>1      | 33,8%<br>17.177 von 50.754  | 55,3%<br>88 von 159  |  |
| Alle Patient:innen > 34 Jahre                      |                       |                             |                      |  |

### Neugeborene

|                                                                |                        |                         |     |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----|--|
| davon Neugeborene mit Geburtsgewicht von 1.500 bis 2.499 Gramm | Mengeninformation<br>2 | 68,1 (26)<br>13.422     | 15  |  |
| davon Neugeborene mit Geburtsgewicht > 2.500 Gramm             | Mengeninformation<br>2 | 1039,3 (779)<br>218.259 | 645 |  |

### Frauenheilkunde

|                                                                                                                    |                      |                            |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|--|
| Todesfälle bei operativer Entfernung der Gebärmutter bei gutartigen Erkrankungen                                   | <0,04% (SE)<br>1 / 4 | 0,0526%<br>11 von 20.893   | 0,0%<br>0 von 196    |  |
| Alle Patient:innen > 14 Jahre                                                                                      |                      |                            |                      |  |
| Anteil der Behandlungsfälle mit vaginaler/laparoskopischer Gebärmutterentfernung ohne plastische Operation         | >88,4%<br>1          | 89,3%<br>18.501 von 20.710 | 92,9%<br>182 von 196 |  |
| Alle Patient:innen > 14 Jahre                                                                                      |                      |                            |                      |  |
| Anteil der Behandlungsfälle mit vaginaler Entfernung durch Zerkleinerung der Gebärmutter                           | Information<br>1     | 28,2%<br>5.848 von 20.710  | 10,7%<br>21 von 196  |  |
| Alle Patient:innen > 14 Jahre                                                                                      |                      |                            |                      |  |
| Anteil der Behandlungsfälle mit laparoskopischer Gebärmutterentfernung ohne plastische Operation                   | Information<br>1     | 61,1%<br>12.653 von 20.710 | 82,1%<br>161 von 196 |  |
| Alle Patient:innen > 14 Jahre                                                                                      |                      |                            |                      |  |
| Anteil der Behandlungsfälle mit Eierstock- und Gebärmutterentfernung bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose | Information<br>1     | 5,7%<br>387 von 6.804      | 2,6%<br>1 von 39     |  |
| Alle Patient:innen > 14 und < 50 Jahre                                                                             |                      |                            |                      |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                                                                    | IQM<br>Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> | IQM<br>Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert<br><a href="#">SMR</a> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    |                                           |                                                      |                                                |                                                      |
| Anteil der Behandlungsfälle mit Eierstock- und Gebärmutterentfernung bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose | Information                               | 32,6%                                                | 33,3%                                          |                                                      |
| Alle Patient:innen >= 50 Jahre                                                                                     | 1                                         | 2.626 von 8.063                                      | 13 von 39                                      |                                                      |
| <b>Bösartige Neubildungen der Brust und der weiblichen Geschlechtsorgane</b>                                       |                                           |                                                      |                                                |                                                      |
| Behandlungsfälle mit Krebserkrankung der Brust oder der Geschlechtsorgane als Hauptdiagnose                        | Mengeninformation                         | 213,7 (72)                                           | 372                                            |                                                      |
|                                                                                                                    | 2                                         | 70.101                                               |                                                |                                                      |
| Behandlungsfälle mit Eierstockkrebs als Hauptdiagnose                                                              | Mengeninformation                         | 30,3 (14)                                            | 9                                              |                                                      |
|                                                                                                                    | 2                                         | 8.765                                                |                                                |                                                      |
| Todesfälle nach Eierstockentfernung bei Eierstockkrebs                                                             | Beobachtungswert                          | 1,4%                                                 | n.a.                                           |                                                      |
|                                                                                                                    | 1                                         | 34 von 2.482                                         | <4                                             |                                                      |
| Behandlungsfälle mit Gebärmutterkrebs als Hauptdiagnose                                                            | Mengeninformation                         | 51,9 (29)                                            | 22                                             |                                                      |
|                                                                                                                    | 2                                         | 14.432                                               |                                                |                                                      |
| Todesfälle nach Gebärmutterentfernung bei Gebärmutterkrebs                                                         | Beobachtungswert (SE)                     | 0,73%                                                | 0,0%                                           |                                                      |
|                                                                                                                    | 1 / 4                                     | 41 von 5.620                                         | 0 von 11                                       |                                                      |
| Behandlungsfälle mit Brustkrebs als Hauptdiagnose                                                                  | Mengeninformation                         | 135,1 (34)                                           | 339                                            |                                                      |
|                                                                                                                    | 2                                         | 43.095                                               |                                                |                                                      |
| <b>Eingriffe an der Brust</b>                                                                                      |                                           |                                                      |                                                |                                                      |
| Eingriffe an der Brust                                                                                             | Mengeninformation                         | 168,0 (126)                                          | 520                                            |                                                      |
|                                                                                                                    | 2                                         | 38.463                                               |                                                |                                                      |
| Operationen der Brust bei Brustkrebs                                                                               | Mengeninformation                         | 148,2 (125)                                          | 343                                            |                                                      |
|                                                                                                                    | 2                                         | 28.157                                               |                                                |                                                      |
| Anteil brusterhaltender Operationen bei Brustkrebs                                                                 | Information                               | 71,3%                                                | 76,4%                                          |                                                      |
|                                                                                                                    | 1                                         | 20.085 von 28.157                                    | 262 von 343                                    |                                                      |
| <b>Eingriffe am Beckenboden bei der Frau</b>                                                                       |                                           |                                                      |                                                |                                                      |
| Behandlungsfälle mit Beckenbodenoperationen mit und ohne plastische Operation                                      | Mengeninformation                         | 73,8 (54)                                            | 179                                            |                                                      |
|                                                                                                                    | 2                                         | 18.971                                               |                                                |                                                      |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |

## Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe

### Bösartige Neubildungen des Bewegungsapparates

|                                                                                                                                    |                   |          |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------|--|
| Behandlungsfälle mit bösartiger Neubildung an Knochen, Gelenkknorpel, peripheren Nerven, Retroperitoneum, Bindegewebe, Weichteilen | Mengeninformation | 45,7 (5) | n.a. |  |
|                                                                                                                                    | 2                 | 14.026   | <4   |  |

### Gelenkersatz (Endoprothetik)

|                                                                                                                                           |                                |                          |                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|--|
| Todesfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung                                        | <0,13% (SE)<br>1 / 4           | 0,0843%<br>49 von 58.126 | 0,0%<br>0 von 47 |  |
| Todesfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei hüftgelenksnahen Frakturen                                                         | Beobachtungswert<br>1          | 5,1%<br>1.033 von 20.145 | 0,0%<br>0 von 24 |  |
| Todesfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei anderen Diagnosen                                                                  | Beobachtungswert<br>1          | 5,5%<br>351 von 6.336    | 0,0%<br>0 von 4  |  |
| Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung | Beobachtungswert<br>1          | 2,4%<br>1.373 von 58.126 | 0,0%<br>0 von 47 |  |
| Todesfälle bei Wechsel eines Hüftgelenkersatzes ohne Fraktur oder Infektion                                                               | <1,42% (SE)<br>1 / 4           | 1,37%<br>64 von 4.685    | n.a.<br><4       |  |
| Todesfälle bei Wechsel eines Hüftgelenkersatzes wegen Fraktur oder Infektion                                                              | Beobachtungswert<br>1          | 4,5%<br>177 von 3.930    | n.a.<br><4       |  |
| Todesfälle bei Kniegelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung                                        | <0,06% (SE)<br>1 / 4           | 0,044%<br>26 von 59.081  | 0,0%<br>0 von 78 |  |
| Todesfälle bei Kniegelenkersatz (Erstimplantation) bei anderen Diagnosen                                                                  | Beobachtungswert (SE)<br>1 / 4 | 0,3447%<br>12 von 3.481  | 0,0%<br>0 von 8  |  |
| Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei Kniegelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung | Beobachtungswert<br>1          | 1,5%<br>915 von 59.081   | 2,6%<br>2 von 78 |  |
| Todesfälle bei Wechsel eines Kniegelenk oder -teilersatzes ohne Fraktur oder Infektion                                                    | <0,20% (SE)<br>1 / 4           | 0,3709%<br>18 von 4.853  | 0,0%<br>0 von 7  |  |
| Todesfälle bei Wechsel eines Kniegelenkersatzes wegen Fraktur oder Infektion                                                              | Beobachtungswert<br>1          | 3,2%<br>65 von 2.040     | n.a.<br><4       |  |



G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                                                                                                   | IQM Zielwert                   | IQM Durchschnittswert    |       |            | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungswert |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------|------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                   | <a href="#">Quelle</a>         | <a href="#">Fallzahl</a> |       |            | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>   |
| Todesfälle bei Hüft- oder Kniegelenkersatz bei Tumorerkrankung                                                                                    | Beobachtungswert<br>1          | 7,0%                     | 166   | von 2.359  | n.a.<br><4               |                       |
| Hüftgelenknahe Frakturen                                                                                                                          |                                |                          |       |            |                          |                       |
| Todesfälle nach operativer Versorgung einer Schenkelhalsfraktur als Hauptdiagnose                                                                 | < Erwartungswert<br>1          | 4,7%                     | 1.035 | von 22.251 | 0,0%                     | 4,0%                  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                    |                                |                          |       |            | 0 von 23                 | 0,00                  |
| Todesfälle nach Gelenkersatz bei Schenkelhalsfraktur als Hauptdiagnose                                                                            | Beobachtungswert<br>1          | 5,0%                     | 995   | von 19.716 | 0,0%                     |                       |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                    |                                |                          |       |            | 0 von 23                 |                       |
| Todesfälle nach operativer Versorgung einer pertrochantären Fraktur als Hauptdiagnose                                                             | < Erwartungswert<br>1          | 4,7%                     | 875   | von 18.558 | 0,0%                     | 5,2%                  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                    |                                |                          |       |            | 0 von 25                 | 0,00                  |
| Todesfälle nach Gelenkersatz bei pertrochantärer Fraktur als Hauptdiagnose                                                                        | Beobachtungswert<br>1          | 9,0%                     | 36    | von 399    | n.a.<br><4               |                       |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                    |                                |                          |       |            |                          |                       |
| Todesfälle nach Osteosynthese (Verbindung der Knochenfragmente durch Platten, Schrauben oder Nägel) bei pertrochantärer Fraktur als Hauptdiagnose | Beobachtungswert<br>1          | 4,6%                     | 839   | von 18.159 | 0,0%                     |                       |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                    |                                |                          |       |            | 0 von 24                 |                       |
| Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark                                                                                                  |                                |                          |       |            |                          |                       |
| Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark (ohne lokale Schmerztherapie)                                                                    | Mengeninformation<br>2         | 331,5 (212)              |       |            | 891                      |                       |
|                                                                                                                                                   |                                | 109.058                  |       |            |                          |                       |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder Wirbelkörper-Ersatz bei Tumor (inkl. komplexe Rekonstruktionen)                                      | Beobachtungswert<br>1          | 8,0%                     | 269   | von 3.366  | n.a.<br><4               |                       |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder Wirbelkörper-Ersatz bei Trauma (inkl. komplexe Rekonstruktionen, Rückenmarkoperation)                | Beobachtungswert<br>1          | 3,6%                     | 497   | von 13.832 | 0,0%                     |                       |
|                                                                                                                                                   |                                |                          |       |            | 0 von 32                 |                       |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Operation bei Entzündung der Bandscheibe oder des Rückenmarks                                                         | Beobachtungswert<br>1          | 7,7%                     | 187   | von 2.428  | 0,0%                     |                       |
|                                                                                                                                                   |                                |                          |       |            | 0 von 7                  |                       |
| Todesfälle bei komplexen Rekonstruktionen der Wirbelsäule (ohne Tumor oder Trauma)                                                                | Beobachtungswert (SE)<br>1 / 4 | 0,7609%                  | 7     | von 920    | 0,0%                     |                       |
|                                                                                                                                                   |                                |                          |       |            | 0 von 4                  |                       |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder 1 Wirbelkörper-Ersatz (ohne Tumor, Trauma oder kompl. Rekonstruktionen)                              | Beobachtungswert (SE)<br>1 / 4 | 0,1621%                  | 20    | von 12.339 | 0,0%                     |                       |
|                                                                                                                                                   |                                |                          |       |            | 0 von 135                |                       |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder 2 Wirbelkörper-Ersatz (ohne Tumor, Trauma oder kompl. Rekonstruktionen)                              | Beobachtungswert (SE)<br>1 / 4 | 0,1822%                  | 12    | von 6.586  | 0,0%                     |                       |
|                                                                                                                                                   |                                |                          |       |            | 0 von 93                 |                       |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                                                                                      | IQM Zielwert                   | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungswert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                      | <a href="#">Quelle</a>         | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>   |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder 3 oder mehr Wirbelkörper-Ersatz (ohne Tumor, Trauma oder kompl. Rekonstruktionen)       | Beobachtungswert (SE)<br>1 / 4 | 0,7644%<br>40 von 5.233  | 0,0%<br>0 von 85         |                       |
| Todesfälle bei 'einfachen' Bandscheibenentfernungen                                                                                  | <0,03% (SE)<br>1 / 4           | 0,0067%<br>1 von 14.848  | 0,0%<br>0 von 239        |                       |
| Todesfälle bei Vertebro-/Kyphoplastie (ohne Tumor, Trauma, kompl. Rekonstruktion, Versteifung, WK-Ersatz oder Bandscheibeneingriffe) | <0,53% (SE)<br>1 / 4           | 0,4888%<br>32 von 6.547  | 0,0%<br>0 von 43         |                       |
| Todesfälle bei anderen Operationen an der Wirbelsäule oder am Rückenmark                                                             | Beobachtungswert<br>1          | 1,8%<br>374 von 20.396   | 0,0%<br>0 von 250        |                       |
| Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei 'einfachen' Bandscheibenentfernungen                                           | Beobachtungswert (SE)<br>1 / 4 | 0,5119%<br>76 von 14.848 | 0,0%<br>0 von 239        |                       |
| Lokale Schmerztherapie an der Wirbelsäule (ohne andere Wirbelsäulen- oder Rückenmarkoperation)                                       | Mengeninformation<br>2         | 84,6 (32)<br>27.056      | 15                       |                       |
| Behandlungsfälle mit Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen als Hauptdiagnose ohne Operation oder lokale Schmerztherapie            | Mengeninformation<br>2         | 133,9 (115)<br>49.963    | 51                       |                       |
| <b>Mehrfachverletzungen - Polytraumen</b>                                                                                            |                                |                          |                          |                       |
| Mehrfachverletzungen (Polytraumen) im Sinne der DRG-Definition                                                                       | Mengeninformation<br>2         | 21,7 (8)<br>6.866        | n.a.<br><4               |                       |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    |  |  | Klinik Ist-Wert          |  |  | Klinik Erwartungs-wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--|--|--------------------------|--|--|------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> |  |  | <a href="#">Fallzahl</a> |  |  | <a href="#">SMR</a>    |

## Urologie

### Operationen der Niere

|                                                                                             |                       |         |     |       |       |     |    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-----|-------|-------|-----|----|--|
| Todesfälle bei Totalentfernung der Niere bei bösartiger Neubildung                          | <1,8%                 | 1,3%    |     |       | 0,0%  |     |    |  |
|                                                                                             | 1                     | 42      | von | 3.208 | 0     | von | 6  |  |
| Anteil laparoskopischer Operationen bei Totalentfernung der Niere bei bösartiger Neubildung | Information           | 46,5%   |     |       | 33,3% |     |    |  |
|                                                                                             | 1                     | 1.492   | von | 3.208 | 2     | von | 6  |  |
| Todesfälle bei Teilentfernung der Niere bei bösartiger Neubildung                           | <0,35% (SE)           | 0,2894% |     |       | 0,0%  |     |    |  |
|                                                                                             | 1 / 4                 | 10      | von | 3.455 | 0     | von | 7  |  |
| Anteil laparoskopischer Operationen bei Teilentfernung der Niere bei bösartiger Neubildung  | Information           | 59,3%   |     |       | 85,7% |     |    |  |
|                                                                                             | 1                     | 2.049   | von | 3.455 | 6     | von | 7  |  |
| Anteil der Teilentfernungen der Niere bei bösartiger Neubildung                             | Information           | 51,9%   |     |       | 53,8% |     |    |  |
|                                                                                             | 1                     | 3.455   | von | 6.663 | 7     | von | 13 |  |
| Todesfälle bei Totalentfernung der Niere bei anderer Diagnose                               | Beobachtungswert      | 3,7%    |     |       | n.a.  |     |    |  |
|                                                                                             | 1                     | 75      | von | 2.013 |       |     | <4 |  |
| Todesfälle bei Teilentfernung der Niere bei anderer Diagnose                                | Beobachtungswert (SE) | 0,1708% |     |       | 0,0%  |     |    |  |
|                                                                                             | 1 / 4                 | 2       | von | 1.171 | 0     | von | 4  |  |
| Behandlungsfälle mit roboterassistierter Nierenentfernung bei bösartiger Neubildung         | Information           | 38,3%   |     |       | 61,5% |     |    |  |
|                                                                                             | 1                     | 2.551   | von | 6.663 | 8     | von | 13 |  |

### Harnblase

|                                                                                                       |                   |             |     |        |       |     |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----|--------|-------|-----|-----|--|
| Behandlungsfälle mit Blasenkrebs als Hauptdiagnose                                                    | Mengeninformation | 140,1 (54)  |     |        | 123   |     |     |  |
|                                                                                                       | 2                 | 41.898      |     |        |       |     |     |  |
| Operationen an der Harnblase durch die Harnröhre                                                      | Mengeninformation | 218,3 (208) |     |        | 295   |     |     |  |
|                                                                                                       | 2                 | 41.905      |     |        |       |     |     |  |
| Operationen an der Harnblase durch die Harnröhre bei Blasenkrebs                                      | Mengeninformation | 171,5 (152) |     |        | 100   |     |     |  |
|                                                                                                       | 2                 | 29.666      |     |        |       |     |     |  |
| Operationen an der Harnblase durch die Harnröhre bei Blasenkrebs mit Einbringen von Chemotherapeutika | Beobachtungswert  | 17,9%       |     |        | 31,0% |     |     |  |
|                                                                                                       | 1                 | 5.307       | von | 29.666 | 31    | von | 100 |  |
| Todesfälle bei Entfernung der Harnblase                                                               | <4,8%             | 4,3%        |     |        | 0,0%  |     |     |  |
|                                                                                                       | 1                 | 125         | von | 2.882  | 0     | von | 5   |  |
| Todesfälle bei vollständiger Entnahme aller Organe des kleinen Beckens bei Mann oder Frau             | Beobachtungswert  | 6,0%        |     |        | n.a.  |     |     |  |
|                                                                                                       | 1                 | 32          | von | 535    |       |     | <4  |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                                                                        | IQM Zielwert                   | IQM Durchschnittswert      | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungswert |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                        | <a href="#">Quelle</a>         | <a href="#">Fallzahl</a>   | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>   |
| Behandlungsfälle mit roboterassistierter Harnblasenentfernung                                                          | Information<br>1               | 13,7%<br>468 von 3.417     | 0,0%<br>0 von 8          |                       |
| Prostata                                                                                                               |                                |                            |                          |                       |
| Todesfälle bei Operationen der Prostata durch die Harnröhre bei gutartigen Erkrankungen                                | <0,20% (SE)<br>1 / 4           | 0,1697%<br>41 von 24.167   | 0,0%<br>0 von 264        |                       |
| Todesfälle bei Operationen der Prostata durch die Harnröhre bei bösartigen Erkrankungen                                | Beobachtungswert (SE)<br>1 / 4 | 0,7599%<br>51 von 6.711    | 0,0%<br>0 von 86         |                       |
| Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei Behandlungsfällen mit Operation der Prostata durch die Harnröhre | Beobachtungswert<br>1          | 3,4%<br>1.041 von 30.878   | 1,4%<br>5 von 350        |                       |
| Behandlungsfälle mit Prostatakrebs als Hauptdiagnose                                                                   | Mengeninformation<br>2         | 109,0 (26)<br>34.228       | 167                      |                       |
| Todesfälle bei radikaler Prostataentfernung                                                                            | <0,16% (SE)<br>1 / 4           | 0,1957%<br>25 von 12.773   | 0,0%<br>0 von 92         |                       |
| Behandlungsfälle mit roboterassistierter Prostataentfernung                                                            | Information<br>1               | 75,7%<br>9.672 von 12.773  | 70,7%<br>65 von 92       |                       |
| Nierensteine                                                                                                           |                                |                            |                          |                       |
| Behandlungsfälle mit Nierensteinen als Hauptdiagnose                                                                   | Mengeninformation<br>2         | 205,6 (52)<br>69.911       | 164                      |                       |
| Anteil der Behandlungsfälle mit Intervention zur Steinentfernung bei Hauptdiagnose Nierensteine                        | Information<br>1               | 53,0%<br>37.084 von 69.911 | 68,3%<br>112 von 164     |                       |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |

Hautkrankheiten

Hautkrankheiten

|                                                             |                        |                    |            |  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------|--|
| Behandlungsfälle mit Melanom als Hauptdiagnose              | Mengeninformation<br>2 | 45,7 (5)<br>11.646 | 10         |  |
| Behandlungsfälle mit Dermatitis und Ekzem als Hauptdiagnose | Mengeninformation<br>2 | 33,9 (6)<br>10.779 | n.a.<br><4 |  |
| Behandlungsfälle mit Schuppenflechte als Hauptdiagnose      | Mengeninformation<br>2 | 30,9 (2)<br>4.606  | n.a.<br><4 |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungswert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>   |

## Intensivmedizin

### Intensivmedizin

|                                                                                                                           |                       |                            |                   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|---------------|
| Todesfälle bei Beatmung > 24 Stunden ohne Neugeborene                                                                     | Information<br>1      | 35,4%<br>30.990 von 87.630 | 12,5%<br>1 von 8  |               |
| Todesfälle bei Beatmung > 24 Stunden ohne Neugeborene und ohne COVID-19 Fälle                                             | <35,9%<br>1           | 34,8%<br>28.096 von 80.798 | 12,5%<br>1 von 8  |               |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger als Hauptdiagnose                                        | < Erwartungswert<br>1 | 33,3%<br>9.575 von 28.731  | 8,1%<br>3 von 37  | 36,3%<br>0,22 |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger als Hauptdiagnose mit Organkomplikation/Schock           | Beobachtungswert<br>1 | 35,5%<br>9.156 von 25.801  | 7,7%<br>2 von 26  |               |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger als Hauptdiagnose ohne Organkomplikation/Schock          | Beobachtungswert<br>1 | 14,3%<br>419 von 2.930     | 9,1%<br>1 von 11  |               |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger oder SIRS als Nebendiagnose                              | Beobachtungswert<br>1 | 37,4%<br>22.659 von 60.510 | 25,0%<br>3 von 12 |               |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger oder SIRS als Nebendiagnose mit Organkomplikation/Schock | Beobachtungswert<br>1 | 38,5%<br>22.214 von 57.675 | 42,9%<br>3 von 7  |               |
| Todesfälle bei generalisierter Entzündungsreaktion des gesamten Körpers ohne Organkomplikation (SIRS)                     | Information<br>1      | 7,2%<br>3.384 von 47.318   | 0,0%<br>0 von 4   |               |
| Anteil Todesfälle bei nicht-bakterieller Blutvergiftung (Sepsis)                                                          | Beobachtungswert<br>1 | 34,8%<br>155 von 446       | n.a.<br><4        |               |

### Angeborene Gerinnungsstörung und Bluttransfusion

|                                                                                                    |                        |                               |                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|--|
| Behandlungsfälle mit angeborenen Gerinnungsstörungen als Haupt- oder Nebendiagnose                 | Mengeninformation<br>2 | 28,9 (14)<br>10.632           | 9                    |  |
| davon operierte Behandlungsfälle mit angeborenen Gerinnungsstörungen als Haupt- oder Nebendiagnose | Mengeninformation<br>2 | 19,5 (9)<br>6.847             | 9                    |  |
| Anteil operierter Behandlungsfälle mit Bluttransfusion                                             | Information<br>1       | 7,5%<br>175.709 von 2.336.953 | 1,7%<br>98 von 5.665 |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren |  | <div>IQM<br/>Zielwert</div> <div><a href="#">Quelle</a></div> | <div>IQM<br/>Durchschnittswert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Ist-Wert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Erwartungs-<br/>wert</div> <div><a href="#">SMR</a></div> |
|-----------------|--|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Obduktionen     |  |                                                               |                                                                          |                                                                    |                                                                           |
| Obduktionsrate  |  | <div>Information</div> <div>1</div>                           | <div>0,84%</div> <div>1.310 von 156.425</div>                            | <div>0,0%</div> <div>0 von 38</div>                                |                                                                           |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                         | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                                         | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |
| Palliativmedizin                        |                        |                          |                          |                               |
| Palliativmedizin                        |                        |                          |                          |                               |
| Palliativmedizinische Komplexbehandlung | Mengeninformation<br>2 | 208,7 (132)<br>43.404    | 11                       |                               |



G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025

Jahr:

2023

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | <div>IQM<br/>Zielwert</div> <div><a href="#">Quelle</a></div> | <div>IQM<br/>Durchschnittswert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Ist-Wert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Erwartungs-<br/>wert</div> <div><a href="#">SMR</a></div> |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

Roboterassistierte Eingriffe

Roboterassistierte Eingriffe

|                                                                                                                               |                   |             |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----|--|
| Viszeralchirurgische und urologische Eingriffe<br>mittels Roboterchirurgie (Darm-, Nieren-, Blasen-<br>oder Prostataeingriff) | Mengeninformation | 150,5 (126) | 73 |  |
|                                                                                                                               | 2                 | 14.897      |    |  |
| Behandlungsfälle mit roboterassistiertem Eingriff<br>GESAMT                                                                   | Mengeninformation | 252,5 (222) | 83 |  |
|                                                                                                                               | 2                 | 27.013      |    |  |

## Leseanleitung zu den IQM-Indikatoren

### Lesebeispiel

Beim nachfolgenden Indikator „Todesfälle bei Hauptdiagnose Transmuraler Herzinfarkt (Alle Patient:innen  $\geq 20$  Jahre)“ liegt der Wert der durchschnittlichen Krankenhaussterblichkeit in der Bundesrepublik bei 12,2 % (Quelle: Statistisches Bundesamt). Daraus ergibt sich rechnerisch für das Beispielkrankenhaus aufgrund des Alters und Geschlechts der Patientinnen und Patienten des ausgewerteten Jahres eine zu erwartende Krankenhaussterblichkeit von 10,8 % **4** als Erwartungswert. Ziel der IQM-Mitgliedskrankenhäuser ist es, im Ergebnis unter diesem Erwartungswert zu liegen **1**. Der für das Beispielkrankenhaus tatsächlich gemessene Ist-Wert betrug in diesem Jahr 19,4 % **3** und lag damit über dem Krankenhaus-Erwartungswert für den Qualitätsindikator „Todesfälle bei Hauptdiagnose Transmuraler Herzinfarkt“. Der Durchschnittswert aller IQM-Mitgliedskrankenhäuser liegt bei diesem Indikator bei 11,0 % **2**.

|                                                                                                                          |                        |                          |                          |                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--|
| G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2025                                                                                     |                        | Jahr:                    |                          | 2024                  |  |
| Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der <a href="#">Präambel</a> |                        |                          |                          |                       |  |
| IQM Indikatoren                                                                                                          | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungswert |  |
|                                                                                                                          | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>   |  |
| Herzerkrankungen                                                                                                         | 1                      | 2                        | 3                        | 4                     |  |
| Herzinfarkt                                                                                                              |                        |                          |                          |                       |  |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Transmuraler Herzinfarkt                                                                    | < Erwartungswert       | 11,0%                    | 19,4%                    | 10,8%                 |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                           | 1                      | 2.623 von 23.934         | 99 von 511               |                       |  |

### Die Indikatoren

Die von IQM verwendeten German/Swiss Inpatient Quality Indicators (G-IQI/CH-IQI) sind so ausgewählt, dass sie sowohl häufige und wichtige Krankheitsbilder als auch wichtige Verfahren abbilden. Alle Indikatoren werden aus den Routinedaten des Krankenhauses ohne zusätzliche Dokumentation abgeleitet, wodurch kein weiterer Dokumentationsaufwand entsteht.

## Was wird gemessen?

Hierbei unterscheiden wir **absolute Mengeninformationen** von **relativen Mengeninformationen**, bei denen z.B. ein Anteil bestimmter Operationsverfahren ausgewiesen wird.

Wesentlicher Messwert ist die **Sterblichkeit** bei verschiedenen Krankheitsbildern, auch wenn wir uns bewusst sind, dass Sterblichkeit im Krankenhaus auch bei bester Medizin nicht vermeidbar ist. Deswegen vergleichen wir die Sterblichkeit, wo verfügbar, mit bundesdurchschnittlichen Werten. Diese werden entweder aus Daten des **Statistischen Bundesamtes** oder aus Daten des **Forschungsdatenzentrums der statistischen Ämter des Bundes und der Länder** berechnet. Mit den Daten des Statistischen Bundesamtes wird eine **Risikogewichtung** für das **Alter** und das **Geschlecht** der Behandelten ermöglicht. Krankenhäuser mit einem hohen Anteil sehr alter Patient:innen weisen in der Regel eine andere Sterblichkeit auf als solche mit vergleichsweise jungen Patientinnen und Patienten.

Als wesentliche Orientierungshilfe zur Einordnung der Ergebnisse dient der **Erwartungswert**, da er besagt, welche Sterblichkeit bei einer Patientengruppe gleicher Alters- und Geschlechtsverteilung im Bundesdurchschnitt zu erwarten wäre. Für einige Indikatoren (G-IQI/CH-IQI 01.1, 02.1, 09.3, 14.26 und 21.311) kommen erweiterte **differenzierte Risikomodelle** zum Einsatz. Diese berücksichtigen zusätzlich Begleiterkrankungen, Erkrankungsschwere und den Zuverlegungsstatus. Insofern ergeben sich für unterschiedliche Krankenhäuser individuelle Erwartungswerte, da Unterschiede in der Alters- und Geschlechtszusammensetzung der Behandelten bestehen. Ziel der IQM-Krankenhäuser ist es, „bessere“ als die erwarteten Werte zu erreichen.

Die Beziehung zwischen erwarteter Sterblichkeit und dem tatsächlichen Wert des Krankenhauses nennt man wissenschaftlich **„standardized mortality rate“** oder kurz **„SMR“**. Liegt diese Quote unter 1, dann ist die tatsächliche Sterblichkeit im Krankenhaus für den gemessenen Indikator geringer als die zu erwartende, liegt sie über 1, ist die Sterblichkeit höher als eigentlich erwartet. Ein solcher Wert ist lediglich bei den Indikatoren errechenbar, bei denen die zu erwartende Sterblichkeit aus den Daten des Statistischen Bundesamtes ermittelt werden kann.

Liegen keine alters- und geschlechtsgewichteten Werte für einen Indikator vor, kann auch kein Erwartungswert errechnet werden. Wir sind uns ebenso bewusst, dass die Sterblichkeit bei manchen Indikatoren ein ausgesprochen seltenes Ereignis ist und nicht als alleiniger Nachweis der medizinischen Qualität gelten darf. Die im „low risk“-Bereich gemessene Sterblichkeit ermöglicht in nachfolgenden Analysen dieser seltenen Ereignisse, wichtige Verbesserungspotentiale zu heben.

## Glossar zur Ergebnisveröffentlichung

Hier finden Sie eine Erläuterung der wichtigsten Begriffe und Kennzahlen, die in dieser Veröffentlichung verwendet werden:

### **IQM Zielwert - Quellen (Herkunft und Berechnung):**

Die Referenz- bzw. Zielwerte für die Indikatoren basieren auf verschiedenen Quellen. Die jeweilige Quelle wird durch eine Nummer unter dem „IQM Zielwert“ angegeben:

- 1: Forschungsdatenzentren der statistischen Ämter des Bundes und der Länder, DRG-Statistik 2022. Eigene Berechnungen. Diese Daten bilden auch die Grundlage für die Berechnung der klinikindividuellen Erwartungswerte, standardisiert nach Alter und Geschlecht.
- 2: Gleiche Quelle wie 1; jedoch speziell für Mengenindikatoren: Die mittlere Fallzahl (Median in Klammern) für IQM-Mitgliedskrankenhäuser mit entsprechender Leistung im Jahr 2022.
- 3: Der Zielwert ist hier nicht identisch mit dem Bundeswert und wurde entnommen aus: Kaiser D (2007) Mindestmengen aus thoraxchirurgischer Sicht. Chirurg, 78(11): 1012-1017
- 4: Sentinel Event: Kennzahl wurde im G-IQI Kolloquium als Sentinel Event eingestuft (seltene Ereignisse, die man nicht erwartet). Weitere Infos dazu in den G-IQI FAQs.
- 5: Differenziertes Risikomodell zur Berechnung der Erwartungswerte; basierend auf Daten der Forschungsdatenzentren der statistischen Ämter des Bundes und der Länder, DRG-Statistik 2022. Eigene Berechnungen.
- 6: Empfehlung aus der Beschlussfassung der G-IQI Version 5.5 im Kolloquium II durch den wissenschaftlichen Beirat des IQM e.V.

### **IQM-Durchschnittswert - Fallzahl:**

Der IQM-Durchschnittswert gibt die mittleren Ergebnisse über alle Patient:innen an, die im Beobachtungszeitraum in IQM-Mitgliedskrankenhäusern (D) behandelt wurden. Mengenangaben werden als Durchschnittswert und zusätzlich in Klammern als Median dargestellt.

### **Krankenhaus Erwartungswert:**

Dieser Wert beschreibt die erwartete Sterblichkeit der Patient:innen, basierend auf Alters- und Geschlechtsverteilung. Er wird nur für Indikatoren berechnet, bei denen Vergleichszahlen des Bundesdurchschnitts vorliegen.

Für einige Indikatoren (G-IQI/CH-IQI 01.1, 02.1, 09.3, 14.26 und 21.311) kommen erweiterte differenzierte Risikomodelle zum Einsatz. Diese berücksichtigen zusätzlich Begleiterkrankungen, Erkrankungsschwere und den Zuverlegungsstatus.

### **SMR:**

Die SMR (standardized mortality ratio) ist das Verhältnis von beobachteter Sterblichkeit (Durchschnittswert) und dem Erwartungswert.

### **Hinweis zum Indikator „Obduktionsrate“:**

Die Anzahl der ausgewiesenen Obduktionen kann unvollständig sein, da nicht alle Krankenhaus-Dokumentationssysteme eine vollständige bzw. nachträgliche Kodierung nach Entlassung (bzw. Tod) unterstützen.

### **Fallzahlen und Mindestgrenzen:**

Ergebnisse einer Kennzahl werden nur dann im Detail dargestellt, wenn mindestens 4 oder mehr Fälle im Nenner aufgetreten sind. Bei Unterschreiten dieser Grenze wird dann die Angabe „<4“ ausgewiesen.

Ergebnisse, die sich auf sehr seltene Ereignisse beziehen, werden mit bis zu 4 Nachkommastellen ausgewiesen, um bei hohen Grundgesamtheiten ein Ergebnis zwischen 0 und 1 ausweisen zu können.