

Qualitätsergebnisse

Helios Klinikum Pforzheim

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Präambel

[zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Ergebnisdarstellung und Nutzung der Indikatoren-Sets

Im Sinne einer transparenten und wissenschaftlich fundierten Qualitätsanalyse bietet Ihnen die vorliegende Ergebnisveröffentlichung eine strukturierte Orientierungshilfe zur Einordnung der dargestellten Ergebnisse. Die Nutzung der von IQM verwendeten German/Swiss Inpatient Quality Indicators (G-IQI/CH-IQI) ermöglicht eine differenzierte Bewertung der Resultate und unterstützt eine gezielte Analyse der Ergebnisqualität.

Mit der aktuellen Veröffentlichung werden für die Schweizer Mitgliedsspitäler erstmals Erwartungs- und Referenzwerte auf Grundlage der Schweizer Koeffizienten ausgewiesen. Damit erfolgt die Bewertung aller Qualitätsergebnisse landesspezifisch und auf Basis der jeweiligen nationalen Modelle. Für Krankenhäuser in Deutschland gelten weiterhin die deutschen Referenzwerte, während für Schweizer Spitäler die vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) abgeleiteten Referenzwerte und Risikomodelle zur Anwendung kommen. Diese Anpassung gewährleistet eine präzise und kontextgerechte Interpretation der Qualitätsdaten für beide Länder.

Die Ergebnisse sind unter Berücksichtigung dieser methodischen Weiterentwicklung zu betrachten und für weiterführende Analysen nutzbar.

Bitte beachten Sie, dass die ausgewiesenen Fallzahlen jeweils dem Standort zugeordnet sind, an dem die Entlassung erfolgt ist. Eine Verlegung von Patientinnen und Patienten zwischen verschiedenen Standorten desselben Krankenhauses oder Trägers kann nicht berücksichtigt werden.

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

IQM Indikatoren

[Qualitätsbericht](#)

[QSR-Mehrjahresergebnisse](#)

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Herzerkrankungen | 2025 | 2024 |
| Erkrankungen des Nervensystems und Schlaganfall | 2025 | 2024 |
| Altersmedizin | 2025 | 2024 |
| Lungenerkrankungen | 2025 | 2024 |
| Erkrankungen der Bauchorgane | 2025 | 2024 |
| Gefäßoperationen | 2025 | 2024 |
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 2025 | 2024 |
| Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe | 2025 | 2024 |
| Urologie | 2025 | 2024 |
| Hautkrankheiten | 2025 | 2024 |
| Intensivmedizin | 2025 | 2024 |
| Roboterassistierte Eingriffe | 2025 | 2024 |

[Lesehilfe](#)

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2025

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert Quelle | IQM Durchschnittswert Fallzahl | Klinik Ist-Wert Fallzahl | Klinik Erwartungswert SMR |
|--|--|---|---|--|
| Herzerkrankungen | | | | |
| Herzinfarkt | | | | |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Herzinfarkt | < Erwartungswert | 7,0% | 6,0% | 6,3% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | a / g | 5.129 von 73.098 | 18 von 301 | 0,95 |
| Anteil der Herzinfarkte mit Linksherzkatheter | Information | 85,0% | 94,0% | |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | a | 62.113 von 73.098 | 283 von 301 | |
| Todesfälle bei Direktaufnahme ohne Verlegung | Beobachtungswert | 6,9% | 6,0% | |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | a | 4.547 von 65.683 | 18 von 301 | |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Transmuraler Herzinfarkt | < Erwartungswert | 11,3% | 9,3% | 11,7% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | a | 2.707 von 24.057 | 9 von 97 | |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Nicht-transmuraler Herzinfarkt (NSTEMI) | < Erwartungswert | 4,6% | 4,5% | 6,2% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | a | 2.215 von 48.261 | 9 von 202 | |
| Todesfälle bei Nebendiagnose Herzinfarkt | Beobachtungswert | 17,0% | 14,6% | |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | a | 3.533 von 20.817 | 14 von 96 | |
| Herzinsuffizienz | | | | |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Herzinsuffizienz | < Erwartungswert | 7,5% | 5,6% | 7,4% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | a / g | 12.929 von 171.472 | 42 von 752 | 0,76 |
| Anteil Behandlungsfälle mit Beschwerden bei Linksherzinsuffizienz bereits im Ruhezustand (NYHA IV) | Information | 46,1% | 40,5% | |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | a | 55.250 von 119.730 | 150 von 370 | |
| Anteil Behandlungsfälle mit Beschwerden bei Rechtsherzinsuffizienz bereits im Ruhezustand (NYHA IV) | Information | 5,4% | 0,8% | |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | a | 2.633 von 49.106 | 3 von 372 | |
| Linksherzkatheter | | | | |
| Anzahl aller Linksherzkatheter zur Koronardiagnostik | Mengeninformation | 908,9 (786) | 1.539 | |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | b | 279.937 | | |
| Todesfälle mit Linksherzkatheter bei Herzinfarkt ohne Zuverlegungen oder Herz-Kreislauf-Stillstand vor Krankenhaus-Aufnahme und ohne Herzoperation | < Erwartungswert | 4,2% | 3,3% | 5,5% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | a | 2.333 von 55.500 | 9 von 271 | 0,61 |
| Todesfälle bei diagnostischem Linksherzkatheter ohne Hauptdiagnose Herzinfarkt, ohne Zuverlegungen oder Herz-Kreislauf-Stillstand vor Krankenhaus-Aufnahme und ohne Herzoperation | < Erwartungswert | 1,0% | 0,9% | 1,2% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | a | 1.181 von 118.668 | 6 von 645 | 0,79 |
| Todesfälle bei therapeutischem Linksherzkatheter ohne Hauptdiagnose Herzinfarkt, ohne Zuverlegungen oder Herz-Kreislauf-Stillstand vor Krankenhaus-Aufnahme und ohne Herzoperation | < Erwartungswert | 1,4% | 1,2% | 1,4% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | a | 1.069 von 78.656 | 7 von 583 | |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2025

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert Quelle | IQM Durchschnittswert Fallzahl | Klinik Ist-Wert Fallzahl | Klinik Erwartungs- wert SMR |
|---|---|--|--|--|
| Anteil der Behandlungen mit therapeutischem Linksherzkatheter ohne Hauptdiagnose Herzinfarkt und ohne Herzoperation Alle Patient:innen >= 20 Jahre | Information a | 39,6% 80.964 von 204.224 | 47,2% 586 von 1.241 | |
| Herzrhythmusstörungen | | | | |
| Behandlungsfälle mit Herzrhythmusstörungen als Hauptdiagnose | Mengeninformation b | 560,1 (380) 197.144 | 720 | |
| Versorgung mit Schrittmacher oder Defibrillator | | | | |
| Versorgung mit Herzschrittmacher <u>oder</u> Defibrillator | Mengeninformation b | 167,4 (122) 48.891 | 138 | |
| Versorgung mit Herzschrittmacher <u>und</u> Defibrillator | Mengeninformation b | 53,1 (38) 12.590 | 34 | |
| Ablative Therapie | | | | |
| Behandlungsfälle mit kathetergestützter ablativer Therapie | Mengeninformation b | 382,5 (298) 67.321 | 119 | |
| davon Vorhoffablation bei Vorhofflimmern / -flattern, Anteil Todesfälle Alle Patient:innen >= 20 Jahre | Information (SE) a / e | 0,0885% 41 von 46.341 | 0,0% 0 von 72 | |
| Eingriffe am Herzen | | | | |
| Behandlungsfälle mit Eingriff am Herzen | Mengeninformation b | 312,6 (16) 63.779 | 99 | |
| davon Eingriff an Herzklappen | Mengeninformation b | 330,7 (41) 45.312 | 92 | |
| davon andere Eingriffe am Herzen | Mengeninformation b | 70,9 (3) 11.775 | 7 | |
| Todesfälle bei minimalinvasivem Eingriff an Mitral- oder Trikuspidalklappe | Beobachtungswert a | 2,0% 173 von 8.658 | 1,1% 1 von 87 | |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2025

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

IQM Indikatoren

| IQM Zielwert | IQM Durchschnittswert | Klinik Ist-Wert | Klinik Erwartungswert |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Quelle | Fallzahl | Fallzahl | SMR |

Erkrankungen des Nervensystems und Schlaganfall

Bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhaut

| | | | | |
|---|-------------------|----------|---|--|
| Bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhäute als Hauptdiagnose | Mengeninformation | 40,9 (6) | 8 | |
| | b | 10.517 | | |

Todesfälle bei allen Formen des Schlaganfalls

| | | | | |
|---|------------------|--------------------|------------|------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Schlaganfall | < Erwartungswert | 10,0% | 7,9% | 9,4% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | a | 11.103 von 111.219 | 76 von 964 | |

Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirninfarkt

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------|------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirninfarkt | < Erwartungswert | 7,3% | 6,0% | 6,1% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | a / g | 7.008 von 95.448 | 52 von 866 | |

Anteil der Hirninfarkte mit medikamentöser Auflösung des Blutgerinnsels (Thrombolyse) ohne Zuverlegungen

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--|
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | Information | 18,3% | 20,4% | |
| | a | 16.065 von 87.701 | 170 von 835 | |

Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirninfarkt mit medikamentöser Auflösung des Blutgerinnsels (Thrombolyse) ohne Zuverlegungen

| | | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------|--|
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | Beobachtungswert | 6,9% | 7,6% | |
| | a | 1.101 von 16.065 | 13 von 170 | |

Anteil Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Hirninfarkt mit Entfernung des Blutgerinnsels durch Katheter (Thrombektomie)

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-----------|--|
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | Information | 11,0% | 0,8% | |
| | a | 10.648 von 96.566 | 7 von 869 | |

Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirninfarkt mit Entfernung des Blutgerinnsels durch Katheter (Thrombektomie)

| | | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|---------|-------|
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | < Erwartungswert | 21,5% | 42,9% | 21,8% |
| | a | 2.285 von 10.648 | 3 von 7 | |

Anteil der Hirninfarkte mit Lungenentzündung, die bei Aufnahme nicht bestand

| | | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------|--|
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | Beobachtungswert | 4,6% | 2,9% | |
| | a | 4.483 von 96.566 | 25 von 869 | |

Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirninfarkt mit Lungenentzündung, die bei Aufnahme nicht bestand

| | | | | |
|--------------------------------|------------------|-----------------|----------|--|
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | Beobachtungswert | 26,4% | 20,0% | |
| | a | 1.183 von 4.483 | 5 von 25 | |

Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirnblutung (intrazerebral)

| | | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|-----------|--|
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | Beobachtungswert | 28,6% | 25,0% | |
| | a | 3.402 von 11.898 | 20 von 80 | |

Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirnblutung (subarachnoidal)

| | | | | |
|--------------------------------|------------------|---------------|----------|--|
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | Beobachtungswert | 18,4% | 22,2% | |
| | a | 692 von 3.766 | 4 von 18 | |

Anteil nicht näher bezeichneter Schlaganfälle als Hauptdiagnose

| | | | | |
|--------------------------------|--------|-----------------|-----------|--|
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | <0,40% | 0,19% | 0,0% | |
| | a | 219 von 112.814 | 0 von 969 | |

Todesfälle bei Hauptdiagnose TIA ohne Neubildungen und Kopfverletzungen

| | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|---------------|-----------|--|
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | Beobachtungswert (SE) | 0,2641% | 0,0% | |
| | a / e | 97 von 36.732 | 0 von 410 | |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2025

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert Quelle | IQM Durchschnittswert Fallzahl | Klinik Ist-Wert Fallzahl | Klinik Erwartungswert SMR |
|---|--|---|---|--|
| Behandlung auf einer Stroke Unit | | | | |
| Behandlungsfälle mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung | Mengeninformation b | 556,2 (530) 116.806 | 1.049 | |
| Anteil Hauptdiagnose Hirninfarkte mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung Alle Patient:innen >= 20 Jahre | Information a | 77,7% 75.008 von 96.566 | 75,0% 652 von 869 | |
| Anteil Hauptdiagnose TIA mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung Alle Patient:innen >= 20 Jahre | Information a | 78,3% 28.965 von 36.978 | 79,2% 327 von 413 | |
| Anteil mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung ohne Zuverlegungen (in Anlehnung an Schlaganfallregister) bei Hauptdiagnose Hirninfarkt oder TIA Alle Patient:innen >= 20 Jahre | Beobachtungswert a | 79,6% 99.436 von 124.929 | 76,2% 950 von 1.246 | |
| Anteil mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung nur Zuverlegungen (in Anlehnung an Schlaganfallregister) bei Hauptdiagnose Hirninfarkt oder TIA Alle Patient:innen >= 20 Jahre | Information a | 52,7% 4.537 von 8.615 | 80,6% 29 von 36 | |
| Epilepsie | | | | |
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Epilepsie Alle Patient:innen >= 20 Jahre | Mengeninformation b | 126,0 (46) 41.339 | 260 | |
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Epilepsie Alle Patient:innen < 20 Jahre | Mengeninformation b | 55,4 (19) 11.351 | 29 | |
| Multiple Sklerose | | | | |
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Multiple Sklerose | Mengeninformation b | 37,9 (24) 8.842 | 46 | |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2025

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert Quelle | IQM Durchschnittswert Fallzahl | Klinik Ist-Wert Fallzahl | Klinik Erwartungs- wert SMR |
|-----------------|---|--|--|--|
|-----------------|---|--|--|--|

Altersmedizin

Geriatrische Frührehabilitation

| | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|-----|--|
| Behandlungsfälle mit geriatrischer Frührehabilitation | Mengeninformation b | 563,5 (475) 131.297 | 303 | |
|---|----------------------------|----------------------------|-----|--|

Mangelernährung bei Älteren

| | | | | |
|--|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|
| Anteil Behandlungsfälle mit erheblicher Mangelernährung und ohne Tumorerkrankung Alle Patient:innen >= 65 Jahre | Information a | 0,86% 22.224 von 2.594.527 | 0,46% 41 von 8.827 | |
|--|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|--|
| Anteil Behandlungsfälle mit Sonden- / Infusionsernährung bei erheblicher Mangelernährung und ohne Tumorerkrankung Alle Patient:innen >= 65 Jahre | Information a | 1,3% 293 von 22.224 | 0,0% 0 von 41 | |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|--|

Delir

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------------------|---------------------------|--|
| Anteil Behandlungsfälle mit aufgetretenem Delir an operierten Fällen Alle Patient:innen >= 60 Jahre | Information a | 3,0% 42.058 von 1.384.617 | 5,9% 155 von 2.637 | |
|--|----------------------|----------------------------------|---------------------------|--|

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2025

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert | IQM Durchschnittswert | Klinik Ist-Wert | Klinik Erwartungswert |
|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| | Quelle | Fallzahl | Fallzahl | SMR |

Lungenerkrankungen

Lungenentzündung (Pneumonie)

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung alle Altersgruppen | < Erwartungswert a | 11,0% 15.999 von 145.277 | 12,3% 82 von 668 | 11,2% |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung ohne Zuverlegung, Tumor, Mukoviszidose Alle Patient:innen >= 20 Jahre | < Erwartungswert a | 9,5% 9.904 von 103.720 | 9,8% 37 von 376 | 12,2% |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung ohne Zuverlegung, Tumor, Mukoviszidose, COVID-19 Alle Patient:innen >= 20 Jahre | < Erwartungswert a / g | 9,3% 9.198 von 98.807 | 9,4% 34 von 361 | 10,7% 0,88 |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung ohne Zuverlegung, Tumor, Mukoviszidose Alle Patient:innen 1 bis 19 Jahre | Beobachtungswert (SE) a / e | 0,37% 39 von 10.507 | 0,0% 0 von 117 | |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung durch Aspiration von Nahrungsmitteln oder Mageninhalt | Beobachtungswert a | 28,1% 3.590 von 12.789 | 41,9% 39 von 93 | |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Bronchitis oder Bronchiolitis ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose Alle Patient:innen >= 20 Jahre | < Erwartungswert a | 2,1% 274 von 13.291 | 1,5% 1 von 65 | 1,2% |

COPD (Chronisch obstruktive Lungenerkrankung)

| | | | | |
|---|-----------------------|--------------------------|--------------------|--------------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose COPD Alle Patient:innen >= 20 Jahre | < Erwartungswert a | 4,4% 3.028 von 68.894 | 5,7% 10 von 174 | 4,7% 1,22 |
|---|-----------------------|--------------------------|--------------------|--------------|

Lungenkrebs

| | | | | |
|--|------------------------|----------------------|-----|--|
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Lungenkrebs | Mengeninformation b | 201,7 (52) 68.189 | 161 | |
|--|------------------------|----------------------|-----|--|

Operationen an der Lunge

| | | | | |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------|--|
| Todesfälle bei größeren operativen Entfernungen von Lunge / Bronchien | Beobachtungswert a | 2,6% 369 von 14.271 | 0,8% 1 von 130 | |
| Todesfälle bei operativer Entfernung eines Lungenflügels bei Lungenkrebs | Beobachtungswert a | 12,5% 26 von 208 | n.a. <4 | |
| Todesfälle bei operativer Teilentfernung eines Lungenflügels bei Lungenkrebs | <2,0% a | 2,1% 143 von 6.886 | 1,7% 1 von 59 | |
| Anteil der operativen Entfernungen eines Lungenflügels bei Lungenkrebsbehandlungsfällen | <20% a / d | 2,9% 208 von 7.094 | 3,3% 2 von 61 | |
| Anteil der broncho- / angioplastischen Entfernungen eines Lungenflügels bei Lungenkrebsbehandlungen | Beobachtungswert a | 6,3% 433 von 6.886 | 3,4% 2 von 59 | |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2025

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

IQM Indikatoren

| IQM Zielwert | IQM Durchschnittswert | Klinik Ist-Wert | Klinik Erwartungswert |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Quelle | Fallzahl | Fallzahl | SMR |

Erkrankungen der Bauchorgane

Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen (ohne Tumor)

| | | | | |
|--|-----------------------|----------------------------|----------------------|--|
| Anteil laparoskopischer Operationen bei Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen | >95,6% a | 96,3% 51.540 von 53.503 | 99,4% 158 von 159 | |
| Anteil Umsteiger auf offene Operationen bei Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen | Beobachtungswert a | 2,3% 1.207 von 53.503 | 0,6% 1 von 159 | |
| Todesfälle bei Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen | <0,49% (SE) a / e | 0,4056% 217 von 53.503 | 0,0% 0 von 159 | |

Operation von Leisten-, Schenkel- und Nabelbrüchen (Hernien)

| | | | | |
|---|-----------------------|----------------------------|--------------------|--|
| Todesfälle bei Bruchoperationen ohne anteilige Darmentfernung | <0,11% (SE) a / e | 0,0864% 63 von 72.953 | 0,0% 0 von 90 | |
| Todesfälle bei Bruchoperationen mit anteiliger Darmentfernung | Beobachtungswert a | 2,1% 117 von 5.605 | 2,3% 1 von 44 | |
| Anteil Behandlungsfälle mit Leistenbruchoperation mit Netzeinlage Alle Patient:innen < 20 Jahre | Information a | 9,5% 332 von 3.503 | 0,0% 0 von 14 | |
| Anteil Behandlungsfälle mit Leistenbruchoperation mit Netzeinlage Alle Patient:innen >= 20 Jahre | Information a | 98,2% 44.477 von 45.272 | 94,2% 65 von 69 | |

Eingriffe an der Schilddrüse

| | | | | |
|--|---------------------------|------------------------|------------------|--|
| Behandlungsfälle mit operativer Entfernung der Schilddrüse | Mengeninformation b | 62,7 (22) 17.065 | 49 | |
| Behandlungsfälle mit operativer Entfernung der Schilddrüse bei Schilddrüsenkrebs | Mengeninformation b | 13,8 (6) 2.573 | 6 | |
| Behandlungsfälle mit operativer Entfernung der Schilddrüse bei gutartiger Erkrankung | Mengeninformation b | 52,9 (21) 13.601 | 42 | |
| Anteil der Beatmungsfälle (> 24 Std.) nach Schilddrüseneingriff | Information (SE) a / e | 0,49% 79 von 16.164 | 0,0% 0 von 48 | |

Große Operationen am Dick- und Enddarm (Kolon und Rektum)

| | | | | |
|---|------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Dick- / Enddarmkrebs | Mengeninformation b | 130,9 (88) 44.769 | 74 | |
| Behandlungsfälle mit Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn | Mengeninformation b | 104,8 (68) 38.685 | 106 | |
| Todesfälle bei operativer Entfernung des Dick- / Enddarms | Beobachtungswert a | 7,7% 2.799 von 36.313 | 12,3% 15 von 122 | |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2025

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert | IQM Durchschnittswert | Klinik Ist-Wert | Klinik Erwartungswert |
|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| | Quelle | Fallzahl | Fallzahl | SMR |
| Todesfälle bei operativer Dickdarmentfernung bei Krebs ohne komplizierende Diagnose | < Erwartungswert a / g | 3,0% 264 von 8.766 | 0,0% 0 von 22 | 2,6% 0,00 |
| Todesfälle bei operativer Dickdarmentfernung bei Krebs mit komplizierender Diagnose | Beobachtungswert a | 12,8% 325 von 2.541 | 14,3% 3 von 21 | |
| Todesfälle bei operativer Enddarmentfernung bei Krebs | <3,1% a | 2,7% 109 von 4.067 | 0,0% 0 von 10 | |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Divertikel ohne Abszess / Perforation | <0,85% (SE) a / e | 1,0706% 22 von 2.055 | 0,0% 0 von 8 | |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Divertikel mit Abszess / Perforation | Beobachtungswert a | 5,4% 257 von 4.760 | 14,3% 2 von 14 | |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Minderdurchblutung des Darmes | Information a | 43,5% 957 von 2.201 | 50,0% 3 von 6 | |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn | Beobachtungswert a | 2,9% 59 von 2.029 | 0,0% 0 von 5 | |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei anderen Diagnosen | Information a | 8,1% 806 von 9.894 | 19,4% 7 von 36 | |
| Anteil operative Leberentfernung bei Entfernung des Dick- / Enddarms bei Dick- und Enddarmkrebs | Information a | 4,4% 675 von 15.374 | 13,2% 7 von 53 | |
| Behandlungsfälle mit roboterassistiertem Eingriff bei Krebserkrankung des Darms | Information a | 26,2% 4.022 von 15.374 | 17,0% 9 von 53 | |
| Erkrankungen des Magens | | | | |
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Magenkrebs (mit und ohne Magenoperation) | Mengeninformation b | 50,1 (24) 16.284 | 24 | |
| Todesfälle bei Geschwüren an Magen, Zwölffingerdarm oder Dünndarm als Hauptdiagnose (mit und ohne Operation) | Beobachtungswert a | 5,0% 976 von 19.557 | 8,1% 5 von 62 | |
| Behandlungsfälle mit Magenentfernungen | Mengeninformation b | 41,2 (14) 10.577 | 41 | |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2025

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert Quelle | IQM Durchschnittswert Fallzahl | Klinik Ist-Wert Fallzahl | Klinik Erwartungswert SMR |
|--|--|---|---|--|
| Todesfälle bei operativer Magenentfernung bei Magenkrebs ohne Speiseröhreneingriff | Beobachtungswert a | 4,9% 103 von 2.083 | 0,0% 0 von 9 | |
| Todesfälle bei operativer Magenentfernung bei anderer Diagnose (nicht Magenkrebs) ohne Speiseröhreneingriff | Beobachtungswert a | 3,3% 273 von 8.277 | 6,3% 2 von 32 | |
| Adipositaschirurgie | | | | |
| Todesfälle im Rahmen der Adipositaschirurgie | Beobachtungswert (SE) a / e | 0,029% 3 von 10.329 | 0,0% 0 von 37 | |
| Eingriffe an der Bauchspeicheldrüse und der Leber | | | | |
| Todesfälle bei Eingriffen an der Bauchspeicheldrüse ohne Transplantation Alle Patient:innen >= 20 Jahre | Beobachtungswert a | 7,5% 439 von 5.870 | 8,3% 3 von 36 | |
| Todesfälle bei operativer Bauchspeicheldrüsenentfernung bei Bauchspeicheldrüsenkrebs | Beobachtungswert a | 5,7% 202 von 3.553 | 13,0% 3 von 23 | |
| Todesfälle bei anatomischer Teilentfernung der Leber Alle Patient:innen >= 20 Jahre | Beobachtungswert a | 6,1% 191 von 3.123 | 5,9% 1 von 17 | |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2025

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert | IQM Durchschnittswert | Klinik Ist-Wert | Klinik Erwartungswert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | Quelle | Fallzahl | Fallzahl | SMR |

Gefäßoperationen

Eingriffe an der Halsschlagader (Carotis)

| | | | | |
|--|-------------------|--------------|----------|--|
| Todesfälle bei ausschließlich extrakranieller Operation der Halsschlagader | <1,03% | 0,91% | 0,0% | |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | a | 89 von 9.740 | 0 von 50 | |
| Intrakranielle perkutan-transluminale Gefäßinterventionen | Mengeninformation | 121,3 (61) | 8 | |
| | b | 17.715 | | |

Eingriffe an der Hauptschlagader (Aorta)

| | | | | |
|--|-------------------|---------------|---------|--|
| Operation an der Hauptschlagader (Aorta) | Mengeninformation | 65,6 (32) | 10 | |
| | b | 12.064 | | |
| Operation an der Bauchaorta | Mengeninformation | 33,4 (27) | 7 | |
| | b | 5.878 | | |
| Todesfälle bei offener Operation eines nicht rupturierten Bauchaortenaneurysmas | <6,6% | 5,6% | n.a. | |
| | a | 52 von 936 | <4 | |
| Todesfälle bei endovaskulärer Stentimplantation eines nicht rupturierten Bauchaortenaneurysmas | <1,1% | 0,9% | n.a. | |
| | a | 30 von 3.371 | <4 | |
| Todesfälle bei rupturiertem Aortenaneurysma | Information | 41,9% | 0,0% | |
| | a | 820 von 1.958 | 0 von 4 | |
| Todesfälle bei Operation eines rupturierten Aortenaneurysmas | Information | 33,2% | n.a. | |
| | a | 349 von 1.051 | <4 | |

Eingriffe der Becken-/Bein-Arterien

| | | | | |
|--|-------------|------------------|----------|--|
| Todesfälle bei Operationen der Becken- / Beinarterien | Information | 5,6% | 5,4% | |
| | a | 1.631 von 29.015 | 4 von 74 | |
| davon Todesfälle bei Schaufensterkrankheit (Claudicatio) | <0,39% (SE) | 0,4797% | 0,0% | |
| | a / e | 27 von 5.629 | 0 von 4 | |
| davon Todesfälle bei Ruheschmerz | <2,0% | 1,0% | n.a. | |
| | a | 22 von 2.215 | <4 | |
| davon Todesfälle bei Ulzeration / Gangrän | <4,1% | 3,7% | 0,0% | |
| | a | 131 von 3.529 | 0 von 7 | |

PTA (Perkutan transluminale Gefäßinterventionen)

| | | | | |
|--|------------------|------------------|----------|--|
| Todesfälle bei Wiedereröffnung eines verschlossenen Bein- / Beckengefäßes mittels Ballonkatheter (PTA) | Beobachtungswert | 2,8% | 2,2% | |
| | a | 1.715 von 60.379 | 1 von 45 | |

Arteriovenöser Shunt

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|----|--|
| Anlegen eines arteriovenösen Shunts | Mengeninformation | 27,9 (15) | 13 | |
| | b | 5.138 | | |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2025

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

IQM Indikatoren

| IQM Zielwert | IQM Durchschnittswert | Klinik Ist-Wert | Klinik Erwartungswert |
|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| Quelle | Fallzahl | Fallzahl | SMR |

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Geburtshilfe

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|------------------------|--|
| Mütterliche Todesfälle bei der Geburt | <0,004% (SE) a / e | 0,0049% 11 von 223.685 | 0,0% 0 von 1.584 | |
| Anteil vaginale Geburten mit Dammriss 4. Grades | <0,112% (SE) a / e | 0,1157% 169 von 146.059 | 0,0% 0 von 1.059 | |
| Anteil vaginale Geburten mit Dammschnitt | Information a | 8,1% 11.868 von 146.059 | 8,6% 91 von 1.059 | |
| Anteil Kaiserschnitt an allen Geburten | Information a | 34,7% 77.626 von 223.685 | 33,1% 525 von 1.584 | |
| Anteil sanfter Kaiserschnitt (nach Misgav-Ladach) an allen Kaiserschnittgeburten | Information a | 80,7% 62.606 von 77.626 | 96,6% 507 von 525 | |
| Anteil Kaiserschnitte bei risikoarmer Geburt | Information a | 29,5% 57.649 von 195.520 | 27,0% 369 von 1.368 | |
| davon Anteil Kaiserschnitte bei risikoarmer Geburt | Information a | 27,0% 37.845 von 140.043 | 26,7% 283 von 1.061 | |
| Alle Patient:innen < 35 Jahre | | | | |
| davon Anteil Kaiserschnitte bei risikoarmer Geburt | Information a | 35,7% 19.804 von 55.477 | 28,0% 86 von 307 | |
| Alle Patient:innen > 34 Jahre | | | | |

Neugeborene

| | | | | |
|--|------------------------|-------------------------|-------|--|
| Neugeborene mit Geburtsgewicht < 1.250 Gramm | Mengeninformation b | 25,4 (26) 2.288 | 29 | |
| davon Neugeborene mit Geburtsgewicht < 500 Gramm | Mengeninformation b | 4,3 (3) 299 | 4 | |
| davon Neugeborene mit Geburtsgewicht von 500 bis 749 Gramm | Mengeninformation b | 7,9 (7) 554 | 8 | |
| davon Neugeborene mit Geburtsgewicht von 750 bis 999 Gramm | Mengeninformation b | 8,9 (8) 671 | 6 | |
| davon Neugeborene mit Geburtsgewicht von 1.000 bis 1.249 Gramm | Mengeninformation b | 9,8 (9) 764 | 11 | |
| Neugeborene mit Geburtsgewicht von 1.250 bis 1.499 Gramm | Mengeninformation b | 11,2 (10) 1.012 | 10 | |
| Neugeborene mit Geburtsgewicht von 1.500 bis 2.499 Gramm | Mengeninformation b | 71,8 (28) 13.713 | 133 | |
| Neugeborene mit Geburtsgewicht > 2.500 Gramm | Mengeninformation b | 1100,2 (805) 224.434 | 1.650 | |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2025

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert | IQM Durchschnittswert | Klinik Ist-Wert | Klinik Erwartungswert |
|--|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | Quelle | Fallzahl | Fallzahl | SMR |
| Frauenheilkunde | | | | |
| Todesfälle bei operativer Entfernung der Gebärmutter bei gutartigen Erkrankungen | <0,03% (SE) | 0,0517% | 0,0% | |
| Alle Patient:innen > 14 Jahre | a / e | 12 von 23.209 | 0 von 181 | |
| Anteil der Behandlungsfälle mit vaginaler / laparoskopischer Gebärmutterentfernung ohne plastische Operation | >89,0% | 90,9% | 99,4% | |
| Alle Patient:innen > 14 Jahre | a | 20.890 von 22.981 | 180 von 181 | |
| Anteil der Behandlungsfälle mit vaginaler Gebärmutterentfernung ohne plastische Operation | Information | 21,0% | 0,6% | |
| Alle Patient:innen > 14 Jahre | a | 4.823 von 22.981 | 1 von 181 | |
| Anteil der Behandlungsfälle mit vaginaler Gebärmutterentfernung mit Zerkleinerung der Gebärmutter | Information | 5,3% | n.a. | |
| Alle Patient:innen > 14 Jahre | a | 255 von 4.823 | <4 | |
| Anteil der Behandlungsfälle mit laparoskopischer Gebärmutterentfernung ohne plastische Operation | Information | 69,9% | 98,9% | |
| Alle Patient:innen > 14 Jahre | a | 16.067 von 22.981 | 179 von 181 | |
| Anteil der Behandlungsfälle mit laparoskopischer Gebärmutterentfernung mit Zerkleinerung der Gebärmutter | Information | 25,0% | 0,0% | |
| Alle Patient:innen > 14 Jahre | a | 4.013 von 16.067 | 0 von 179 | |
| Anteil der Behandlungsfälle mit Eierstock- und Gebärmutterentfernung bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose | Information | 5,3% | 0,0% | |
| Alle Patient:innen > 14 und < 50 Jahre | a | 393 von 7.416 | 0 von 45 | |
| Anteil der Behandlungsfälle mit Eierstock- und Gebärmutterentfernung bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose | Information | 35,2% | 35,0% | |
| Alle Patient:innen >= 50 Jahre | a | 2.952 von 8.396 | 36 von 103 | |
| Bösartige Neubildungen der Brust und der weiblichen Geschlechtsorgane | | | | |
| Behandlungsfälle mit Krebserkrankung der Brust oder der Geschlechtsorgane als Hauptdiagnose | Mengeninformation | 228,1 (58) | 311 | |
| | b | 77.084 | | |
| Behandlungsfälle mit Eierstockkrebs als Hauptdiagnose | Mengeninformation | 34,5 (12) | 9 | |
| | b | 10.190 | | |
| Todesfälle nach Eierstockentfernung bei Eierstockkrebs | Beobachtungswert | 1,2% | n.a. | |
| | a | 31 von 2.683 | <4 | |
| Behandlungsfälle mit Gebärmutterkrebs als Hauptdiagnose | Mengeninformation | 55,6 (31) | 27 | |
| | b | 15.289 | | |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2025

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert Quelle | IQM Durchschnittswert Fallzahl | Klinik Ist-Wert Fallzahl | Klinik Erwartungs- wert SMR |
|---|---|--|--|--|
| Todesfälle nach Gebärmutterentfernung bei Gebärmutterkrebs | Beobachtungswert (SE) a / e | 0,76% 43 von 5.683 | 0,0% 0 von 19 | |
| Behandlungsfälle mit Brustkrebs als Hauptdiagnose | Mengeninformation b | 145,7 (22) 47.641 | 272 | |
| Eingriffe an der Brust | | | | |
| Eingriffe an der Brust | Mengeninformation b | 212,4 (170) 41.835 | 292 | |
| Operationen der Brust bei Brustkrebs | Mengeninformation b | 199,4 (187) 30.903 | 232 | |
| Anteil brusterhaltender Operationen bei Brustkrebs | Information a | 73,4% 22.682 von 30.903 | 75,4% 175 von 232 | |
| Eingriffe am Beckenboden bei der Frau | | | | |
| Behandlungsfälle mit Beckenbodenoperationen mit und ohne plastische Operation | Mengeninformation b | 85,0 (64) 21.002 | 154 | |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2025

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

IQM Indikatoren

| IQM Zielwert | IQM Durchschnittswert | Klinik Ist-Wert | Klinik Erwartungswert |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Quelle | Fallzahl | Fallzahl | SMR |

Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe

Bösartige Neubildungen des Bewegungsapparates

Behandlungsfälle mit bösartiger Neubildung an Knochen, Gelenknorpel, peripheren Nerven, Retroperitoneum, Bindegewebe, Weichteilen

| Mengeninformation | 53,6 (6) | 5 | |
|-------------------|----------|---|--|
| b | 15.709 | | |

Gelenkersatz (Endoprothetik)

Todesfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung

| <0,10% (SE) | 0,0851% | 0,0% | |
|-------------|---------------|----------|--|
| a / e | 52 von 61.092 | 0 von 12 | |

Todesfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei hüftgelenksnahen Frakturen

| Beobachtungswert | 4,8% | 5,4% | |
|------------------|------------------|----------|--|
| a | 1.015 von 21.202 | 3 von 56 | |

Todesfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei anderen Diagnosen

| Beobachtungswert | 4,7% | 0,0% | |
|------------------|---------------|----------|--|
| a | 341 von 7.183 | 0 von 21 | |

Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung

| Beobachtungswert | 1,8% | 0,0% | |
|------------------|------------------|----------|--|
| a | 1.108 von 61.092 | 0 von 12 | |

Todesfälle bei Wechsel eines Hüftgelenkersatzes ohne Fraktur oder Infektion

| <1,39% (SE) | 1,17% | n.a. | |
|-------------|--------------|------|--|
| a / e | 56 von 4.806 | <4 | |

Todesfälle bei Wechsel eines Hüftgelenkersatzes wegen Fraktur oder Infektion

| Beobachtungswert | 3,5% | 0,0% | |
|------------------|---------------|---------|--|
| a | 153 von 4.343 | 0 von 4 | |

Todesfälle bei Kniegelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung

| <0,04% (SE) | 0,0287% | 0,0% | |
|-------------|---------------|---------|--|
| a / e | 19 von 66.269 | 0 von 4 | |

Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei Kniegelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung

| Beobachtungswert | 1,2% | 0,0% | |
|------------------|----------------|---------|--|
| a | 791 von 66.269 | 0 von 4 | |

Todesfälle bei Wechsel eines Kniegelenk- oder -teilersatzes ohne Fraktur oder Infektion

| <0,34% (SE) | 0,3236% | n.a. | |
|-------------|--------------|------|--|
| a / e | 18 von 5.562 | <4 | |

Todesfälle bei Hüft- oder Kniegelenkersatz bei Tumorerkrankung

| Beobachtungswert | 5,8% | 20,0% | |
|------------------|---------------|---------|--|
| a | 149 von 2.574 | 1 von 5 | |

Gelenkersatz am Schulter- / Ellenbogengelenk

| Mengeninformation | 41,4 (30) | 33 | |
|-------------------|-----------|----|--|
| b | 13.375 | | |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2025

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert <u>Quelle</u> | IQM Durchschnittswert <u>Fallzahl</u> | Klinik Ist-Wert <u>Fallzahl</u> | Klinik Erwartungswert <u>SMR</u> |
|---|-------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|
| Hüftgelenknahe Frakturen | | | | |
| Todesfälle nach operativer Versorgung einer Schenkelhalsfraktur als Hauptdiagnose | < Erwartungswert | 4,4% | 3,6% | 4,8% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | a | 1.012 von 23.119 | 2 von 56 | 0,74 |
| Todesfälle nach Gelenkersatz bei Schenkelhalsfraktur als Hauptdiagnose | Beobachtungswert | 4,8% | 3,8% | |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | a | 990 von 20.781 | 2 von 53 | |
| Todesfälle nach Osteosynthese (Verbindung der Knochenfragmente durch Platten, Schrauben oder Nägel) bei Schenkelhalsfraktur als Hauptdiagnose | Beobachtungswert | 0,9% | n.a. | |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | a | 22 von 2.338 | <4 | |
| Todesfälle nach operativer Versorgung einer pertrochantären Fraktur als Hauptdiagnose | < Erwartungswert | 4,5% | 2,9% | 4,2% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | a | 825 von 18.402 | 1 von 35 | 0,68 |
| Todesfälle nach Gelenkersatz bei pertrochantärer Fraktur als Hauptdiagnose | Beobachtungswert | 5,7% | n.a. | |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | a | 22 von 389 | <4 | |
| Todesfälle nach Osteosynthese (Verbindung der Knochenfragmente durch Platten, Schrauben oder Nägel) bei pertrochantärer Fraktur als Hauptdiagnose | Beobachtungswert | 4,5% | 0,0% | |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | a | 803 von 18.013 | 0 von 32 | |
| Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark | | | | |
| Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark (ohne lokale Schmerztherapie) | Mengeninformation | 378,1 (258) | 157 | |
| | b | 120.250 | | |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder Wirbelkörper-Ersatz bei Tumor (inkl. komplexe Rekonstruktionen) | Beobachtungswert | 7,9% | n.a. | |
| | a | 300 von 3.797 | <4 | |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder Wirbelkörper-Ersatz bei Trauma (inkl. komplexe Rekonstruktionen, Rückenmarkoperation) | Beobachtungswert | 3,6% | 2,2% | |
| | a | 544 von 15.302 | 1 von 45 | |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Operation bei Entzündung der Bandscheibe oder des Rückenmarks | Beobachtungswert | 6,6% | 0,0% | |
| | a | 188 von 2.870 | 0 von 5 | |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder 1 Wirbelkörper-Ersatz (ohne Tumor, Trauma oder kompl. Rekonstruktionen) | Beobachtungswert (SE) | 0,1155% | 0,0% | |
| | a / e | 16 von 13.851 | 0 von 8 | |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder 2 Wirbelkörper-Ersatz (ohne Tumor, Trauma oder kompl. Rekonstruktionen) | Beobachtungswert (SE) | 0,2392% | 0,0% | |
| | a / e | 18 von 7.525 | 0 von 7 | |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2025

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert <u>Quelle</u> | IQM Durchschnittswert <u>Fallzahl</u> | Klinik Ist-Wert <u>Fallzahl</u> | Klinik Erwartungswert <u>SMR</u> |
|--|--------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder 3 oder mehr Wirbelkörper-Ersatz (ohne Tumor, Trauma oder kompl. Rekonstruktionen) | Beobachtungswert (SE) a / e | 0,7797% 47 von 6.028 | 0,0% 0 von 7 | |
| Todesfälle bei alleiniger 'Entlastung' (Dekompression) der Wirbelsäule | Beobachtungswert (SE) a / e | 0,0552% 13 von 23.538 | 0,0% 0 von 9 | |
| Todesfälle bei 'einfachen' Bandscheibenentfernungen | <0,03% (SE) a / e | 0,0428% 7 von 16.355 | 0,0% 0 von 34 | |
| Todesfälle bei Vertebro- / Kyphoplastie (ohne Tumor, Trauma, kompl. Rekonstruktion, Versteifung, WK-Ersatz oder Bandscheibeneingriffe) | <0,44% (SE) a / e | 0,432% 28 von 6.482 | 0,0% 0 von 22 | |
| Todesfälle bei anderen Operationen an der Wirbelsäule oder am Rückenmark | Beobachtungswert a | 1,8% 428 von 23.602 | 0,0% 0 von 17 | |
| Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei 'einfachen' Bandscheibenentfernungen | Beobachtungswert (SE) a / e | 0,428% 70 von 16.355 | 2,9412% 1 von 34 | |
| Lokale Schmerztherapie an der Wirbelsäule (ohne andere Wirbelsäulen- oder Rückenmarkoperation) | Mengeninformation b | 91,7 (41) 28.974 | 58 | |
| Behandlungsfälle mit Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen als Hauptdiagnose ohne Operation oder lokale Schmerztherapie | Mengeninformation b | 151,9 (125) 55.455 | 255 | |
| Mehrfachverletzungen - Polytraumen | | | | |
| Mehrfachverletzungen (Polytraumen) im Sinne der DRG-Definition | Mengeninformation b | 23,0 (8) 7.352 | 31 | |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2025

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert | IQM Durchschnittswert | Klinik Ist-Wert | Klinik Erwartungswert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | Quelle | Fallzahl | Fallzahl | SMR |

Urologie

Operationen der Niere

| | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------|------------------|--|
| Todesfälle bei Totalentfernung der Niere bei bösartiger Neubildung | <1,5% a | 1,7% 56 von 3.246 | n.a. <4 | |
| Anteil laparoskopischer Operationen bei Totalentfernung der Niere bei bösartiger Neubildung | Information a | 54,2% 1.760 von 3.246 | n.a. <4 | |
| Todesfälle bei Teilentfernung der Niere bei bösartiger Neubildung | <0,26% (SE) a / e | 0,2352% 9 von 3.827 | n.a. <4 | |
| Anteil laparoskopischer Operationen bei Teilentfernung der Niere bei bösartiger Neubildung | Information a | 73,1% 2.797 von 3.827 | n.a. <4 | |
| Anteil der Teilentfernungen der Niere bei bösartiger Neubildung | Information a | 54,1% 3.827 von 7.073 | 50,0% 3 von 6 | |
| Todesfälle bei Totalentfernung der Niere bei anderer Diagnose | Beobachtungswert a | 3,9% 89 von 2.299 | n.a. <4 | |
| Todesfälle bei Teilentfernung der Niere bei anderer Diagnose | Beobachtungswert (SE) a / e | 0,4821% 7 von 1.452 | n.a. <4 | |
| Behandlungsfälle mit roboterassistierter Nierenentfernung bei bösartiger Neubildung | Information a | 54,8% 3.878 von 7.073 | 50,0% 3 von 6 | |

Harnblase

| | | | | |
|---|------------------------|---------------------------|-------------------|--|
| Behandlungsfälle mit Blasenkrebs als Hauptdiagnose | Mengeninformation b | 139,7 (40) 41.061 | 21 | |
| Operationen an der Harnblase durch die Harnröhre | Mengeninformation b | 224,3 (228) 43.068 | 29 | |
| Operationen an der Harnblase durch die Harnröhre bei Blasenkrebs | Mengeninformation b | 173,4 (170) 29.998 | 18 | |
| Operationen an der Harnblase durch die Harnröhre bei Blasenkrebs mit Einbringen von Chemotherapeutika | Beobachtungswert a | 18,0% 5.407 von 29.998 | 16,7% 3 von 18 | |
| Todesfälle bei Entfernung der Harnblase | <4,6% a | 4,5% 129 von 2.845 | n.a. <4 | |
| Behandlungsfälle mit roboterassistierter Harnblasenentfernung | Information a | 26,1% 876 von 3.354 | n.a. <4 | |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2025

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert Quelle | IQM Durchschnittswert Fallzahl | Klinik Ist-Wert Fallzahl | Klinik Erwartungswert SMR |
|--|--|---|---|--|
| Prostata | | | | |
| Todesfälle bei Operationen der Prostata durch die Harnröhre bei gutartigen Erkrankungen | <0,16% (SE) a / e | 0,1293% 35 von 27.073 | 0,0% 0 von 93 | |
| Todesfälle bei Operationen der Prostata durch die Harnröhre bei bösartigen Erkrankungen | Beobachtungswert (SE) a / e | 0,5391% 40 von 7.420 | 0,0% 0 von 17 | |
| Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei Behandlungsfällen mit Operation der Prostata durch die Harnröhre | Beobachtungswert a | 3,5% 1.205 von 34.493 | 5,5% 6 von 110 | |
| Behandlungsfälle mit Prostatakrebs als Hauptdiagnose | Mengeninformation b | 119,7 (22) 37.240 | 21 | |
| Todesfälle bei radikaler Prostataentfernung | <0,15% (SE) a / e | 0,1495% 20 von 13.375 | 0,0% 0 von 7 | |
| Behandlungsfälle mit roboterassistierter Prostataentfernung | Information a | 86,9% 11.622 von 13.375 | 100,0% 7 von 7 | |
| Nierensteine | | | | |
| Behandlungsfälle mit Nierensteinen als Hauptdiagnose | Mengeninformation b | 222,0 (50) 72.590 | 154 | |
| Anteil der Behandlungsfälle mit Intervention zur Steinentfernung bei Hauptdiagnose Nierensteine | Information a | 53,2% 38.601 von 72.590 | 33,1% 51 von 154 | |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2025

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert Quelle | IQM Durchschnittswert Fallzahl | Klinik Ist-Wert Fallzahl | Klinik Erwartungs- wert SMR |
|-----------------|---|--|--|--|
|-----------------|---|--|--|--|

Hautkrankheiten

Hautkrankheiten

| | | | | |
|---|----------------------------|------------------------|----------------|--|
| Behandlungsfälle mit Melanom als Hauptdiagnose | Mengeninformation b | 58,3 (5) 13.756 | n.a. <4 | |
| Behandlungsfälle mit Dermatitis und Ekzem als Hauptdiagnose | Mengeninformation b | 39,3 (7) 12.062 | 5 | |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2025

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert | IQM Durchschnittswert | Klinik Ist-Wert | Klinik Erwartungswert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | Quelle | Fallzahl | Fallzahl | SMR |

Intensivmedizin

Intensivmedizin

| | | | | |
|---|------------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| Todesfälle bei Beatmung > 24 Stunden ohne Neugeborene | Information a | 34,3% 31.307 von 91.338 | 41,7% 96 von 230 | |
| ECLS/ECMO - Herz- / Herz-Lungenunterstützung | Mengeninformation b | 40,8 (14) 3.505 | n.a. <4 | |
| Todesfälle bei Beatmung > 24 Stunden ohne Neugeborene und ohne COVID-19 Fälle | <34,5% a | 34,2% 30.645 von 89.663 | 41,7% 95 von 228 | |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger als Hauptdiagnose | < Erwartungswert a | 30,5% 10.635 von 34.828 | 32,4% 35 von 108 | 31,6% 1,03 |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger als Hauptdiagnose mit Organkomplikation / Schock | Beobachtungswert a | 32,3% 10.147 von 31.457 | 36,2% 34 von 94 | |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger als Hauptdiagnose ohne Organkomplikation / Schock | Beobachtungswert a | 14,5% 488 von 3.371 | 7,1% 1 von 14 | |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger oder SIRS als Nebendiagnose | Beobachtungswert a | 34,4% 24.818 von 72.163 | 37,2% 68 von 183 | |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger oder SIRS als Nebendiagnose mit Organkomplikation / Schock | Beobachtungswert a | 35,0% 24.327 von 69.476 | 37,8% 68 von 180 | |
| Todesfälle bei generalisierter Entzündungsreaktion des gesamten Körpers ohne Organkomplikation (SIRS) | Information a | 5,5% 3.854 von 70.137 | 0,0% 0 von 21 | |

Angeborene Gerinnungsstörung und Bluttransfusion

| | | | | |
|--|------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|
| Behandlungsfälle mit angeborenen Gerinnungsstörungen als Haupt- oder Nebendiagnose | Mengeninformation b | 31,7 (13) 11.302 | 32 | |
| davon operierte Behandlungsfälle mit angeborenen Gerinnungsstörungen als Haupt- oder Nebendiagnose | Mengeninformation b | 21,7 (8) 7.304 | 13 | |
| Anteil operierter Behandlungsfälle mit Bluttransfusion | Information a | 7,6% 189.682 von 2.495.305 | 7,6% 461 von 6.028 | |

Obduktionen

| | | | | |
|----------------|------------------|----------------------------|-------------------|--|
| Obduktionsrate | Information a | 0,71% 1.138 von 159.648 | 0,0% 0 von 559 | |
|----------------|------------------|----------------------------|-------------------|--|

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2025

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

IQM Indikatoren

| IQM Zielwert | IQM Durchschnittswert | Klinik Ist-Wert | Klinik Erwartungswert |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Quelle | Fallzahl | Fallzahl | SMR |

Roboterassistierte Eingriffe

Roboterassistierte Eingriffe

| | | | | |
|--|-------------------|-------------|-----|--|
| Viszeralchirurgische und urologische Eingriffe mittels Roboterchirurgie (Darm-, Nieren-, Blasen- oder Prostataeingriffe) | Mengeninformation | 165,5 (137) | 20 | |
| | b | 20.359 | | |
| Behandlungsfälle mit roboterassistiertem Eingriff GESAMT | Mengeninformation | 310,6 (254) | 247 | |
| | b | 43.168 | | |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert | IQM Durchschnittswert | Klinik Ist-Wert | Klinik Erwartungswert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | Quelle | Fallzahl | Fallzahl | SMR |

Herzerkrankungen

Herzinfarkt

| | | | | |
|--|------------------|-------------------|-------------|-------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Herzinfarkt | < Erwartungswert | 7,1% | 7,9% | 8,7% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | a / g | 5.140 von 71.935 | 21 von 265 | 0,91 |
| Anteil der Herzinfarkte mit Linksherzkatheter | Information | 85,2% | 92,8% | |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | a | 61.302 von 71.935 | 246 von 265 | |
| Todesfälle bei Direktaufnahme ohne Verlegung | Beobachtungswert | 7,1% | 7,6% | |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | a | 4.591 von 64.640 | 20 von 263 | |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Transmuraler Herzinfarkt | < Erwartungswert | 11,0% | 11,8% | 12,1% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | a | 2.678 von 24.302 | 9 von 76 | |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Nicht-transmuraler Herzinfarkt (NSTEMI) | < Erwartungswert | 4,8% | 5,9% | 5,9% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | a | 2.237 von 47.006 | 11 von 187 | |
| Todesfälle bei Nebendiagnose Herzinfarkt | Beobachtungswert | 17,4% | 19,3% | |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | a | 3.586 von 20.571 | 16 von 83 | |

Herzinsuffizienz

| | | | | |
|---|------------------|--------------------|-------------|------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Herzinsuffizienz | < Erwartungswert | 7,6% | 8,1% | 7,7% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | a / g | 12.620 von 165.215 | 65 von 801 | 1,05 |
| Anteil Behandlungsfälle mit Beschwerden bei Linksherzinsuffizienz bereits im Ruhezustand (NYHA IV) | Information | 46,5% | 38,3% | |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | a | 52.863 von 113.800 | 188 von 491 | |
| Anteil Behandlungsfälle mit Beschwerden bei Rechtsherzinsuffizienz bereits im Ruhezustand (NYHA IV) | Information | 5,5% | 1,6% | |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | a | 2.676 von 48.667 | 5 von 309 | |

Linksherzkatheter

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-----------|------|
| Anzahl aller Linksherzkatheter zur Koronaragnostik | Mengeninformation | 889,0 (815) | 1.504 | |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | b | 274.697 | | |
| Todesfälle mit Linksherzkatheter bei Herzinfarkt ohne Zuverlegungen oder Herz-Kreislauf-Stillstand vor Krankenhaus-Aufnahme und ohne Herzoperation | < Erwartungswert | 4,2% | 3,0% | 5,3% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | a | 2.305 von 54.651 | 7 von 232 | 0,57 |
| Todesfälle bei diagnostischem Linksherzkatheter ohne Hauptdiagnose Herzinfarkt, ohne Zuverlegungen oder Herz-Kreislauf-Stillstand vor Krankenhaus-Aufnahme und ohne Herzoperation | < Erwartungswert | 1,1% | 0,8% | 1,2% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | a | 1.238 von 117.530 | 6 von 744 | 0,66 |
| Todesfälle bei therapeutischem Linksherzkatheter ohne Hauptdiagnose Herzinfarkt, ohne Zuverlegungen oder Herz-Kreislauf-Stillstand vor Krankenhaus-Aufnahme und ohne Herzoperation | < Erwartungswert | 1,3% | 1,2% | 1,3% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | a | 1.012 von 75.885 | 6 von 484 | |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert Quelle | IQM Durchschnittswert Fallzahl | Klinik Ist-Wert Fallzahl | Klinik Erwartungswert SMR |
|---|--|---|---|--|
| Anteil der Behandlungen mit therapeutischem Linksherzkatheter ohne Hauptdiagnose Herzinfarkt und ohne Herzoperation Alle Patient:innen >= 20 Jahre | Information a | 39,1% 78.256 von 200.221 | 39,2% 485 von 1.236 | |
| Herzrhythmusstörungen | | | | |
| Behandlungsfälle mit Herzrhythmusstörungen als Hauptdiagnose | Mengeninformation b | 536,5 (364) 189.390 | 651 | |
| Versorgung mit Schrittmacher oder Defibrillator | | | | |
| Versorgung mit Herzschrittmacher <u>oder</u> Defibrillator | Mengeninformation b | 160,7 (115) 48.200 | 86 | |
| Versorgung mit Herzschrittmacher <u>und</u> Defibrillator | Mengeninformation b | 51,4 (36) 12.596 | 10 | |
| Ablative Therapie | | | | |
| Behandlungsfälle mit kathetergestützter ablativer Therapie | Mengeninformation b | 347,9 (275) 60.183 | 147 | |
| davon Vorhoffablation bei Vorhofflimmern / -flattern, Anteil Todesfälle Alle Patient:innen >= 20 Jahre | Information (SE) a / e | 0,0647% 26 von 40.176 | 0,0% 0 von 77 | |
| Eingriffe am Herzen | | | | |
| Behandlungsfälle mit Eingriff am Herzen | Mengeninformation b | 300,0 (16) 59.994 | 93 | |
| davon Eingriff an Herzklappen | Mengeninformation b | 338,6 (40) 41.990 | 83 | |
| davon andere Eingriffe am Herzen | Mengeninformation b | 66,4 (3) 11.153 | 10 | |
| davon Eingriffe bei Kindern und Jugendlichen Alle Patient:innen < 20 Jahre | Mengeninformation b | 64,7 (3) 2.201 | n.a. <4 | |
| Todesfälle bei minimalinvasivem Eingriff an Mitral- oder Trikuspidalklappe | Beobachtungswert a | 1,6% 120 von 7.511 | 1,3% 1 von 80 | |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

IQM Indikatoren

| IQM Zielwert | IQM Durchschnittswert | Klinik Ist-Wert | Klinik Erwartungswert |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Quelle | Fallzahl | Fallzahl | SMR |

Erkrankungen des Nervensystems und Schlaganfall

Bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhäute

| | | | | |
|---|-------------------|----------|---|--|
| Bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhäute als Hauptdiagnose | Mengeninformation | 40,4 (6) | 8 | |
| | b | 9.972 | | |

Todesfälle bei allen Formen des Schlaganfalls

| | | | | |
|---|------------------|--------------------|------------|------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Schlaganfall | < Erwartungswert | 9,8% | 7,3% | 9,5% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | a | 10.796 von 109.817 | 62 von 844 | |

Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirninfarkt

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------|------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirninfarkt | < Erwartungswert | 7,1% | 5,1% | 6,2% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | a / g | 6.704 von 94.192 | 38 von 745 | |

Anteil der Hirninfarkte mit medikamentöser Auflösung des Blutgerinnsels (Thrombolyse) ohne Zuverlegungen

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--|
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | Information | 18,4% | 19,7% | |
| | a | 15.895 von 86.445 | 142 von 720 | |

Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirninfarkt mit medikamentöser Auflösung des Blutgerinnsels (Thrombolyse) ohne Zuverlegungen

| | | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|-----------|--|
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | Beobachtungswert | 6,9% | 2,8% | |
| | a | 1.096 von 15.895 | 4 von 142 | |

Anteil Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Hirninfarkt mit Entfernung des Blutgerinnsels durch Katheter (Thrombektomie)

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-----------|--|
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | Information | 11,2% | 0,4% | |
| | a | 10.700 von 95.286 | 3 von 748 | |

Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirninfarkt mit Entfernung des Blutgerinnsels durch Katheter (Thrombektomie)

| | | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|------|--|
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | < Erwartungswert | 20,2% | n.a. | |
| | a | 2.161 von 10.700 | <4 | |

Anteil der Hirninfarkte mit Lungenentzündung, die bei Aufnahme nicht bestand

| | | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------|--|
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | Beobachtungswert | 5,0% | 4,8% | |
| | a | 4.760 von 95.286 | 36 von 748 | |

Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirninfarkt mit Lungenentzündung, die bei Aufnahme nicht bestand

| | | | | |
|--------------------------------|------------------|-----------------|----------|--|
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | Beobachtungswert | 25,9% | 22,2% | |
| | a | 1.233 von 4.760 | 8 von 36 | |

Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirnblutung (intrazerebral)

| | | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|-----------|--|
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | Beobachtungswert | 29,0% | 25,0% | |
| | a | 3.395 von 11.727 | 21 von 84 | |

Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirnblutung (subarachnoidal)

| | | | | |
|--------------------------------|------------------|---------------|----------|--|
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | Beobachtungswert | 18,6% | 20,0% | |
| | a | 699 von 3.762 | 3 von 15 | |

Anteil nicht näher bezeichneter Schlaganfälle als Hauptdiagnose

| | | | | |
|--------------------------------|--------|-----------------|-----------|--|
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | <0,40% | 0,22% | 0,0% | |
| | a | 243 von 111.398 | 0 von 852 | |

Todesfälle bei Hauptdiagnose TIA ohne Neubildungen und Kopfverletzungen

| | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|---------------|-----------|--|
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | Beobachtungswert (SE) | 0,2713% | 0,2625% | |
| | a / e | 95 von 35.014 | 1 von 381 | |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert Quelle | IQM Durchschnittswert Fallzahl | Klinik Ist-Wert Fallzahl | Klinik Erwartungswert SMR |
|---|--|---|---|--|
| Behandlung auf einer Stroke Unit | | | | |
| Behandlungsfälle mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung | Mengeninformation b | 543,2 (555) 112.440 | 884 | |
| Anteil Hauptdiagnose Hirninfarkte mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung Alle Patient:innen >= 20 Jahre | Information a | 76,8% 73.226 von 95.286 | 70,6% 528 von 748 | |
| Anteil Hauptdiagnose TIA mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung Alle Patient:innen >= 20 Jahre | Information a | 77,1% 27.161 von 35.246 | 77,9% 299 von 384 | |
| Anteil mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung ohne Zuverlegungen (in Anlehnung an Schlaganfallregister) bei Hauptdiagnose Hirninfarkt oder TIA Alle Patient:innen >= 20 Jahre | Beobachtungswert a | 78,7% 95.993 von 121.947 | 72,9% 804 von 1.103 | |
| Anteil mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung nur Zuverlegungen (in Anlehnung an Schlaganfallregister) bei Hauptdiagnose Hirninfarkt oder TIA Alle Patient:innen >= 20 Jahre | Information a | 51,2% 4.394 von 8.585 | 79,3% 23 von 29 | |
| Epilepsie | | | | |
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Epilepsie Alle Patient:innen >= 20 Jahre | Mengeninformation b | 123,6 (46) 40.650 | 250 | |
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Epilepsie Alle Patient:innen < 20 Jahre | Mengeninformation b | 55,1 (20) 11.237 | 34 | |
| Multiple Sklerose | | | | |
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Multiple Sklerose | Mengeninformation b | 38,3 (23) 8.925 | 38 | |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert Quelle | IQM Durchschnittswert Fallzahl | Klinik Ist-Wert Fallzahl | Klinik Erwartungs- wert SMR |
|-----------------|---|--|--|--|
|-----------------|---|--|--|--|

Altersmedizin

Geriatrische Frührehabilitation

| | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|-----|--|
| Behandlungsfälle mit geriatrischer Frührehabilitation | Mengeninformation b | 536,1 (447) 120.622 | 299 | |
|---|----------------------------|----------------------------|-----|--|

Mangelernährung bei Älteren

| | | | | |
|--|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|
| Anteil Behandlungsfälle mit erheblicher Mangelernährung und ohne Tumorerkrankung Alle Patient:innen >= 65 Jahre | Information a | 0,88% 21.744 von 2.481.801 | 0,32% 26 von 8.142 | |
|--|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|--|
| Anteil Behandlungsfälle mit Sonden- / Infusionsernährung bei erheblicher Mangelernährung und ohne Tumorerkrankung Alle Patient:innen >= 65 Jahre | Information a | 1,6% 353 von 21.744 | 0,0% 0 von 26 | |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|--|

Delir

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------------------|---------------------------|--|
| Anteil Behandlungsfälle mit aufgetretenem Delir an operierten Fällen Alle Patient:innen >= 60 Jahre | Information a | 3,1% 40.830 von 1.333.659 | 4,6% 129 von 2.815 | |
|--|----------------------|----------------------------------|---------------------------|--|

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert | IQM Durchschnittswert | Klinik Ist-Wert | Klinik Erwartungswert |
|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| | Quelle | Fallzahl | Fallzahl | SMR |

Lungenerkrankungen

Lungenentzündung (Pneumonie)

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung alle Altersgruppen | < Erwartungswert a | 10,0% 16.244 von 162.957 | 9,8% 82 von 837 | 8,9% |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung ohne Zuverlegung, Tumor, Mukoviszidose Alle Patient:innen >= 20 Jahre | < Erwartungswert a | 9,2% 10.244 von 111.620 | 9,4% 38 von 403 | 10,5% |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung ohne Zuverlegung, Tumor, Mukoviszidose, COVID-19 Alle Patient:innen >= 20 Jahre | < Erwartungswert a / g | 8,5% 8.501 von 99.877 | 8,3% 31 von 372 | 9,1% 0,91 |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung ohne Zuverlegung, Tumor, Mukoviszidose Alle Patient:innen 1 bis 19 Jahre | Beobachtungswert (SE) a / e | 0,18% 34 von 19.307 | 0,41% 1 von 244 | |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung durch Aspiration von Nahrungsmitteln oder Mageninhalt | Beobachtungswert a | 27,6% 3.415 von 12.361 | 38,7% 36 von 93 | |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Bronchitis oder Bronchiolitis ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose Alle Patient:innen >= 20 Jahre | < Erwartungswert a | 1,9% 253 von 13.163 | 1,9% 1 von 53 | 1,4% |

COPD (Chronisch obstruktive Lungenerkrankung)

| | | | | |
|---|-----------------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose COPD Alle Patient:innen >= 20 Jahre | < Erwartungswert a | 4,4% 2.904 von 66.296 | 4,4% 8 von 182 | 4,8% 0,92 |
|---|-----------------------|--------------------------|-------------------|--------------|

Lungenkrebs

| | | | | |
|--|------------------------|----------------------|-----|--|
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Lungenkrebs | Mengeninformation b | 195,9 (52) 66.593 | 239 | |
|--|------------------------|----------------------|-----|--|

Operationen an der Lunge

| | | | | |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------|--|
| Todesfälle bei größeren operativen Entfernungen von Lunge / Bronchien | Beobachtungswert a | 2,6% 344 von 13.490 | 1,9% 3 von 154 | |
| Todesfälle bei operativer Teilentfernung eines Lungenflügels bei Lungenkrebs | <2,0% a | 2,0% 126 von 6.232 | 0,0% 0 von 79 | |
| Anteil der operativen Entfernungen eines Lungenflügels bei Lungenkrebsbehandlungsfällen | <20% a / d | 3,1% 198 von 6.430 | 0,0% 0 von 79 | |
| Anteil der broncho- / angioplastischen Entfernungen eines Lungenflügels bei Lungenkrebsbehandlungen | Beobachtungswert a | 7,0% 434 von 6.232 | 0,0% 0 von 79 | |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

IQM Indikatoren

| IQM Zielwert | IQM Durchschnittswert | Klinik Ist-Wert | Klinik Erwartungswert |
|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| Quelle | Fallzahl | Fallzahl | SMR |

Erkrankungen der Bauchorgane

Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen (ohne Tumor)

| | | | | |
|--|-----------------------|----------------------------|----------------------|--|
| Anteil laparoskopischer Operationen bei Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen | >95,6% a | 96,0% 49.748 von 51.819 | 99,3% 141 von 142 | |
| Anteil Umsteiger auf offene Operationen bei Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen | Beobachtungswert a | 2,4% 1.238 von 51.819 | 0,0% 0 von 142 | |
| Todesfälle bei Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen | <0,49% (SE) a / e | 0,467% 242 von 51.819 | 0,0% 0 von 142 | |

Operation von Leisten-, Schenkel- und Nabelbrüchen (Hernien)

| | | | | |
|---|-----------------------|----------------------------|--------------------|--|
| Todesfälle bei Bruchoperationen ohne anteilige Darmentfernung | <0,11% (SE) a / e | 0,1021% 70 von 68.584 | 0,0% 0 von 91 | |
| Todesfälle bei Bruchoperationen mit anteiliger Darmentfernung | Beobachtungswert a | 2,3% 136 von 5.990 | 0,0% 0 von 41 | |
| Anteil Behandlungsfälle mit Leistenbruchoperation mit Netzeinlage Alle Patient:innen < 20 Jahre | Information a | 8,4% 285 von 3.373 | 0,0% 0 von 4 | |
| Anteil Behandlungsfälle mit Leistenbruchoperation mit Netzeinlage Alle Patient:innen >= 20 Jahre | Information a | 98,3% 42.816 von 43.576 | 98,1% 53 von 54 | |

Eingriffe an der Schilddrüse

| | | | | |
|--|---------------------------|------------------------|------------------|--|
| Behandlungsfälle mit operativer Entfernung der Schilddrüse | Mengeninformation b | 60,0 (24) 16.427 | 52 | |
| Behandlungsfälle mit operativer Entfernung der Schilddrüse bei Schilddrüsenkrebs | Mengeninformation b | 13,0 (6) 2.542 | 10 | |
| Behandlungsfälle mit operativer Entfernung der Schilddrüse bei gutartiger Erkrankung | Mengeninformation b | 50,6 (23) 12.960 | 42 | |
| Anteil der Beatmungsfälle (> 24 Std.) nach Schilddrüseneingriff | Information (SE) a / e | 0,56% 86 von 15.495 | 0,0% 0 von 52 | |

Große Operationen am Dick- und Enddarm (Kolon und Rektum)

| | | | | |
|---|------------------------|--------------------------|--------------------|--|
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Dick- / Enddarmkrebs | Mengeninformation b | 131,8 (88) 44.562 | 99 | |
| Behandlungsfälle mit Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn | Mengeninformation b | 102,6 (62) 38.168 | 108 | |
| Todesfälle bei operativer Entfernung des Dick- / Enddarms | Beobachtungswert a | 7,7% 2.773 von 36.113 | 7,6% 10 von 132 | |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert | IQM Durchschnittswert | Klinik Ist-Wert | Klinik Erwartungswert |
|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| | Quelle | Fallzahl | Fallzahl | SMR |
| Todesfälle bei operativer Dickdarmentfernung bei Krebs ohne komplizierende Diagnose | < Erwartungswert a / g | 3,3% 290 von 8.798 | 0,0% 0 von 22 | 3,4% 0,00 |
| Todesfälle bei operativer Dickdarmentfernung bei Krebs mit komplizierender Diagnose | Beobachtungswert a | 10,7% 275 von 2.572 | 4,2% 1 von 24 | |
| Todesfälle bei operativer Enddarmentfernung bei Krebs | <3,1% a | 2,6% 108 von 4.183 | 11,8% 2 von 17 | |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Divertikel ohne Abszess / Perforation | <0,85% (SE) a / e | 0,6132% 12 von 1.957 | 0,0% 0 von 12 | |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Divertikel mit Abszess / Perforation | Beobachtungswert a | 5,5% 255 von 4.657 | 0,0% 0 von 11 | |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Minderdurchblutung des Darmes | Information a | 43,8% 953 von 2.178 | 42,9% 3 von 7 | |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn | Beobachtungswert a | 2,8% 58 von 2.100 | 0,0% 0 von 5 | |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei anderen Diagnosen | Information a | 8,5% 822 von 9.668 | 11,8% 4 von 34 | |
| Anteil operative Leberentfernung bei Entfernung des Dick- / Enddarms bei Dick- und Enddarmkrebs | Information a | 4,3% 662 von 15.553 | 6,3% 4 von 63 | |
| Behandlungsfälle mit roboterassistiertem Eingriff bei Krebserkrankung des Darms | Information a | 20,4% 3.180 von 15.553 | 11,1% 7 von 63 | |
| Erkrankungen des Magens | | | | |
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Magenkrebs (mit und ohne Magenoperation) | Mengeninformation b | 46,4 (26) 14.945 | 27 | |
| Todesfälle bei Geschwüren an Magen, Zwölffingerdarm oder Dünndarm als Hauptdiagnose (mit und ohne Operation) | Beobachtungswert a | 5,1% 972 von 19.065 | 5,8% 4 von 69 | |
| Behandlungsfälle mit Magenentfernungen | Mengeninformation b | 40,0 (12) 10.603 | 11 | |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert Quelle | IQM Durchschnittswert Fallzahl | Klinik Ist-Wert Fallzahl | Klinik Erwartungswert SMR |
|--|--|---|---|--|
| Todesfälle bei operativer Magenentfernung bei Magenkrebs ohne Speiseröhreneingriff | Beobachtungswert a | 4,9% 98 von 1.986 | 33,3% 2 von 6 | |
| Todesfälle bei operativer Magenentfernung bei anderer Diagnose (nicht Magenkrebs) ohne Speiseröhreneingriff | Beobachtungswert a | 3,0% 251 von 8.408 | 0,0% 0 von 5 | |
| Adipositaschirurgie | | | | |
| Todesfälle im Rahmen der Adipositaschirurgie | Beobachtungswert (SE) a / e | 0,0649% 7 von 10.778 | n.a. <4 | |
| Eingriffe an der Bauchspeicheldrüse und der Leber | | | | |
| Todesfälle bei Eingriffen an der Bauchspeicheldrüse ohne Transplantation Alle Patient:innen >= 20 Jahre | Beobachtungswert a | 7,3% 416 von 5.684 | 1,9% 1 von 52 | |
| Todesfälle bei operativer Bauchspeicheldrüsenentfernung bei Bauchspeicheldrüsenkrebs | Beobachtungswert a | 5,4% 183 von 3.368 | 2,5% 1 von 40 | |
| Todesfälle bei anatomischer Teilentfernung der Leber Alle Patient:innen >= 20 Jahre | Beobachtungswert a | 5,8% 170 von 2.941 | 6,7% 1 von 15 | |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert | IQM Durchschnittswert | Klinik Ist-Wert | Klinik Erwartungswert |
|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| | Quelle | Fallzahl | Fallzahl | SMR |

Gefäßoperationen

Eingriffe an der Halsschlagader (Carotis)

| | | | | |
|--|-------------------|---------------|----------|--|
| Todesfälle bei ausschließlich extrakranieller Operation der Halsschlagader | <1,03% | 0,98% | 0,0% | |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | a | 97 von 9.891 | 0 von 40 | |
| Todesfälle bei extrakraniellen Gefäßoperationen bei Herz-, Aorten- oder Beinarterienoperationen, Trauma oder HNO-Tumor | Beobachtungswert | 14,8% | n.a. | |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | a | 273 von 1.842 | <4 | |
| Intrakranielle perkutan-transluminale Gefäßinterventionen | Mengeninformation | 124,8 (64) | 5 | |
| | b | 17.220 | | |

Eingriffe an der Hauptschlagader (Aorta)

| | | | | |
|--|-------------------|---------------|----------|--|
| Operation an der Hauptschlagader (Aorta) | Mengeninformation | 60,9 (30) | 13 | |
| | b | 11.514 | | |
| Operation an der Bauchaorta | Mengeninformation | 31,0 (25) | 13 | |
| | b | 5.647 | | |
| Todesfälle bei offener Operation eines nicht rupturierten Bauchaortenaneurysmas | <6,6% | 5,6% | n.a. | |
| | a | 50 von 887 | <4 | |
| Todesfälle bei endovaskulärer Stentimplantation eines nicht rupturierten Bauchaortenaneurysmas | <1,1% | 1,3% | 0,0% | |
| | a | 41 von 3.254 | 0 von 12 | |
| Todesfälle bei rupturiertem Aortenaneurysma | Information | 41,1% | n.a. | |
| | a | 854 von 2.078 | <4 | |

Eingriffe der Becken-/Bein-Arterien

| | | | | |
|--|-------------|------------------|----------|--|
| Todesfälle bei Operationen der Becken- / Beinarterien | Information | 5,6% | 1,2% | |
| | a | 1.572 von 28.143 | 1 von 82 | |
| davon Todesfälle bei Schaufensterkrankheit (Claudicatio) | <0,39% (SE) | 0,3343% | 0,0% | |
| | a / e | 19 von 5.683 | 0 von 12 | |
| davon Todesfälle bei Ruheschmerz | <2,0% | 1,7% | 0,0% | |
| | a | 36 von 2.126 | 0 von 4 | |
| davon Todesfälle bei Ulzeration / Gangrän | <4,1% | 3,8% | 0,0% | |
| | a | 124 von 3.290 | 0 von 7 | |

PTA (Perkutan transluminale Gefäßinterventionen)

| | | | | |
|--|------------------|------------------|----------|--|
| Todesfälle bei Wiedereröffnung eines verschlossenen Bein- / Beckengefäßes mittels Ballonkatheter (PTA) | Beobachtungswert | 3,0% | 0,0% | |
| | a | 1.794 von 58.927 | 0 von 59 | |

Arteriovenöser Shunt

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|----|--|
| Anlegen eines arteriovenösen Shunts | Mengeninformation | 29,6 (16) | 21 | |
| | b | 5.451 | | |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

IQM Indikatoren

| IQM Zielwert | IQM Durchschnittswert | Klinik Ist-Wert | Klinik Erwartungswert |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Quelle | Fallzahl | Fallzahl | SMR |

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Geburtshilfe

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|------------------------|--|
| Mütterliche Todesfälle bei der Geburt | <0,004% (SE) a / e | 0,0044% 10 von 229.640 | 0,0% 0 von 1.589 | |
| Anteil vaginale Geburten mit Dammriss 4. Grades | <0,112% (SE) a / e | 0,1084% 164 von 151.296 | 0,093% 1 von 1.075 | |
| Anteil vaginale Geburten mit Dammschnitt | Information a | 8,9% 13.407 von 151.296 | 5,8% 62 von 1.075 | |
| Anteil Kaiserschnitt an allen Geburten | Information a | 34,1% 78.344 von 229.640 | 32,3% 514 von 1.589 | |
| Anteil sanfter Kaiserschnitt (nach Misgav-Ladach) an allen Kaiserschnittgeburten | Information a | 80,7% 63.205 von 78.344 | 86,4% 444 von 514 | |
| Anteil Kaiserschnitte bei risikoarmer Geburt | Information a | 28,8% 57.797 von 200.544 | 26,5% 357 von 1.345 | |
| davon Anteil Kaiserschnitte bei risikoarmer Geburt | Information a | 26,4% 38.653 von 146.270 | 25,4% 266 von 1.048 | |
| Alle Patient:innen < 35 Jahre | | | | |
| davon Anteil Kaiserschnitte bei risikoarmer Geburt | Information a | 35,3% 19.144 von 54.274 | 30,6% 91 von 297 | |
| Alle Patient:innen > 34 Jahre | | | | |

Neugeborene

| | | | | |
|--|------------------------|-------------------------|-------|--|
| Neugeborene mit Geburtsgewicht < 1.250 Gramm | Mengeninformation b | 27,3 (27) 2.461 | 30 | |
| davon Neugeborene mit Geburtsgewicht < 500 Gramm | Mengeninformation b | 4,0 (3) 269 | 6 | |
| davon Neugeborene mit Geburtsgewicht von 500 bis 749 Gramm | Mengeninformation b | 8,1 (7) 583 | 8 | |
| davon Neugeborene mit Geburtsgewicht von 750 bis 999 Gramm | Mengeninformation b | 9,8 (9) 725 | 9 | |
| davon Neugeborene mit Geburtsgewicht von 1.000 bis 1.249 Gramm | Mengeninformation b | 10,9 (11) 884 | 7 | |
| Neugeborene mit Geburtsgewicht von 1.250 bis 1.499 Gramm | Mengeninformation b | 11 (10) 1.023 | 9 | |
| Neugeborene mit Geburtsgewicht von 1.500 bis 2.499 Gramm | Mengeninformation b | 73,2 (28) 14.422 | 111 | |
| Neugeborene mit Geburtsgewicht > 2.500 Gramm | Mengeninformation b | 1113,1 (825) 229.301 | 1.699 | |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert Quelle | IQM Durchschnittswert Fallzahl | Klinik Ist-Wert Fallzahl | Klinik Erwartungswert SMR |
|--|--|---|---|--|
| Frauenheilkunde | | | | |
| Todesfälle bei operativer Entfernung der Gebärmutter bei gutartigen Erkrankungen | <0,03% (SE) | 0,0404% | 0,0% | |
| Alle Patient:innen > 14 Jahre | a / e | 9 von 22.292 | 0 von 105 | |
| Anteil der Behandlungsfälle mit vaginaler / laparoskopischer Gebärmutterentfernung ohne plastische Operation | >89,0% | 90,6% | 98,1% | |
| Alle Patient:innen > 14 Jahre | a | 20.024 von 22.110 | 103 von 105 | |
| Anteil der Behandlungsfälle mit vaginaler Gebärmutterentfernung ohne plastische Operation | Information | 25,2% | 4,8% | |
| Alle Patient:innen > 14 Jahre | a | 5.577 von 22.110 | 5 von 105 | |
| Anteil der Behandlungsfälle mit vaginaler Gebärmutterentfernung mit Zerkleinerung der Gebärmutter | Information | 5,3% | 0,0% | |
| Alle Patient:innen > 14 Jahre | a | 294 von 5.577 | 0 von 5 | |
| Anteil der Behandlungsfälle mit laparoskopischer Gebärmutterentfernung ohne plastische Operation | Information | 65,3% | 93,3% | |
| Alle Patient:innen > 14 Jahre | a | 14.447 von 22.110 | 98 von 105 | |
| Anteil der Behandlungsfälle mit laparoskopischer Gebärmutterentfernung mit Zerkleinerung der Gebärmutter | Information | 27,2% | 0,0% | |
| Alle Patient:innen > 14 Jahre | a | 3.930 von 14.447 | 0 von 98 | |
| Anteil der Behandlungsfälle mit Eierstock- und Gebärmutterentfernung bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose | Information | 5,4% | 0,0% | |
| Alle Patient:innen > 14 und < 50 Jahre | a | 395 von 7.303 | 0 von 32 | |
| Anteil der Behandlungsfälle mit Eierstock- und Gebärmutterentfernung bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose | Information | 33,7% | 60,5% | |
| Alle Patient:innen >= 50 Jahre | a | 2.844 von 8.437 | 23 von 38 | |
| Bösartige Neubildungen der Brust und der weiblichen Geschlechtsorgane | | | | |
| Behandlungsfälle mit Krebserkrankung der Brust oder der Geschlechtsorgane als Hauptdiagnose | Mengeninformation | 220,3 (65) | 312 | |
| | b | 73.794 | | |
| Behandlungsfälle mit Eierstockkrebs als Hauptdiagnose | Mengeninformation | 32,7 (13) | 17 | |
| | b | 9.750 | | |
| Todesfälle nach Eierstockentfernung bei Eierstockkrebs | Beobachtungswert | 1,4% | 0,0% | |
| | a | 40 von 2.822 | 0 von 7 | |
| Behandlungsfälle mit Gebärmutterkrebs als Hauptdiagnose | Mengeninformation | 55,1 (30) | 25 | |
| | b | 15.042 | | |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert Quelle | IQM Durchschnittswert Fallzahl | Klinik Ist-Wert Fallzahl | Klinik Erwartungs- wert SMR |
|---|---|--|--|--|
| Todesfälle nach Gebärmutterentfernung bei Gebärmutterkrebs | Beobachtungswert (SE) a / e | 0,53% 31 von 5.840 | 0,0% 0 von 13 | |
| Behandlungsfälle mit Brustkrebs als Hauptdiagnose | Mengeninformation b | 140,6 (30) 45.005 | 265 | |
| Eingriffe an der Brust | | | | |
| Eingriffe an der Brust | Mengeninformation b | 195,0 (156) 40.565 | 272 | |
| Operationen der Brust bei Brustkrebs | Mengeninformation b | 174,8 (150) 29.371 | 225 | |
| Anteil brusterhaltender Operationen bei Brustkrebs | Information a | 71,7% 21.065 von 29.371 | 69,3% 156 von 225 | |
| Eingriffe am Beckenboden bei der Frau | | | | |
| Behandlungsfälle mit Beckenbodenoperationen mit und ohne plastische Operation | Mengeninformation b | 80,4 (63) 20.253 | 93 | |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

IQM Indikatoren

| IQM Zielwert | IQM Durchschnittswert | Klinik Ist-Wert | Klinik Erwartungswert |
|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| Quelle | Fallzahl | Fallzahl | SMR |

Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe

Bösartige Neubildungen des Bewegungsapparates

Behandlungsfälle mit bösartiger Neubildung an Knochen, Gelenknorpel, peripheren Nerven, Retroperitoneum, Bindegewebe, Weichteilen

| Mengeninformation | 52,5 (5) | 11 | |
|-------------------|----------|----|--|
| b | 15.552 | | |

Gelenkersatz (Endoprothetik)

Todesfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung

| <0,10% (SE) | 0,0849% | 0,0% | |
|-------------|---------------|----------|--|
| a / e | 50 von 58.927 | 0 von 14 | |

Todesfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei hüftgelenksnahen Frakturen

| Beobachtungswert | 4,7% | 1,3% | |
|------------------|----------------|----------|--|
| a | 962 von 20.515 | 1 von 75 | |

Todesfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei anderen Diagnosen

| Beobachtungswert | 4,7% | 0,0% | |
|------------------|---------------|----------|--|
| a | 315 von 6.724 | 0 von 17 | |

Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung

| Beobachtungswert | 2,1% | 7,1% | |
|------------------|------------------|----------|--|
| a | 1.209 von 58.927 | 1 von 14 | |

Todesfälle bei Wechsel eines Hüftgelenkersatzes ohne Fraktur oder Infektion

| <1,39% (SE) | 1,4% | 0,0% | |
|-------------|--------------|---------|--|
| a / e | 67 von 4.784 | 0 von 4 | |

Todesfälle bei Wechsel eines Hüftgelenkersatzes wegen Fraktur oder Infektion

| Beobachtungswert | 4,0% | 7,1% | |
|------------------|---------------|----------|--|
| a | 170 von 4.249 | 1 von 14 | |

Todesfälle bei Kniegelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung

| <0,04% (SE) | 0,0303% | n.a. | |
|-------------|---------------|------|--|
| a / e | 19 von 62.752 | <4 | |

Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei Kniegelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung

| Beobachtungswert | 1,3% | n.a. | |
|------------------|----------------|------|--|
| a | 837 von 62.752 | <4 | |

Todesfälle bei Wechsel eines Kniegelenkersatzes wegen Fraktur oder Infektion

| Beobachtungswert | 2,2% | n.a. | |
|------------------|--------------|------|--|
| a | 51 von 2.279 | <4 | |

Todesfälle bei Hüft- oder Kniegelenkersatz bei Tumorerkrankung

| Beobachtungswert | 5,9% | 0,0% | |
|------------------|---------------|---------|--|
| a | 148 von 2.502 | 0 von 4 | |

Gelenkersatz am Schulter- / Ellenbogengelenk

| Mengeninformation | 37,7 (28) | 48 | |
|-------------------|-----------|----|--|
| b | 12.276 | | |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert <u>Quelle</u> | IQM Durchschnittswert <u>Fallzahl</u> | Klinik Ist-Wert <u>Fallzahl</u> | Klinik Erwartungswert <u>SMR</u> |
|---|-------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|
| Hüftgelenknahe Frakturen | | | | |
| Todesfälle nach operativer Versorgung einer Schenkelhalsfraktur als Hauptdiagnose | < Erwartungswert | 4,3% | 1,3% | 4,5% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | a | 962 von 22.592 | 1 von 76 | 0,29 |
| Todesfälle nach Gelenkersatz bei Schenkelhalsfraktur als Hauptdiagnose | Beobachtungswert | 4,7% | 1,4% | |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | a | 940 von 20.094 | 1 von 72 | |
| Todesfälle nach Osteosynthese (Verbindung der Knochenfragmente durch Platten, Schrauben oder Nägel) bei Schenkelhalsfraktur als Hauptdiagnose | Beobachtungswert | 0,9% | 0,0% | |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | a | 22 von 2.498 | 0 von 4 | |
| Todesfälle nach operativer Versorgung einer pertrochantären Fraktur als Hauptdiagnose | < Erwartungswert | 4,6% | 10,5% | 4,9% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | a | 860 von 18.714 | 4 von 38 | 2,16 |
| Todesfälle nach Gelenkersatz bei pertrochantärer Fraktur als Hauptdiagnose | Beobachtungswert | 5,3% | n.a. | |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | a | 20 von 380 | <4 | |
| Todesfälle nach Osteosynthese (Verbindung der Knochenfragmente durch Platten, Schrauben oder Nägel) bei pertrochantärer Fraktur als Hauptdiagnose | Beobachtungswert | 4,6% | 11,4% | |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | a | 840 von 18.334 | 4 von 35 | |
| Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark | | | | |
| Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark (ohne lokale Schmerztherapie) | Mengeninformation | 348,5 (229) | 140 | |
| | b | 113.946 | | |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder Wirbelkörper-Ersatz bei Tumor (inkl. komplexe Rekonstruktionen) | Beobachtungswert | 7,4% | 0,0% | |
| | a | 271 von 3.667 | 0 von 8 | |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder Wirbelkörper-Ersatz bei Trauma (inkl. komplexe Rekonstruktionen, Rückenmarkoperation) | Beobachtungswert | 3,6% | 4,1% | |
| | a | 526 von 14.494 | 2 von 49 | |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Operation bei Entzündung der Bandscheibe oder des Rückenmarks | Beobachtungswert | 8,1% | 14,3% | |
| | a | 221 von 2.745 | 1 von 7 | |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder 1 Wirbelkörper-Ersatz (ohne Tumor, Trauma oder kompl. Rekonstruktionen) | Beobachtungswert (SE) | 0,0901% | 0,0% | |
| | a / e | 12 von 13.321 | 0 von 9 | |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder 2 Wirbelkörper-Ersatz (ohne Tumor, Trauma oder kompl. Rekonstruktionen) | Beobachtungswert (SE) | 0,2436% | n.a. | |
| | a / e | 17 von 6.978 | <4 | |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert <u>Quelle</u> | IQM Durchschnittswert <u>Fallzahl</u> | Klinik Ist-Wert <u>Fallzahl</u> | Klinik Erwartungs- wert <u>SMR</u> |
|--|--------------------------------------|---|---|---|
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder 3 oder mehr Wirbelkörper-Ersatz (ohne Tumor, Trauma oder kompl. Rekonstruktionen) | Beobachtungswert (SE) a / e | 0,6383% 36 von 5.640 | 0,0% 0 von 6 | |
| Todesfälle bei alleiniger 'Entlastung' (Dekompression) der Wirbelsäule | Beobachtungswert (SE) a / e | 0,1116% 25 von 22.396 | n.a. <4 | |
| Todesfälle bei 'einfachen' Bandscheibenentfernungen | <0,03% (SE) a / e | 0,0259% 4 von 15.423 | 0,0% 0 von 29 | |
| Todesfälle bei Vertebro- / Kyphoplastie (ohne Tumor, Trauma, kompl. Rekonstruktion, Versteifung, WK-Ersatz oder Bandscheibeneingriffe) | <0,44% (SE) a / e | 0,3419% 22 von 6.435 | 0,0% 0 von 24 | |
| Todesfälle bei anderen Operationen an der Wirbelsäule oder am Rückenmark | Beobachtungswert a | 2,0% 437 von 21.980 | 0,0% 0 von 5 | |
| Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei 'einfachen' Bandscheibenentfernungen | Beobachtungswert (SE) a / e | 0,4085% 63 von 15.423 | 0,0% 0 von 29 | |
| Lokale Schmerztherapie an der Wirbelsäule (ohne andere Wirbelsäulen- oder Rückenmarkoperation) | Mengeninformation b | 87,5 (38) 27.127 | 23 | |
| Behandlungsfälle mit Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen als Hauptdiagnose ohne Operation oder lokale Schmerztherapie | Mengeninformation b | 142,8 (120) 52.123 | 185 | |
| Mehrfachverletzungen - Polytraumen | | | | |
| Mehrfachverletzungen (Polytraumen) im Sinne der DRG-Definition | Mengeninformation b | 22,9 (8) 7.201 | 23 | |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert | IQM Durchschnittswert | Klinik Ist-Wert | Klinik Erwartungswert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | Quelle | Fallzahl | Fallzahl | SMR |

Urologie

Operationen der Niere

| | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| Todesfälle bei Totalentfernung der Niere bei bösartiger Neubildung | <1,5% a | 1,7% 55 von 3.287 | 0,0% 0 von 6 | |
| Anteil laparoskopischer Operationen bei Totalentfernung der Niere bei bösartiger Neubildung | Information a | 50,3% 1.653 von 3.287 | 83,3% 5 von 6 | |
| Todesfälle bei Teilentfernung der Niere bei bösartiger Neubildung | <0,26% (SE) a / e | 0,2957% 11 von 3.720 | 0,0% 0 von 13 | |
| Anteil laparoskopischer Operationen bei Teilentfernung der Niere bei bösartiger Neubildung | Information a | 67,6% 2.514 von 3.720 | 100,0% 13 von 13 | |
| Anteil der Teilentfernungen der Niere bei bösartiger Neubildung | Information a | 53,1% 3.720 von 7.007 | 68,4% 13 von 19 | |
| Todesfälle bei Totalentfernung der Niere bei anderer Diagnose | Beobachtungswert a | 3,4% 78 von 2.287 | 0,0% 0 von 5 | |
| Todesfälle bei Teilentfernung der Niere bei anderer Diagnose | Beobachtungswert (SE) a / e | 0,2863% 4 von 1.397 | 0,0% 0 von 6 | |
| Behandlungsfälle mit roboterassistierter Nierenentfernung bei bösartiger Neubildung | Information a | 46,8% 3.276 von 7.007 | 89,5% 17 von 19 | |

Harnblase

| | | | | |
|---|------------------------|---------------------------|--------------------|--|
| Behandlungsfälle mit Blasenkrebs als Hauptdiagnose | Mengeninformation b | 137,5 (38) 41.523 | 61 | |
| Operationen an der Harnblase durch die Harnröhre | Mengeninformation b | 223,9 (213) 42.771 | 61 | |
| Operationen an der Harnblase durch die Harnröhre bei Blasenkrebs | Mengeninformation b | 176,0 (156) 29.739 | 50 | |
| Operationen an der Harnblase durch die Harnröhre bei Blasenkrebs mit Einbringen von Chemotherapeutika | Beobachtungswert a | 18,7% 5.548 von 29.739 | 58,0% 29 von 50 | |
| Todesfälle bei Entfernung der Harnblase | <4,6% a | 3,9% 112 von 2.873 | 0,0% 0 von 7 | |
| Todesfälle bei vollständiger Entnahme aller Organe des kleinen Beckens bei Mann oder Frau | Beobachtungswert a | 5,1% 30 von 587 | 0,0% 0 von 4 | |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert | IQM Durchschnittswert | Klinik Ist-Wert | Klinik Erwartungswert |
|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| | Quelle | Fallzahl | Fallzahl | SMR |
| Behandlungsfälle mit roboterassistierter Harnblasenentfernung | Information a | 17,9% 619 von 3.460 | 54,5% 6 von 11 | |
| Prostata | | | | |
| Todesfälle bei Operationen der Prostata durch die Harnröhre bei gutartigen Erkrankungen | <0,16% (SE) a / e | 0,0997% 26 von 26.078 | 0,0% 0 von 143 | |
| Todesfälle bei Operationen der Prostata durch die Harnröhre bei bösartigen Erkrankungen | Beobachtungswert (SE) a / e | 0,7571% 52 von 6.868 | 0,0% 0 von 33 | |
| Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei Behandlungsfällen mit Operation der Prostata durch die Harnröhre | Beobachtungswert a | 3,2% 1.040 von 32.946 | 1,1% 2 von 176 | |
| Behandlungsfälle mit Prostatakrebs als Hauptdiagnose | Mengeninformation b | 121,1 (24) 37.663 | 60 | |
| Todesfälle bei radikaler Prostataentfernung | <0,15% (SE) a / e | 0,1635% 23 von 14.066 | 0,0% 0 von 20 | |
| Behandlungsfälle mit roboterassistierter Prostataentfernung | Information a | 82,2% 11.563 von 14.066 | 85,0% 17 von 20 | |
| Nierensteine | | | | |
| Behandlungsfälle mit Nierensteinen als Hauptdiagnose | Mengeninformation b | 211,8 (54) 70.114 | 127 | |
| Anteil der Behandlungsfälle mit Intervention zur Steinentfernung bei Hauptdiagnose Nierensteine | Information a | 51,7% 36.275 von 70.114 | 36,2% 46 von 127 | |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert Quelle | IQM Durchschnittswert Fallzahl | Klinik Ist-Wert Fallzahl | Klinik Erwartungs- wert SMR |
|-----------------|---|--|--|--|
|-----------------|---|--|--|--|

Hautkrankheiten

Hautkrankheiten

| | | | | |
|---|----------------------------|------------------------|----------------|--|
| Behandlungsfälle mit Melanom als Hauptdiagnose | Mengeninformation b | 53,2 (4) 13.076 | n.a. <4 | |
| Behandlungsfälle mit Dermatitis und Ekzem als Hauptdiagnose | Mengeninformation b | 36,5 (6) 11.676 | 6 | |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert | IQM Durchschnittswert | Klinik Ist-Wert | Klinik Erwartungswert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | Quelle | Fallzahl | Fallzahl | SMR |

Intensivmedizin

Intensivmedizin

| | | | | |
|---|------------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| Todesfälle bei Beatmung > 24 Stunden ohne Neugeborene | Information a | 34,6% 31.470 von 90.973 | 41,8% 94 von 225 | |
| ECLS/ECMO - Herz- / Herz-Lungenunterstützung | Mengeninformation b | 37,2 (15) 3.165 | n.a. <4 | |
| Todesfälle bei Beatmung > 24 Stunden ohne Neugeborene und ohne COVID-19 Fälle | <34,5% a | 34,3% 29.828 von 86.940 | 42,4% 89 von 210 | |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger als Hauptdiagnose | < Erwartungswert a | 30,6% 9.664 von 31.558 | 34,9% 30 von 86 | 30,3% 1,15 |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger als Hauptdiagnose mit Organkomplikation / Schock | Beobachtungswert a | 32,4% 9.262 von 28.574 | 38,9% 28 von 72 | |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger als Hauptdiagnose ohne Organkomplikation / Schock | Beobachtungswert a | 13,5% 402 von 2.984 | 14,3% 2 von 14 | |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger oder SIRS als Nebendiagnose | Beobachtungswert a | 35,7% 23.691 von 66.391 | 37,7% 61 von 162 | |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger oder SIRS als Nebendiagnose mit Organkomplikation / Schock | Beobachtungswert a | 36,5% 23.199 von 63.628 | 38,1% 61 von 160 | |
| Todesfälle bei generalisierter Entzündungsreaktion des gesamten Körpers ohne Organkomplikation (SIRS) | Information a | 6,3% 3.731 von 59.565 | 3,7% 1 von 27 | |
| Anteil Todesfälle bei nicht-bakterieller Blutvergiftung (Sepsis) | Beobachtungswert a | 33,1% 171 von 517 | n.a. <4 | |

Angeborene Gerinnungsstörung und Bluttransfusion

| | | | | |
|--|------------------------|---------------------|----|--|
| Behandlungsfälle mit angeborenen Gerinnungsstörungen als Haupt- oder Nebendiagnose | Mengeninformation b | 33,2 (14) 11.933 | 43 | |
| davon operierte Behandlungsfälle mit angeborenen Gerinnungsstörungen als Haupt- oder Nebendiagnose | Mengeninformation b | 22,6 (9) 7.676 | 16 | |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert Quelle | IQM Durchschnittswert Fallzahl | Klinik Ist-Wert Fallzahl | Klinik Erwartungs- wert SMR |
|--|---|--|--|--|
| Anteil operierter Behandlungsfälle mit Bluttransfusion | Information a | 7,7% 188.584 von 2.434.913 | 9,1% 559 von 6.164 | |
| Obduktionen | | | | |
| Obduktionsrate | Information a | 0,78% 1.234 von 157.909 | 0,0% 0 von 555 | |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

IQM Indikatoren

| IQM Zielwert Quelle | IQM Durchschnittswert Fallzahl | Klinik Ist-Wert Fallzahl | Klinik Erwartungswert SMR |
|--|---|---|--|
|--|---|---|--|

Roboterassistierte Eingriffe

Roboterassistierte Eingriffe

| | | | | |
|--|-------------------|-------------|-----|--|
| Viszeralchirurgische und urologische Eingriffe mittels Roboterchirurgie (Darm-, Nieren-, Blasen- oder Prostataeingriffe) | Mengeninformation | 159,0 (128) | 47 | |
| | b | 18.605 | | |
| Behandlungsfälle mit roboterassistiertem Eingriff GESAMT | Mengeninformation | 279,1 (234) | 230 | |
| | b | 35.164 | | |

Leseanleitung zu den IQM-Indikatoren



Lesebeispiel

Das Lesebeispiel bezieht sich auf die Werte eines deutschen IQM-Mitgliedskrankenhauses. Für Schweizer Spitäler werden ab dieser Veröffentlichung abweichende, landesspezifische Werte herangezogen, die hier nicht exemplarisch abgebildet sind.

Am Beispiel des nachfolgenden Indikators „Todesfälle bei Hauptdiagnose Transmuraler Herzinfarkt (Alle Patient:innen >= 20 Jahre)“ liegt die durchschnittliche Krankenhaussterblichkeit in der Bundesrepublik bei 11,8 % (Quelle: Statistisches Bundesamt). Daraus ergibt sich rechnerisch für das Beispielkrankenhaus aufgrund des Alters und Geschlechts der Patientinnen und Patienten des ausgewerteten Jahres eine zu erwartende Krankenhaussterblichkeit von 10,7 % ⁴ als Erwartungswert. Ziel der IQM-Mitgliedskrankenhäuser ist es, im Ergebnis unter diesem Erwartungswert zu liegen ¹. Der für das Beispielkrankenhaus tatsächlich gemessene Ist-Wert betrug in diesem Jahr 19,4 % ³ und lag damit über dem Krankenhaus-Erwartungswert für den Qualitätsindikator „Todesfälle bei Hauptdiagnose Transmuraler Herzinfarkt“. Der Durchschnittswert aller IQM-Mitgliedskrankenhäuser liegt bei diesem Indikator bei 11,3 % ².

| G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026 | | Jahr: 2025 | | |
|--|--|---|---|--|
| Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der Präambel | | | | |
| IQM Indikatoren | IQM Zielwert Quelle | IQM Durchschnittswert Fallzahl | Klinik Ist-Wert Fallzahl | Klinik Erwartungswert SMR |
| Herzerkrankungen | | | | |
| Herzinfarkt | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Transmuraler Herzinfarkt | < Erwartungswert | 11,3% | 19,4% | 10,7% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre | a | 2.707 von 24.057 | 88 von 453 | |

Die Indikatoren

Die von IQM verwendeten German/Swiss Inpatient Quality Indicators (G-IQI/CH-IQI) sind so ausgewählt, dass sie sowohl häufige und wichtige Krankheitsbilder als auch wichtige Verfahren abbilden. Alle Indikatoren werden aus den Routinedaten des Krankenhauses ohne zusätzliche Dokumentation abgeleitet, wodurch kein weiterer Dokumentationsaufwand entsteht.

Was wird gemessen?

Hierbei unterscheiden wir **absolute Mengeninformatoren** von **relativen Mengeninformatoren**, bei denen z.B. ein Anteil bestimmter Operationsverfahren ausgewiesen wird.

Wesentlicher Messwert ist die **Sterblichkeit** bei verschiedenen Krankheitsbildern, auch wenn Sterblichkeit im Krankenhaus selbst bei bester medizinischer Versorgung nicht vollständig vermeidbar ist. Zur besseren Einordnung der Ergebnisse wird die Sterblichkeit - soweit verfügbar - mit durchschnittlichen Referenzwerten verglichen. Diese werden entweder aus Daten des **Statistischen Bundesamtes** oder aus Daten des **Forschungsdatenzentrums der statistischen Ämter des Bundes und der Länder** berechnet. Auf Basis der Daten des Statistischen Bundesamtes erfolgt zudem eine **Risikogewichtung** nach **Alter** und **Geschlecht** der Behandelten. Krankenhäuser mit einem hohen Anteil sehr alter Patientinnen und Patienten weisen in der Regel eine andere Sterblichkeit auf als Einrichtungen mit vergleichsweise jüngeren.

Als wesentliche Orientierungshilfe dient der **Erwartungswert**, der angibt, welche Sterblichkeit bei einer Patientengruppe gleicher Alters- und Geschlechtsverteilung im Bundesdurchschnitt zu erwarten ist. Für einige Indikatoren kommen darüber hinaus erweiterte, **differenzierte Risikomodelle** zum Einsatz, die zusätzlich Begleiterkrankungen, Erkrankungsschwere und den Zuverlegungsstatus berücksichtigen. Dadurch ergeben sich für unterschiedliche Krankenhäuser individuelle Erwartungswerte, da sich die Alters- und Geschlechtszusammensetzung der Behandelten unterscheiden kann.

Mit der aktuellen Veröffentlichung werden erstmals für die Schweizer Mitgliedsspitäler Erwartungs- und Referenzwerte auf Grundlage der **Schweizer Koeffizienten** ausgewiesen. Damit erfolgt die Bewertung der Qualitätsergebnisse jetzt landesspezifisch und auf Basis der jeweiligen nationalen Modelle. Für Krankenhäuser in Deutschland gelten weiterhin die deutschen Referenzwerte, während für Schweizer Spitäler die vom **Bundesamt für Gesundheit (BAG)** abgeleiteten Referenzwerte und Risikomodelle zur Anwendung kommen. Diese Anpassung gewährleistet eine präzise und kontextgerechte Interpretation der Qualitätsdaten beider Länder.

Ziel aller IQM-Krankenhäuser ist es, „bessere“ als die erwarteten Werte zu erreichen. Weitere Informationen hierzu können den G-IQI-/ CH-IQI-Handbüchern entnommen werden.

Die Beziehung zwischen der erwarteten Sterblichkeit und der tatsächlich beobachteten Sterblichkeit eines Krankenhauses wird als „**standardized mortality rate**“ (**SMR**) bezeichnet. Liegt der SMR-Wert unter 1, ist die tatsächliche Sterblichkeit für den jeweiligen Indikator geringer als erwartet, liegt er über 1, ist sie höher als erwartet. Ein solcher Wert kann nur für Indikatoren berechnet werden, bei denen die erwartete Sterblichkeit aus den Daten des Statistischen Bundesamtes abgeleitet werden kann. Stehen keine alters- und geschlechtsgewichteten Werte für einen Indikator zur Verfügung, ist die Berechnung eines Erwartungswert nicht möglich.

Es ist zudem zu berücksichtigen, dass Sterblichkeit bei manchen Indikatoren ein sehr seltenes Ereignis darstellt und daher nicht als alleiniges Maß für medizinische Qualität interpretiert werden darf. Die Analyse der im sogenannten „Low-Risk“-Bereich gemessenen Sterblichkeit ermöglicht jedoch, auch bei seltenen Ereignissen mögliche Verbesserungspotentiale zu identifizieren.

Glossar zur Ergebnisveröffentlichung



Hier finden Sie eine Erläuterung der wichtigsten Begriffe und Kennzahlen, die in dieser Veröffentlichung verwendet werden:

IQM Zielwert - Quellen (Herkunft und Berechnung):

Die Referenz- bzw. Zielwerte für die Indikatoren basieren auf verschiedenen Quellen. Die jeweilige Quelle wird durch einen Buchstaben unter dem „IQM Zielwert“ angegeben. Es werden abweichende, landesspezifische Werte für die deutschen und Schweizer Spitäler herangezogen und in folgenden Quellenhinweisen wo erforderlich differenziert:

a: G-IQI: Forschungsdatenzentren der statistischen Ämter des Bundes und der Länder, DRG-Statistik 2023. Eigene Berechnungen. Diese Daten bilden auch die Grundlage für die Berechnung der klinikindividuellen Erwartungswerte, standardisiert nach Alter und Geschlecht.

a: CH-IQI: Berechnungen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) Schweiz basierend auf den Daten der Medizinischen Statistik der Krankenhäuser (MS bis 2023) und den Administrativdaten der Gesundheitsversorger (SpiGes ab 2024)

b: G-IQI: Gleiche Quelle wie a; jedoch speziell für Mengenindikatoren: Die mittlere Fallzahl (Median in Klammern) für IQM-Mitgliedskrankenhäuser mit entsprechender Leistung im Jahr 2023.

b: CH-IQI: Gleiche Quelle wie a; jedoch speziell für Mengenindikatoren: Die mittlere Fallzahl (Median in Klammern) für Spitäler auf Schweizer Bundesebene mit entsprechender Leistung im Jahr 2024.

d: Der Zielwert ist hier nicht identisch mit dem Bundeswert und wurde entnommen aus: Kaiser D (2007) Mindestmengen aus thoraxchirurgischer Sicht. Chirurg, 78(11): 1012-1017

e: Sentinel Event: Kennzahl wurde im G-IQI Kolloquium als Sentinel Event eingestuft (seltene Ereignisse, die man nicht erwartet). Weitere Infos dazu in den G-IQI/ CH-IQI FAQs.

g: G-IQI: Differenziertes Risikomodell zur Berechnung der Erwartungswerte; basierend auf Daten der Forschungsdatenzentren der statistischen Ämter des Bundes und der Länder, DRG-Statistik 2023. Eigene Berechnungen.

g: CH-IQI: Differenziertes Risikomodell zur Berechnung der Erwartungswerte; Berechnungen des Bundesamts für Gesundheit (BAG), basierend auf den Daten 2024

h: Empfehlung aus der Beschlussfassung der G-IQI Version 5.5 im Kolloquium II durch den *wissenschaftlichen Beirat des IQM e.V.*

IQM-Durchschnittswert - Fallzahl:

Der IQM-Durchschnittswert gibt die mittleren Ergebnisse über alle Patientinnen und Patienten an, die im Beobachtungszeitraum in IQM-Mitgliedskrankenhäusern (D) bzw. IQM-Spitälern (CH) behandelt wurden. Mengenangaben werden als Durchschnittswert und zusätzlich in Klammern als Median dargestellt.

Krankenhaus Erwartungswert:

Dieser Wert beschreibt die erwartete Sterblichkeit der Patientinnen und Patienten, basierend auf Alters- und Geschlechtsverteilung. Er wird nur für Indikatoren berechnet, bei denen Vergleichszahlen des Bundesdurchschnitts vorliegen.

Für einige Indikatoren kommen erweiterte differenzierte Risikomodelle zum Einsatz. Diese berücksichtigen zusätzlich Begleiterkrankungen, Erkrankungsschwere und den Zuverlegungsstatus. Weitere Informationen können dem G-IQI/CH-IQI Handbuch entnommen werden.

SMR:

Die **SMR** bezeichnet das Verhältnis zwischen der **beobachteten Sterblichkeit** (tatsächlicher Durchschnittswert) und der **erwarteten Sterblichkeit** (Erwartungswert).

Ein Wert **unter 1** bedeutet, dass die Sterblichkeit geringer ist als erwartet; ein Wert **über 1** zeigt eine höhere Sterblichkeit als erwartet an.

Hinweis zum Indikator „Obduktionsrate“:

Die ausgewiesene Anzahl der Obduktionen kann unvollständig sein, da nicht alle Krankenhaus-Dokumentationssysteme eine vollständige oder nachträgliche Kodierung nach der Entlassung bzw. nach dem Tod einer Patientin oder eines Patienten unterstützen.

Fallzahlen und Mindestgrenzen:

Die Ergebnisse einer Kennzahl werden nur dann im Detail dargestellt, wenn mindestens vier oder mehr Fälle im Nenner vorliegen. Wird diese Mindestgrenze unterschritten, erscheint die Angabe „<4“.

Ergebnisse, die sich auf **sehr seltene Ereignisse** beziehen, werden mit **bis zu vier Nachkommastellen** angegeben. Dadurch können auch bei großen Fallzahlen Werte zwischen **0 und 1** dargestellt werden.