

### **Ergebnisdarstellung und Nutzung der Indikatoren-Sets**

Im Sinne einer transparenten und wissenschaftlich fundierten Qualitätsanalyse bietet Ihnen die vorliegende Ergebnisveröffentlichung eine strukturierte Orientierungshilfe zur Einordnung der dargestellten Ergebnisse. Die Nutzung der von IQM verwendeten German/Swiss Inpatient Quality Indicators (G-IQI/CH-IQI) ermöglicht eine differenzierte Bewertung der Resultate und unterstützt eine gezielte Analyse der Ergebnisqualität.

Mit der aktuellen Veröffentlichung werden für die Schweizer Mitgliedsspitäler erstmals Erwartungs- und Referenzwerte auf Grundlage der Schweizer Koeffizienten ausgewiesen. Damit erfolgt die Bewertung aller Qualitätsergebnisse landesspezifisch und auf Basis der jeweiligen nationalen Modelle. Für Krankenhäuser in Deutschland gelten weiterhin die deutschen Referenzwerte, während für Schweizer Spitäler die vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) abgeleiteten Referenzwerte und Risikomodelle zur Anwendung kommen. Diese Anpassung gewährleistet eine präzise und kontextgerechte Interpretation der Qualitätsdaten für beide Länder.

Die Ergebnisse sind unter Berücksichtigung dieser methodischen Weiterentwicklung zu betrachten und für weiterführende Analysen nutzbar.

Bitte beachten Sie, dass die ausgewiesenen Fallzahlen jeweils dem Standort zugeordnet sind, an dem die Entlassung erfolgt ist. Eine Verlegung von Patientinnen und Patienten zwischen verschiedenen Standorten desselben Krankenhauses oder Trägers kann nicht berücksichtigt werden.

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

## **IQM Indikatoren**

[Qualitätsbericht](#)

[QSR-Mehrjahresergebnisse](#)

### **Inhaltsverzeichnis**

|                                                    |                      |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Herzerkrankungen                                   | <a href="#">2025</a> | <a href="#">2024</a> |
| Erkrankungen des Nervensystems und Schlaganfall    | <a href="#">2025</a> | <a href="#">2024</a> |
| Altersmedizin                                      | <a href="#">2025</a> | <a href="#">2024</a> |
| Lungenerkrankungen                                 | <a href="#">2025</a> | <a href="#">2024</a> |
| Erkrankungen der Bauchorgane                       | <a href="#">2025</a> | <a href="#">2024</a> |
| Gefäßoperationen                                   |                      | <a href="#">2024</a> |
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe                   | <a href="#">2025</a> | <a href="#">2024</a> |
| Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe | <a href="#">2025</a> | <a href="#">2024</a> |
| Urologie                                           | <a href="#">2025</a> | <a href="#">2024</a> |
| Hautkrankheiten                                    |                      | <a href="#">2024</a> |
| Intensivmedizin                                    | <a href="#">2025</a> | <a href="#">2024</a> |
| Palliativmedizin                                   | <a href="#">2025</a> |                      |

[Lesehilfe](#)

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2025

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der**

**[Präambel](#)**

IQM Indikatoren

IQM  
Zielwert

[Quelle](#)

IQM  
Durchschnittswert

[Fallzahl](#)

Klinik  
Ist-Wert

[Fallzahl](#)

Klinik  
Erwartungs-  
wert

[SMR](#)

## Herzerkrankungen

### Herzinfarkt

|                                                                      |                  |                   |          |       |       |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------|-------|-------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Herzinfarkt                             | < Erwartungswert | 7,0%              |          | 0,0%  | 11,6% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | a / g            | 5.129 von 73.098  | 0 von 16 | 0,00  |       |
| Anteil der Herzinfarkte mit Linksherzkatheter                        | Information      | 85,0%             |          | 0,0%  |       |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | a                | 62.113 von 73.098 | 0 von 16 |       |       |
| Todesfälle bei Direktaufnahme ohne Verlegung                         | Beobachtungswert | 6,9%              |          | 0,0%  |       |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | a                | 4.547 von 65.683  | 0 von 10 |       |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Transmuraler Herzinfarkt                | < Erwartungswert | 11,3%             |          | 0,0%  | 22,3% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | a                | 2.707 von 24.057  | 0 von 4  |       |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Nicht-transmuraler Herzinfarkt (NSTEMI) | < Erwartungswert | 4,6%              |          | 0,0%  | 5,8%  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | a                | 2.215 von 48.261  | 0 von 11 |       |       |
| Todesfälle bei Nebendiagnose Herzinfarkt                             | Beobachtungswert | 17,0%             |          | 14,3% |       |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | a                | 3.533 von 20.817  | 1 von 7  |       |       |

### Herzinsuffizienz

|                                                                                                     |                  |                    |            |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------|-------|------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Herzinsuffizienz                                                       | < Erwartungswert | 7,5%               |            | 8,4%  | 7,8% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | a / g            | 12.929 von 171.472 | 14 von 167 | 1,08  |      |
| Anteil Behandlungsfälle mit Beschwerden bei Linksherzinsuffizienz bereits im Ruhezustand (NYHA IV)  | Information      | 46,1%              |            | 13,5% |      |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | a                | 55.250 von 119.730 | 10 von 74  |       |      |
| Anteil Behandlungsfälle mit Beschwerden bei Rechtsherzinsuffizienz bereits im Ruhezustand (NYHA IV) | Information      | 5,4%               |            | 0,0%  |      |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | a                | 2.633 von 49.106   | 0 von 81   |       |      |

### Herzrhythmusstörungen

|                                                              |                   |             |     |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----|--|
| Behandlungsfälle mit Herzrhythmusstörungen als Hauptdiagnose | Mengeninformation | 560,1 (380) | 125 |  |
|                                                              | b                 | 197.144     |     |  |

### Versorgung mit Schrittmacher oder Defibrillator

|                                                            |                   |             |      |  |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------|--|
| Versorgung mit Herzschrittmacher <u>oder</u> Defibrillator | Mengeninformation | 167,4 (122) | n.a. |  |
|                                                            | b                 | 48.891      | <4   |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr: 2025

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

Präambel

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungs-wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>    |

## Erkrankungen des Nervensystems und Schlaganfall

### Todesfälle bei allen Formen des Schlaganfalls

|                                           |                  |                    |          |       |
|-------------------------------------------|------------------|--------------------|----------|-------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Schlaganfall | < Erwartungswert | 10,0%              | 4,0%     | 10,8% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre            | a                | 11.103 von 111.219 | 1 von 25 |       |

### Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirninfarkt

|                                          |                  |                  |          |       |
|------------------------------------------|------------------|------------------|----------|-------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirninfarkt | < Erwartungswert | 7,3%             | 0,0%     | 11,7% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre           | a / g            | 7.008 von 95.448 | 0 von 18 |       |

|                                                                                                          |             |                   |          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------|--|
| Anteil der Hirninfarkte mit medikamentöser Auflösung des Blutgerinnsels (Thrombolyse) ohne Zuverlegungen | Information | 18,3%             | 0,0%     |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                           | a           | 16.065 von 87.701 | 0 von 11 |  |

|                                                                                                                        |             |                   |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------|--|
| Anteil Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Hirninfarkt mit Entfernung des Blutgerinnsels durch Katheter (Thrombektomie) | Information | 11,0%             | 0,0%     |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                         | a           | 10.648 von 96.566 | 0 von 18 |  |

|                                                                              |                  |                  |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|--|
| Anteil der Hirninfarkte mit Lungenentzündung, die bei Aufnahme nicht bestand | Beobachtungswert | 4,6%             | 5,6%     |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                               | a                | 4.483 von 96.566 | 1 von 18 |  |

|                                                                                               |                  |                 |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------|--|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirninfarkt mit Lungenentzündung, die bei Aufnahme nicht bestand | Beobachtungswert | 26,4%           | n.a. |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                | a                | 1.183 von 4.483 | <4   |  |

|                                                          |                  |                  |         |  |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------|--|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirnblutung (intrazerebral) | Beobachtungswert | 28,6%            | 16,7%   |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                           | a                | 3.402 von 11.898 | 1 von 6 |  |

|                                                           |                  |               |      |  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------|------|--|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Hirnblutung (subarachnoidal) | Beobachtungswert | 18,4%         | n.a. |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                            | a                | 692 von 3.766 | <4   |  |

|                                                                 |        |                 |          |  |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------|--|
| Anteil nicht näher bezeichneter Schlaganfälle als Hauptdiagnose | <0,40% | 0,19%           | 0,0%     |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                  | a      | 219 von 112.814 | 0 von 25 |  |

|                                                                         |                       |               |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------|--|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose TIA ohne Neubildungen und Kopfverletzungen | Beobachtungswert (SE) | 0,2641%       | 0,0%     |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                          | a / e                 | 97 von 36.732 | 0 von 11 |  |

### Behandlung auf einer Stroke Unit

|                                                                                     |             |                   |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------|--|
| Anteil Hauptdiagnose Hirninfarkte mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung | Information | 77,7%             | 0,0%     |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                      | a           | 75.008 von 96.566 | 0 von 18 |  |

|                                                                            |             |                   |          |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------|--|
| Anteil Hauptdiagnose TIA mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung | Information | 78,3%             | 0,0%     |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                             | a           | 28.965 von 36.978 | 0 von 11 |  |

|                                                                                                                                                           |                  |                    |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------|--|
| Anteil mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung ohne Zuverlegungen (in Anlehnung an Schlaganfallregister) bei Hauptdiagnose Hirninfarkt oder TIA | Beobachtungswert | 79,6%              | 0,0%     |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                            | a                | 99.436 von 124.929 | 0 von 22 |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2025

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                                                                                                                   | <div>IQM<br/>Zielwert</div> <div><a href="#">Quelle</a></div> | <div>IQM<br/>Durchschnittswert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Ist-Wert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Erwartungs-<br/>wert</div> <div><a href="#">SMR</a></div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                          |                                                                    |                                                                           |
| Anteil mit neurologischer oder anderer<br>Komplexbehandlung nur Zuverlegungen (in<br>Anlehnung an Schlaganfallregister) bei<br>Hauptdiagnose Hirninfarkt oder TIA |                                                               |                                                                          |                                                                    |                                                                           |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                                    | Information<br><br>a                                          | 52,7%<br><br>4.537 von 8.615                                             | 0,0%<br><br>0 von 7                                                |                                                                           |
| Epilepsie                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                          |                                                                    |                                                                           |
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Epilepsie                                                                                                                      |                                                               |                                                                          |                                                                    |                                                                           |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                                    | Mengeninformation<br><br>b                                    | 126,0 (46)<br><br>41.339                                                 | 14                                                                 |                                                                           |
| Multiple Sklerose                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                          |                                                                    |                                                                           |
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Multiple<br>Sklerose                                                                                                           |                                                               |                                                                          |                                                                    |                                                                           |
|                                                                                                                                                                   | Mengeninformation<br><br>b                                    | 37,9 (24)<br><br>8.842                                                   | n.a.<br><br><4                                                     |                                                                           |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2025

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |

Altersmedizin

Geriatrische Frührehabilitation

|                                                       |                   |             |     |  |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----|--|
| Behandlungsfälle mit geriatrischer Frührehabilitation | Mengeninformation | 563,5 (475) | 504 |  |
|                                                       | b                 | 131.297     |     |  |

Mangelernährung bei Älteren

|                                                                                                                   |             |                      |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|--|
| Anteil Behandlungsfälle mit erheblicher Mangelernährung und ohne Tumorerkrankung                                  | Information | 0,86%                | 0,82%        |  |
| Alle Patient:innen >= 65 Jahre                                                                                    | a           | 22.224 von 2.594.527 | 22 von 2.690 |  |
| Anteil Behandlungsfälle mit Sonden- / Infusionsernährung bei erheblicher Mangelernährung und ohne Tumorerkrankung | Information | 1,3%                 | 50,0%        |  |
| Alle Patient:innen >= 65 Jahre                                                                                    | a           | 293 von 22.224       | 11 von 22    |  |

Delir

|                                                                      |             |                      |              |  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|--|
| Anteil Behandlungsfälle mit aufgetretenem Delir an operierten Fällen | Information | 3,0%                 | 1,5%         |  |
| Alle Patient:innen >= 60 Jahre                                       | a           | 42.058 von 1.384.617 | 17 von 1.125 |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2025

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungs-wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>    |

Lungenerkrankungen

Lungenentzündung (Pneumonie)

|                                                                                                     |                  |                    |            |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------|-------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung                                                       | < Erwartungswert | 11,0%              | 11,1%      | 13,0% |
| alle Altersgruppen                                                                                  | a                | 15.999 von 145.277 | 27 von 243 |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung ohne Zuverlegung, Tumor, Mukoviszidose                | < Erwartungswert | 9,5%               | 9,3%       | 10,9% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | a                | 9.904 von 103.720  | 18 von 193 |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung ohne Zuverlegung, Tumor, Mukoviszidose, COVID-19      | < Erwartungswert | 9,3%               | 8,8%       | 11,2% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | a / g            | 9.198 von 98.807   | 16 von 182 | 0,79  |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung durch Aspiration von Nahrungsmitteln oder Mageninhalt | Beobachtungswert | 28,1%              | 20,7%      |       |
|                                                                                                     | a                | 3.590 von 12.789   | 6 von 29   |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Bronchitis oder Bronchiolitis ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose | < Erwartungswert | 2,1%               | 0,0%       | 1,2%  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | a                | 274 von 13.291     | 0 von 23   |       |

COPD (Chronisch obstruktive Lungenkrankheit)

|                                   |                  |                  |          |      |
|-----------------------------------|------------------|------------------|----------|------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose COPD | < Erwartungswert | 4,4%             | 3,2%     | 4,7% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre    | a                | 3.028 von 68.894 | 2 von 62 | 0,68 |

Lungenkrebs

|                                                |                   |            |   |  |
|------------------------------------------------|-------------------|------------|---|--|
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Lungenkrebs | Mengeninformation | 201,7 (52) | 4 |  |
|                                                | b                 | 68.189     |   |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2025

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    |  |  | Klinik Ist-Wert          |  |  | Klinik Erwartungswert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--|--|--------------------------|--|--|-----------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> |  |  | <a href="#">Fallzahl</a> |  |  | <a href="#">SMR</a>   |

## Erkrankungen der Bauchorgane

### Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen (ohne Tumor)

|                                                                                          |                  |         |     |        |       |     |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----|--------|-------|-----|----|--|
| Anteil laparoskopischer Operationen bei Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen     | >95,6%           | 96,3%   |     |        | 98,4% |     |    |  |
|                                                                                          | a                | 51.540  | von | 53.503 | 61    | von | 62 |  |
| Anteil Umsteiger auf offene Operationen bei Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen | Beobachtungswert | 2,3%    |     |        | 1,6%  |     |    |  |
|                                                                                          | a                | 1.207   | von | 53.503 | 1     | von | 62 |  |
| Todesfälle bei Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen                              | <0,49% (SE)      | 0,4056% |     |        | 0,0%  |     |    |  |
|                                                                                          | a / e            | 217     | von | 53.503 | 0     | von | 62 |  |

### Operation von Leisten-, Schenkel- und Nabelbrüchen (Hernien)

|                                                                   |                  |         |     |        |        |     |     |  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----|--------|--------|-----|-----|--|
| Todesfälle bei Bruchoperationen ohne anteilige Darmentfernung     | <0,11% (SE)      | 0,0864% |     |        | 0,0%   |     |     |  |
|                                                                   | a / e            | 63      | von | 72.953 | 0      | von | 134 |  |
| Todesfälle bei Bruchoperationen mit anteiliger Darmentfernung     | Beobachtungswert | 2,1%    |     |        | 0,0%   |     |     |  |
|                                                                   | a                | 117     | von | 5.605  | 0      | von | 12  |  |
| Anteil Behandlungsfälle mit Leistenbruchoperation mit Netzeinlage | Information      | 98,2%   |     |        | 100,0% |     |     |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                    | a                | 44.477  | von | 45.272 | 89     | von | 89  |  |

### Eingriffe an der Schilddrüse

|                                                                                      |                   |           |     |        |      |     |   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----|--------|------|-----|---|--|
| Behandlungsfälle mit operativer Entfernung der Schilddrüse                           | Mengeninformation | 62,7 (22) |     |        | 6    |     |   |  |
|                                                                                      | b                 | 17.065    |     |        |      |     |   |  |
| Behandlungsfälle mit operativer Entfernung der Schilddrüse bei Schilddrüsenkrebs     | Mengeninformation | 13,8 (6)  |     |        | n.a. |     |   |  |
|                                                                                      | b                 | 2.573     |     |        | <4   |     |   |  |
| Behandlungsfälle mit operativer Entfernung der Schilddrüse bei gutartiger Erkrankung | Mengeninformation | 52,9 (21) |     |        | 5    |     |   |  |
|                                                                                      | b                 | 13.601    |     |        |      |     |   |  |
| Anteil der Beatmungsfälle (> 24 Std.) nach Schilddrüseneingriff                      | Information (SE)  | 0,49%     |     |        | 0,0% |     |   |  |
|                                                                                      | a / e             | 79        | von | 16.164 | 0    | von | 6 |  |

### Große Operationen am Dick- und Enddarm (Kolon und Rektum)

|                                                                                     |                   |            |     |        |      |     |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----|--------|------|-----|----|--|
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Dick- / Enddarmkrebs                             | Mengeninformation | 130,9 (88) |     |        | 12   |     |    |  |
|                                                                                     | b                 | 44.769     |     |        |      |     |    |  |
| Behandlungsfälle mit Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn                             | Mengeninformation | 104,8 (68) |     |        | 31   |     |    |  |
|                                                                                     | b                 | 38.685     |     |        |      |     |    |  |
| Todesfälle bei operativer Entfernung des Dick- / Enddarms                           | Beobachtungswert  | 7,7%       |     |        | 8,3% |     |    |  |
|                                                                                     | a                 | 2.799      | von | 36.313 | 1    | von | 12 |  |
| Todesfälle bei operativer Dickdarmentfernung bei Krebs ohne komplizierende Diagnose | < Erwartungswert  | 3,0%       |     |        | n.a. |     |    |  |
|                                                                                     | a / g             | 264        | von | 8.766  | <4   |     |    |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2025

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der**

**[Präambel](#)**

| IQM Indikatoren                                                                                 | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert     |  |  | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungs-wert |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--|--|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a>  |  |  | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>    |
| Todesfälle bei operativer Dickdarmentfernung bei Krebs mit komplizierender Diagnose             | Beobachtungswert<br>a  | 12,8%<br>325 von 2.541    |  |  | n.a.<br><4               |                        |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Divertikel ohne Abszess / Perforation | <0,85% (SE)<br>a / e   | 1,0706%<br>22 von 2.055   |  |  | n.a.<br><4               |                        |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Divertikel mit Abszess / Perforation  | Beobachtungswert<br>a  | 5,4%<br>257 von 4.760     |  |  | n.a.<br><4               |                        |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Minderdurchblutung des Darmes         | Information<br>a       | 43,5%<br>957 von 2.201    |  |  | n.a.<br><4               |                        |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn    | Beobachtungswert<br>a  | 2,9%<br>59 von 2.029      |  |  | n.a.<br><4               |                        |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei anderen Diagnosen                     | Information<br>a       | 8,1%<br>806 von 9.894     |  |  | 25,0%<br>1 von 4         |                        |
| Anteil operative Leberentfernung bei Entfernung des Dick- / Enddarms bei Dick- und Enddarmkrebs | Information<br>a       | 4,4%<br>675 von 15.374    |  |  | n.a.<br><4               |                        |
| Behandlungsfälle mit roboterassistiertem Eingriff bei Krebserkrankung des Darms                 | Information<br>a       | 26,2%<br>4.022 von 15.374 |  |  | n.a.<br><4               |                        |

## Erkrankungen des Magens

|                                                                                                              |                        |                        |  |  |                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--|--|------------------|--|
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Magenkrebs (mit und ohne Magenoperation)                                  | Mengeninformation<br>b | 50,1 (24)<br>16.284    |  |  | n.a.<br><4       |  |
| Todesfälle bei Geschwüren an Magen, Zwölffingerdarm oder Dünndarm als Hauptdiagnose (mit und ohne Operation) | Beobachtungswert<br>a  | 5,0%<br>976 von 19.557 |  |  | 3,7%<br>1 von 27 |  |
| Behandlungsfälle mit Magenentfernungen                                                                       | Mengeninformation<br>b | 41,2 (14)<br>10.577    |  |  | n.a.<br><4       |  |
| Todesfälle bei operativer Magenentfernung bei anderer Diagnose (nicht Magenkrebs) ohne Speiseröhreingriff    | Beobachtungswert<br>a  | 3,3%<br>273 von 8.277  |  |  | n.a.<br><4       |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2025

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | <div>IQM<br/>Zielwert</div> <div><a href="#">Quelle</a></div> | <div>IQM<br/>Durchschnittswert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Ist-Wert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Erwartungs-<br/>wert</div> <div><a href="#">SMR</a></div> |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                               |                                                                          |                                                                    |                                                                           |

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Bösartige Neubildungen der Brust und der weiblichen Geschlechtsorgane

|                                                                                             |                                           |                                         |                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--|
| Behandlungsfälle mit Krebserkrankung der Brust oder der Geschlechtsorgane als Hauptdiagnose | <div>Mengeninformation</div> <div>b</div> | <div>228,1 (58)</div> <div>77.084</div> | <div>5</div>                     |  |
| Behandlungsfälle mit Eierstockkrebs als Hauptdiagnose                                       | <div>Mengeninformation</div> <div>b</div> | <div>34,5 (12)</div> <div>10.190</div>  | <div>n.a.</div> <div>&lt;4</div> |  |
| Behandlungsfälle mit Brustkrebs als Hauptdiagnose                                           | <div>Mengeninformation</div> <div>b</div> | <div>145,7 (22)</div> <div>47.641</div> | <div>n.a.</div> <div>&lt;4</div> |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2025

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

IQM Indikatoren

IQM  
Zielwert

[Quelle](#)

IQM  
Durchschnittswert

[Fallzahl](#)

Klinik  
Ist-Wert

[Fallzahl](#)

Klinik  
Erwartungs-  
wert

[SMR](#)

## Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe

### Bösartige Neubildungen des Bewegungsapparates

Behandlungsfälle mit bösartiger Neubildung an Knochen, Gelenkknorpel, peripheren Nerven, Retroperitoneum, Bindegewebe, Weichteilen

Mengeninformation

53,6 (6)

n.a.

b

15.709

<4

### Gelenkersatz (Endoprothetik)

Todesfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung

<0,10% (SE)

0,0851%

0,0%

a / e

52 von 61.092

0 von 161

Todesfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei hüftgelenksnahen Frakturen

Beobachtungswert

4,8%

11,1%

a

1.015 von 21.202

2 von 18

Todesfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei anderen Diagnosen

Beobachtungswert

4,7%

0,0%

a

341 von 7.183

0 von 7

Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung

Beobachtungswert

1,8%

5,6%

a

1.108 von 61.092

9 von 161

Todesfälle bei Wechsel eines Hüftgelenkersatzes wegen Fraktur oder Infektion

Beobachtungswert

3,5%

n.a.

a

153 von 4.343

<4

Todesfälle bei Kniegelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung

<0,04% (SE)

0,0287%

0,0%

a / e

19 von 66.269

0 von 133

Todesfälle bei Kniegelenkersatz (Erstimplantation) bei anderen Diagnosen

Beobachtungswert (SE)

0,2579%

0,0%

a / e

10 von 3.877

0 von 8

Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei Kniegelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung

Beobachtungswert

1,2%

2,3%

a

791 von 66.269

3 von 133

Todesfälle bei Wechsel eines Kniegelenk- oder -teilersatzes ohne Fraktur oder Infektion

<0,34% (SE)

0,3236%

0,0%

a / e

18 von 5.562

0 von 4

Todesfälle bei Wechsel eines Kniegelenkersatzes wegen Fraktur oder Infektion

Beobachtungswert

2,3%

n.a.

a

52 von 2.282

<4

Todesfälle bei Hüft- oder Kniegelenkersatz bei Tumorerkrankung

Beobachtungswert

5,8%

n.a.

a

149 von 2.574

<4

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2025

**Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der**

**[Präambel](#)**

| IQM Indikatoren                                                                                                                                   | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert  |            | Klinik Ist-Wert |        | Klinik Erwartungs-wert |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------|-----------------|--------|------------------------|
|                                                                                                                                                   | Quelle                 | Fallzahl               |            | Fallzahl        |        | SMR                    |
| Gelenkersatz am Schulter- / Ellenbogengelenk                                                                                                      | Mengeninformation<br>b | 41,4 (30)<br>13.375    |            | 24              |        |                        |
| Hüftgelenknahe Frakturen                                                                                                                          |                        |                        |            |                 |        |                        |
| Todesfälle nach operativer Versorgung einer Schenkelhalsfraktur als Hauptdiagnose                                                                 | < Erwartungswert       | 4,4%                   |            | 9,5%            |        | 4,3%                   |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                    | a                      | 1.012                  | von 23.119 | 2               | von 21 | 2,22                   |
| Todesfälle nach Gelenkersatz bei Schenkelhalsfraktur als Hauptdiagnose                                                                            | Beobachtungswert       | 4,8%                   |            | 11,1%           |        |                        |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                    | a                      | 990                    | von 20.781 | 2               | von 18 |                        |
| Todesfälle nach Osteosynthese (Verbindung der Knochenfragmente durch Platten, Schrauben oder Nägel) bei Schenkelhalsfraktur als Hauptdiagnose     | Beobachtungswert       | 0,9%                   |            | n.a.            |        |                        |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                    | a                      | 22                     | von 2.338  | <4              |        |                        |
| Todesfälle nach operativer Versorgung einer pertrochantären Fraktur als Hauptdiagnose                                                             | < Erwartungswert       | 4,5%                   |            | 11,8%           |        | 5,5%                   |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                    | a                      | 825                    | von 18.402 | 2               | von 17 | 2,14                   |
| Todesfälle nach Osteosynthese (Verbindung der Knochenfragmente durch Platten, Schrauben oder Nägel) bei pertrochantärer Fraktur als Hauptdiagnose | Beobachtungswert       | 4,5%                   |            | 11,8%           |        |                        |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                    | a                      | 803                    | von 18.013 | 2               | von 17 |                        |
| Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark                                                                                                  |                        |                        |            |                 |        |                        |
| Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark (ohne lokale Schmerztherapie)                                                                    | Mengeninformation<br>b | 378,1 (258)<br>120.250 |            | 212             |        |                        |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder Wirbelkörper-Ersatz bei Trauma (inkl. komplexe Rekonstruktionen, Rückenmarkoperation)                | Beobachtungswert       | 3,6%                   |            | n.a.            |        |                        |
|                                                                                                                                                   | a                      | 544                    | von 15.302 | <4              |        |                        |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder 1 Wirbelkörper-Ersatz (ohne Tumor, Trauma oder kompl. Rekonstruktionen)                              | Beobachtungswert (SE)  | 0,1155%                |            | 0,0%            |        |                        |
|                                                                                                                                                   | a / e                  | 16                     | von 13.851 | 0               | von 27 |                        |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder 2 Wirbelkörper-Ersatz (ohne Tumor, Trauma oder kompl. Rekonstruktionen)                              | Beobachtungswert (SE)  | 0,2392%                |            | 0,0%            |        |                        |
|                                                                                                                                                   | a / e                  | 18                     | von 7.525  | 0               | von 15 |                        |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder 3 oder mehr Wirbelkörper-Ersatz (ohne Tumor, Trauma oder kompl. Rekonstruktionen)                    | Beobachtungswert (SE)  | 0,7797%                |            | n.a.            |        |                        |
|                                                                                                                                                   | a / e                  | 47                     | von 6.028  | <4              |        |                        |
| Todesfälle bei alleiniger 'Entlastung' (Dekompression) der Wirbelsäule                                                                            | Beobachtungswert (SE)  | 0,0552%                |            | 0,0%            |        |                        |
|                                                                                                                                                   | a / e                  | 13                     | von 23.538 | 0               | von 53 |                        |
| Todesfälle bei 'einfachen' Bandscheibenentfernungen                                                                                               | <0,03% (SE)            | 0,0428%                |            | 0,0%            |        |                        |
|                                                                                                                                                   | a / e                  | 7                      | von 16.355 | 0               | von 73 |                        |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2025

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                                                                                        | IQM Zielwert                   | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungswert |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                        | <a href="#">Quelle</a>         | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>   |
| Todesfälle bei Vertebro- / Kyphoplastie (ohne Tumor, Trauma, kompl. Rekonstruktion, Versteifung, WK-Ersatz oder Bandscheibeneingriffe) | <0,44% (SE)<br>a / e           | 0,432%<br>28 von 6.482   | n.a.<br><4               |                       |
| Todesfälle bei anderen Operationen an der Wirbelsäule oder am Rückenmark                                                               | Beobachtungswert<br>a          | 1,8%<br>428 von 23.602   | 0,0%<br>0 von 37         |                       |
| Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei 'einfachen' Bandscheibenentfernungen                                             | Beobachtungswert (SE)<br>a / e | 0,428%<br>70 von 16.355  | 0,0%<br>0 von 73         |                       |
| Lokale Schmerztherapie an der Wirbelsäule (ohne andere Wirbelsäulen- oder Rückenmarkoperation)                                         | Mengeninformation<br>b         | 91,7 (41)<br>28.974      | 45                       |                       |
| Behandlungsfälle mit Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen als Hauptdiagnose ohne Operation oder lokale Schmerztherapie              | Mengeninformation<br>b         | 151,9 (125)<br>55.455    | 159                      |                       |
| Mehrfachverletzungen - Polytraumen                                                                                                     |                                |                          |                          |                       |
| Mehrfachverletzungen (Polytraumen) im Sinne der DRG-Definition                                                                         | Mengeninformation<br>b         | 23,0 (8)<br>7.352        | n.a.<br><4               |                       |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2025

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |

Urologie

Harnblase

|                                                    |                   |            |   |  |
|----------------------------------------------------|-------------------|------------|---|--|
| Behandlungsfälle mit Blasenkrebs als Hauptdiagnose | Mengeninformation | 139,7 (40) | 4 |  |
|                                                    | b                 | 41.061     |   |  |

Prostata

|                                                      |                   |            |      |  |
|------------------------------------------------------|-------------------|------------|------|--|
| Behandlungsfälle mit Prostatakrebs als Hauptdiagnose | Mengeninformation | 119,7 (22) | n.a. |  |
|                                                      | b                 | 37.240     | <4   |  |

Nierensteine

|                                                                                                 |                   |                   |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|--|
| Behandlungsfälle mit Nierensteinen als Hauptdiagnose                                            | Mengeninformation | 222,0 (50)        | 35       |  |
|                                                                                                 | b                 | 72.590            |          |  |
| Anteil der Behandlungsfälle mit Intervention zur Steinentfernung bei Hauptdiagnose Nierensteine | Information       | 53,2%             | 0,0%     |  |
|                                                                                                 | a                 | 38.601 von 72.590 | 0 von 35 |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2025

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

IQM Indikatoren

IQM  
Zielwert

[Quelle](#)

IQM  
Durchschnittswert

[Fallzahl](#)

Klinik  
Ist-Wert

[Fallzahl](#)

Klinik  
Erwartungs-  
wert

[SMR](#)

## Intensivmedizin

### Intensivmedizin

|                                                                                                                             |                        |                            |                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|
| Todesfälle bei Beatmung > 24 Stunden ohne Neugeborene                                                                       | Information<br>a       | 34,3%<br>31.307 von 91.338 | 26,7%<br>8 von 30 |               |
| ECMO - Lungenunterstützung                                                                                                  | Mengeninformation<br>b | 24,7 (6)<br>2.589          | n.a.<br><4        |               |
| Todesfälle bei Beatmung > 24 Stunden ohne Neugeborene und ohne COVID-19 Fälle                                               | <34,5%<br>a            | 34,2%<br>30.645 von 89.663 | 26,7%<br>8 von 30 |               |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger als Hauptdiagnose                                          | < Erwartungswert<br>a  | 30,5%<br>10.635 von 34.828 | 9,1%<br>1 von 11  | 30,5%<br>0,30 |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger als Hauptdiagnose mit Organkomplikation / Schock           | Beobachtungswert<br>a  | 32,3%<br>10.147 von 31.457 | 9,1%<br>1 von 11  |               |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger oder SIRS als Nebendiagnose                                | Beobachtungswert<br>a  | 34,4%<br>24.818 von 72.163 | 28,6%<br>6 von 21 |               |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger oder SIRS als Nebendiagnose mit Organkomplikation / Schock | Beobachtungswert<br>a  | 35,0%<br>24.327 von 69.476 | 28,6%<br>6 von 21 |               |
| Todesfälle bei generalisierter Entzündungsreaktion des gesamten Körpers ohne Organkomplikation (SIRS)                       | Information<br>a       | 5,5%<br>3.854 von 70.137   | 11,1%<br>2 von 18 |               |

### Angeborene Gerinnungsstörung und Bluttransfusion

|                                                        |                  |                               |                      |  |
|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------|--|
| Anteil operierter Behandlungsfälle mit Bluttransfusion | Information<br>a | 7,6%<br>189.682 von 2.495.305 | 3,4%<br>66 von 1.940 |  |
|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------|--|

### Obduktionen

|                |                  |                            |                  |  |
|----------------|------------------|----------------------------|------------------|--|
| Obduktionsrate | Information<br>a | 0,71%<br>1.138 von 159.648 | 0,0%<br>0 von 82 |  |
|----------------|------------------|----------------------------|------------------|--|

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2025

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                         | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                                         | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |
| Palliativmedizin                        |                        |                          |                          |                               |
| Palliativmedizin                        |                        |                          |                          |                               |
| Palliativmedizinische Komplexbehandlung | Mengeninformation<br>b | 254,2 (170)<br>55.167    | n.a.<br><4               |                               |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |

Herzerkrankungen

Herzinfarkt

|                                                                      |                  |                   |          |      |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------|------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Herzinfarkt                             | < Erwartungswert | 7,1%              | 18,2%    | 7,6% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | a / g            | 5.140 von 71.935  | 2 von 11 | 2,38 |
| Anteil der Herzinfarkte mit Linksherzkatheter                        | Information      | 85,2%             | 0,0%     |      |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | a                | 61.302 von 71.935 | 0 von 11 |      |
| Todesfälle bei Direktaufnahme ohne Verlegung                         | Beobachtungswert | 7,1%              | 18,2%    |      |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | a                | 4.591 von 64.640  | 2 von 11 |      |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Nicht-transmuraler Herzinfarkt (NSTEMI) | < Erwartungswert | 4,8%              | 10,0%    | 7,4% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | a                | 2.237 von 47.006  | 1 von 10 |      |
| Todesfälle bei Nebendiagnose Herzinfarkt                             | Beobachtungswert | 17,4%             | 0,0%     |      |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                       | a                | 3.586 von 20.571  | 0 von 4  |      |

Herzinsuffizienz

|                                                                                                     |                  |                    |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------|------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Herzinsuffizienz                                                       | < Erwartungswert | 7,6%               | 10,6%      | 7,8% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | a / g            | 12.620 von 165.215 | 15 von 142 | 1,35 |
| Anteil Behandlungsfälle mit Beschwerden bei Linksherzinsuffizienz bereits im Ruhezustand (NYHA IV)  | Information      | 46,5%              | 29,2%      |      |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | a                | 52.863 von 113.800 | 7 von 24   |      |
| Anteil Behandlungsfälle mit Beschwerden bei Rechtsherzinsuffizienz bereits im Ruhezustand (NYHA IV) | Information      | 5,5%               | 0,0%       |      |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | a                | 2.676 von 48.667   | 0 von 109  |      |

Herzrhythmusstörungen

|                                                              |                   |             |     |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----|--|
| Behandlungsfälle mit Herzrhythmusstörungen als Hauptdiagnose | Mengeninformation | 536,5 (364) | 116 |  |
|                                                              | b                 | 189.390     |     |  |

Versorgung mit Schrittmacher oder Defibrillator

|                                                     |                   |             |   |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------|---|--|
| Versorgung mit Herzschrittmacher oder Defibrillator | Mengeninformation | 160,7 (115) | 5 |  |
|                                                     | b                 | 48.200      |   |  |



G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                                                                                                          | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungs-wert |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                          | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>    |
| Anteil mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung nur Zuverlegungen (in Anlehnung an Schlaganfallregister) bei Hauptdiagnose Hirninfarkt oder TIA | Information            | 51,2%                    | 0,0%                     |                        |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                           | a                      | 4.394 von 8.585          | 0 von 6                  |                        |
| Epilepsie                                                                                                                                                |                        |                          |                          |                        |
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Epilepsie                                                                                                             | Mengeninformation      | 123,6 (46)               | 12                       |                        |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                           | b                      | 40.650                   |                          |                        |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |

Altersmedizin

Geriatrische Frührehabilitation

|                                                       |                   |             |     |  |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----|--|
| Behandlungsfälle mit geriatrischer Frührehabilitation | Mengeninformation | 536,1 (447) | 496 |  |
|                                                       | b                 | 120.622     |     |  |

Mangelernährung bei Älteren

|                                                                                  |             |                      |              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|--|
| Anteil Behandlungsfälle mit erheblicher Mangelernährung und ohne Tumorerkrankung | Information | 0,88%                | 0,82%        |  |
| Alle Patient:innen >= 65 Jahre                                                   | a           | 21.744 von 2.481.801 | 21 von 2.558 |  |

|                                                                                                                   |             |                |           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------|--|
| Anteil Behandlungsfälle mit Sonden- / Infusionsernährung bei erheblicher Mangelernährung und ohne Tumorerkrankung | Information | 1,6%           | 52,4%     |  |
| Alle Patient:innen >= 65 Jahre                                                                                    | a           | 353 von 21.744 | 11 von 21 |  |

Delir

|                                                                      |             |                      |              |  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|--|
| Anteil Behandlungsfälle mit aufgetretenem Delir an operierten Fällen | Information | 3,1%                 | 1,6%         |  |
| Alle Patient:innen >= 60 Jahre                                       | a           | 40.830 von 1.333.659 | 17 von 1.063 |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

Präambel

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |

## Lungenerkrankungen

### Lungenentzündung (Pneumonie)

|                                                                                                     |                       |                    |            |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------|-------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung                                                       | < Erwartungswert      | 10,0%              | 14,3%      | 12,4% |
| alle Altersgruppen                                                                                  | a                     | 16.244 von 162.957 | 28 von 196 |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung ohne Zuverlegung, Tumor, Mukoviszidose                | < Erwartungswert      | 9,2%               | 10,0%      | 10,2% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | a                     | 10.244 von 111.620 | 16 von 160 |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung ohne Zuverlegung, Tumor, Mukoviszidose, COVID-19      | < Erwartungswert      | 8,5%               | 8,8%       | 9,2%  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | a / g                 | 8.501 von 99.877   | 13 von 147 | 0,96  |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung ohne Zuverlegung, Tumor, Mukoviszidose                | Beobachtungswert (SE) | 0,18%              | n.a.       |       |
| Alle Patient:innen 1 bis 19 Jahre                                                                   | a / e                 | 34 von 19.307      | <4         |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung durch Aspiration von Nahrungsmitteln oder Mageninhalt | Beobachtungswert      | 27,6%              | 44,4%      |       |
|                                                                                                     | a                     | 3.415 von 12.361   | 4 von 9    |       |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Bronchitis oder Bronchiolitis ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose | < Erwartungswert      | 1,9%               | 2,6%       | 0,9%  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                      | a                     | 253 von 13.163     | 1 von 39   |       |

### COPD (Chronisch obstruktive Lungenkrankheit)

|                                   |                  |                  |          |      |
|-----------------------------------|------------------|------------------|----------|------|
| Todesfälle bei Hauptdiagnose COPD | < Erwartungswert | 4,4%             | 3,1%     | 4,7% |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre    | a                | 2.904 von 66.296 | 2 von 65 | 0,65 |

### Lungenkrebs

|                                                |                   |            |   |  |
|------------------------------------------------|-------------------|------------|---|--|
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Lungenkrebs | Mengeninformation | 195,9 (52) | 4 |  |
|                                                | b                 | 66.593     |   |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

[Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    |  |  | Klinik Ist-Wert          |  |  | Klinik Erwartungswert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--|--|--------------------------|--|--|-----------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> |  |  | <a href="#">Fallzahl</a> |  |  | <a href="#">SMR</a>   |

## Erkrankungen der Bauchorgane

### Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen (ohne Tumor)

|                                                                                          |                  |        |     |        |       |     |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----|--------|-------|-----|----|--|
| Anteil laparoskopischer Operationen bei Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen     | >95,6%           | 96,0%  |     |        | 89,7% |     |    |  |
|                                                                                          | a                | 49.748 | von | 51.819 | 70    | von | 78 |  |
| Anteil Umsteiger auf offene Operationen bei Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen | Beobachtungswert | 2,4%   |     |        | 5,1%  |     |    |  |
|                                                                                          | a                | 1.238  | von | 51.819 | 4     | von | 78 |  |
| Todesfälle bei Entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen                              | <0,49% (SE)      | 0,467% |     |        | 0,0%  |     |    |  |
|                                                                                          | a / e            | 242    | von | 51.819 | 0     | von | 78 |  |

### Operation von Leisten-, Schenkel- und Nabelbrüchen (Hernien)

|                                                                   |                  |         |     |        |       |     |     |  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----|--------|-------|-----|-----|--|
| Todesfälle bei Bruchoperationen ohne anteilige Darmentfernung     | <0,11% (SE)      | 0,1021% |     |        | 0,0%  |     |     |  |
|                                                                   | a / e            | 70      | von | 68.584 | 0     | von | 130 |  |
| Todesfälle bei Bruchoperationen mit anteiliger Darmentfernung     | Beobachtungswert | 2,3%    |     |        | 0,0%  |     |     |  |
|                                                                   | a                | 136     | von | 5.990  | 0     | von | 7   |  |
| Anteil Behandlungsfälle mit Leistenbruchoperation mit Netzeinlage | Information      | 98,3%   |     |        | 97,7% |     |     |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                    | a                | 42.816  | von | 43.576 | 86    | von | 88  |  |

### Eingriffe an der Schilddrüse

|                                                                                      |                   |           |     |        |      |     |   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----|--------|------|-----|---|--|
| Behandlungsfälle mit operativer Entfernung der Schilddrüse                           | Mengeninformation | 60,0 (24) |     |        | 4    |     |   |  |
|                                                                                      | b                 | 16.427    |     |        |      |     |   |  |
| Behandlungsfälle mit operativer Entfernung der Schilddrüse bei Schilddrüsenkrebs     | Mengeninformation | 13,0 (6)  |     |        | n.a. |     |   |  |
|                                                                                      | b                 | 2.542     |     |        | <4   |     |   |  |
| Behandlungsfälle mit operativer Entfernung der Schilddrüse bei gutartiger Erkrankung | Mengeninformation | 50,6 (23) |     |        | n.a. |     |   |  |
|                                                                                      | b                 | 12.960    |     |        | <4   |     |   |  |
| Anteil der Beatmungsfälle (> 24 Std.) nach Schilddrüseneingriff                      | Information (SE)  | 0,56%     |     |        | 0,0% |     |   |  |
|                                                                                      | a / e             | 86        | von | 15.495 | 0    | von | 4 |  |

### Große Operationen am Dick- und Enddarm (Kolon und Rektum)

|                                                                                     |                   |            |     |        |      |     |    |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----|--------|------|-----|----|------|
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Dick- / Enddarmkrebs                             | Mengeninformation | 131,8 (88) |     |        | 21   |     |    |      |
|                                                                                     | b                 | 44.562     |     |        |      |     |    |      |
| Behandlungsfälle mit Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn                             | Mengeninformation | 102,6 (62) |     |        | 25   |     |    |      |
|                                                                                     | b                 | 38.168     |     |        |      |     |    |      |
| Todesfälle bei operativer Entfernung des Dick- / Enddarms                           | Beobachtungswert  | 7,7%       |     |        | 6,7% |     |    |      |
|                                                                                     | a                 | 2.773      | von | 36.113 | 1    | von | 15 |      |
| Todesfälle bei operativer Dickdarmentfernung bei Krebs ohne komplizierende Diagnose | < Erwartungswert  | 3,3%       |     |        | 0,0% |     |    | 5,0% |
|                                                                                     | a / g             | 290        | von | 8.798  | 0    | von | 6  | 0,00 |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                                                              | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert     |  |  | Klinik Ist-Wert  |  |  | Klinik Erwartungs-wert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--|--|------------------|--|--|------------------------|
|                                                                                                              | Quelle                 | Fallzahl                  |  |  | Fallzahl         |  |  | SMR                    |
|                                                                                                              |                        |                           |  |  |                  |  |  |                        |
| Todesfälle bei operativer Enddarmentfernung bei Krebs                                                        | <3,1%<br>a             | 2,6%<br>108 von 4.183     |  |  | n.a.<br><4       |  |  |                        |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Divertikel ohne Abszess / Perforation              | <0,85% (SE)<br>a / e   | 0,6132%<br>12 von 1.957   |  |  | n.a.<br><4       |  |  |                        |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Divertikel mit Abszess / Perforation               | Beobachtungswert<br>a  | 5,5%<br>255 von 4.657     |  |  | n.a.<br><4       |  |  |                        |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei Minderdurchblutung des Darmes                      | Information<br>a       | 43,8%<br>953 von 2.178    |  |  | n.a.<br><4       |  |  |                        |
| Todesfälle bei operativer Dick- und Enddarmentfernung bei anderen Diagnosen                                  | Information<br>a       | 8,5%<br>822 von 9.668     |  |  | n.a.<br><4       |  |  |                        |
| Anteil operative Leberentfernung bei Entfernung des Dick- / Enddarms bei Dick- und Enddarmkrebs              | Information<br>a       | 4,3%<br>662 von 15.553    |  |  | 0,0%<br>0 von 7  |  |  |                        |
| Behandlungsfälle mit roboterassistiertem Eingriff bei Krebserkrankung des Darms                              | Information<br>a       | 20,4%<br>3.180 von 15.553 |  |  | 0,0%<br>0 von 7  |  |  |                        |
| Erkrankungen des Magens                                                                                      |                        |                           |  |  |                  |  |  |                        |
| Behandlungsfälle mit Hauptdiagnose Magenkrebs (mit und ohne Magenoperation)                                  | Mengeninformation<br>b | 46,4 (26)<br>14.945       |  |  | 4                |  |  |                        |
| Todesfälle bei Geschwüren an Magen, Zwölffingerdarm oder Dünndarm als Hauptdiagnose (mit und ohne Operation) | Beobachtungswert<br>a  | 5,1%<br>972 von 19.065    |  |  | 0,0%<br>0 von 20 |  |  |                        |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

IQM Indikatoren

| IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |

Gefäßoperationen

Eingriffe an der Hauptschlagader (Aorta)

|                                             |                  |                        |            |  |
|---------------------------------------------|------------------|------------------------|------------|--|
| Todesfälle bei rupturiertem Aortenaneurysma | Information<br>a | 41,1%<br>854 von 2.078 | n.a.<br><4 |  |
|---------------------------------------------|------------------|------------------------|------------|--|

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Bösartige Neubildungen der Brust und der weiblichen Geschlechtsorgane

|                                                                                             |                            |                          |                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|--|
| Behandlungsfälle mit Krebserkrankung der Brust oder der Geschlechtsorgane als Hauptdiagnose | Mengeninformation<br><br>b | 220,3 (65)<br><br>73.794 | n.a.<br><br><4 |  |
| Behandlungsfälle mit Eierstockkrebs als Hauptdiagnose                                       | Mengeninformation<br><br>b | 32,7 (13)<br><br>9.750   | n.a.<br><br><4 |  |
| Behandlungsfälle mit Gebärmutterkrebs als Hauptdiagnose                                     | Mengeninformation<br><br>b | 55,1 (30)<br><br>15.042  | n.a.<br><br><4 |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

Präambel

| IQM Indikatoren | IQM<br>Zielwert        | IQM<br>Durchschnittswert | Klinik<br>Ist-Wert       | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>           |

## Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe

### Bösartige Neubildungen des Bewegungsapparates

|                                                                                                                                    |                   |          |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------|--|
| Behandlungsfälle mit bösartiger Neubildung an Knochen, Gelenkknorpel, peripheren Nerven, Retroperitoneum, Bindegewebe, Weichteilen | Mengeninformation | 52,5 (5) | n.a. |  |
|                                                                                                                                    | b                 | 15.552   | <4   |  |

### Gelenkersatz (Endoprothetik)

|                                                                                                                                           |                                    |                              |                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--|
| Todesfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung                                        | <0,10% (SE)<br><br>a / e           | 0,0849%<br><br>50 von 58.927 | 0,0%<br><br>0 von 134 |  |
| Todesfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei hüftgelenksnahen Frakturen                                                         | Beobachtungswert<br><br>a          | 4,7%<br><br>962 von 20.515   | 0,0%<br><br>0 von 13  |  |
| Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung | Beobachtungswert<br><br>a          | 2,1%<br><br>1.209 von 58.927 | 1,5%<br><br>2 von 134 |  |
| Todesfälle bei Wechsel eines Hüftgelenkersatzes ohne Fraktur oder Infektion                                                               | <1,39% (SE)<br><br>a / e           | 1,4%<br><br>67 von 4.784     | 0,0%<br><br>0 von 7   |  |
| Todesfälle bei Wechsel eines Hüftgelenkersatzes wegen Fraktur oder Infektion                                                              | Beobachtungswert<br><br>a          | 4,0%<br><br>170 von 4.249    | n.a.<br><br><4        |  |
| Todesfälle bei Kniegelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung                                        | <0,04% (SE)<br><br>a / e           | 0,0303%<br><br>19 von 62.752 | 0,0%<br><br>0 von 123 |  |
| Todesfälle bei Kniegelenkersatz (Erstimplantation) bei anderen Diagnosen                                                                  | Beobachtungswert (SE)<br><br>a / e | 0,534%<br><br>19 von 3.558   | 0,0%<br><br>0 von 4   |  |
| Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei Kniegelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung | Beobachtungswert<br><br>a          | 1,3%<br><br>837 von 62.752   | 0,8%<br><br>1 von 123 |  |
| Todesfälle bei Wechsel eines Kniegelenk- oder -teilersatzes ohne Fraktur oder Infektion                                                   | <0,34% (SE)<br><br>a / e           | 0,3103%<br><br>16 von 5.157  | 0,0%<br><br>0 von 9   |  |
| Todesfälle bei Wechsel eines Kniegelenkersatzes wegen Fraktur oder Infektion                                                              | Beobachtungswert<br><br>a          | 2,2%<br><br>51 von 2.279     | n.a.<br><br><4        |  |
| Todesfälle bei Hüft- oder Kniegelenkersatz bei Tumorerkrankung                                                                            | Beobachtungswert<br><br>a          | 5,9%<br><br>148 von 2.502    | n.a.<br><br><4        |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der

Präambel

| IQM Indikatoren                                                                                                                                   | IQM Zielwert                   | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert     | Klinik Erwartungs-wert |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                   | Quelle                         | Fallzahl                 | Fallzahl            | SMR                    |
| Gelenkersatz am Schulter- / Ellenbogengelenk                                                                                                      | Mengeninformation<br>b         | 37,7 (28)<br>12.276      | 25                  |                        |
| Hüftgelenknahe Frakturen                                                                                                                          |                                |                          |                     |                        |
| Todesfälle nach operativer Versorgung einer Schenkelhalsfraktur als Hauptdiagnose                                                                 | < Erwartungswert               | 4,3%                     | 0,0%                | 5,3%                   |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                    | a                              | 962 von 22.592           | 0 von 15            | 0,00                   |
| Todesfälle nach Gelenkersatz bei Schenkelhalsfraktur als Hauptdiagnose                                                                            | Beobachtungswert               | 4,7%                     | 0,0%                |                        |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                    | a                              | 940 von 20.094           | 0 von 13            |                        |
| Todesfälle nach Osteosynthese (Verbindung der Knochenfragmente durch Platten, Schrauben oder Nägel) bei Schenkelhalsfraktur als Hauptdiagnose     | Beobachtungswert               | 0,9%                     | n.a.                |                        |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                    | a                              | 22 von 2.498             | <4                  |                        |
| Todesfälle nach operativer Versorgung einer pertrochantären Fraktur als Hauptdiagnose                                                             | < Erwartungswert               | 4,6%                     | 4,8%                | 5,1%                   |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                    | a                              | 860 von 18.714           | 1 von 21            | 0,94                   |
| Todesfälle nach Osteosynthese (Verbindung der Knochenfragmente durch Platten, Schrauben oder Nägel) bei pertrochantärer Fraktur als Hauptdiagnose | Beobachtungswert               | 4,6%                     | 4,8%                |                        |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                                                    | a                              | 840 von 18.334           | 1 von 21            |                        |
| Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark                                                                                                  |                                |                          |                     |                        |
| Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark (ohne lokale Schmerztherapie)                                                                    | Mengeninformation<br>b         | 348,5 (229)<br>113.946   | 206                 |                        |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder Wirbelkörper-Ersatz bei Trauma (inkl. komplexe Rekonstruktionen, Rückenmarkoperation)                | Beobachtungswert               | 3,6%                     | n.a.                |                        |
|                                                                                                                                                   | a                              | 526 von 14.494           | <4                  |                        |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder 1 Wirbelkörper-Ersatz (ohne Tumor, Trauma oder kompl. Rekonstruktionen)                              | Beobachtungswert (SE)<br>a / e | 0,0901%<br>12 von 13.321 | 0,0%<br>0 von 10    |                        |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder 2 Wirbelkörper-Ersatz (ohne Tumor, Trauma oder kompl. Rekonstruktionen)                              | Beobachtungswert (SE)<br>a / e | 0,2436%<br>17 von 6.978  | 0,0%<br>0 von 16    |                        |
| Todesfälle bei Wirbelsäulen-Versteifung oder 3 oder mehr Wirbelkörper-Ersatz (ohne Tumor, Trauma oder kompl. Rekonstruktionen)                    | Beobachtungswert (SE)<br>a / e | 0,6383%<br>36 von 5.640  | n.a.<br><4          |                        |
| Todesfälle bei alleiniger 'Entlastung' (Dekompression) der Wirbelsäule                                                                            | Beobachtungswert (SE)<br>a / e | 0,1116%<br>25 von 22.396 | 2,0833%<br>1 von 48 |                        |
| Todesfälle bei 'einfachen' Bandscheibenentfernungen                                                                                               | <0,03% (SE)<br>a / e           | 0,0259%<br>4 von 15.423  | 0,0%<br>0 von 75    |                        |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren                                                                                                                        | <div>IQM<br/>Zielwert</div> <div><a href="#">Quelle</a></div> | <div>IQM<br/>Durchschnittswert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Ist-Wert</div> <div><a href="#">Fallzahl</a></div> | <div>Klinik<br/>Erwartungs-<br/>wert</div> <div><a href="#">SMR</a></div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                        |                                                               |                                                                          |                                                                    |                                                                           |
| Todesfälle bei Vertebro- / Kyphoplastie (ohne Tumor, Trauma, kompl. Rekonstruktion, Versteifung, WK-Ersatz oder Bandscheibeneingriffe) | <div>&lt;0,44% (SE)</div> <div>a / e</div>                    | <div>0,3419%</div> <div>22 von 6.435</div>                               | <div>0,0%</div> <div>0 von 6</div>                                 |                                                                           |
| Todesfälle bei anderen Operationen an der Wirbelsäule oder am Rückenmark                                                               | <div>Beobachtungswert</div> <div>a</div>                      | <div>2,0%</div> <div>437 von 21.980</div>                                | <div>0,0%</div> <div>0 von 47</div>                                |                                                                           |
| Anteil der nicht chirurgischen Komplikationsfälle bei 'einfachen' Bandscheibenentfernungen                                             | <div>Beobachtungswert (SE)</div> <div>a / e</div>             | <div>0,4085%</div> <div>63 von 15.423</div>                              | <div>0,0%</div> <div>0 von 75</div>                                |                                                                           |
| Lokale Schmerztherapie an der Wirbelsäule (ohne andere Wirbelsäulen- oder Rückenmarkoperation)                                         | <div>Mengeninformation</div> <div>b</div>                     | <div>87,5 (38)</div> <div>27.127</div>                                   | <div>62</div>                                                      |                                                                           |
| Behandlungsfälle mit Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen als Hauptdiagnose ohne Operation oder lokale Schmerztherapie              | <div>Mengeninformation</div> <div>b</div>                     | <div>142,8 (120)</div> <div>52.123</div>                                 | <div>149</div>                                                     |                                                                           |
| Mehrfachverletzungen - Polytraumen                                                                                                     |                                                               |                                                                          |                                                                    |                                                                           |
| Mehrfachverletzungen (Polytraumen) im Sinne der DRG-Definition                                                                         | <div>Mengeninformation</div> <div>b</div>                     | <div>22,9 (8)</div> <div>7.201</div>                                     | <div>5</div>                                                       |                                                                           |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungs-wert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>    |

Urologie

Prostata

|                                                      |                   |            |      |  |
|------------------------------------------------------|-------------------|------------|------|--|
| Behandlungsfälle mit Prostatakrebs als Hauptdiagnose | Mengeninformation | 121,1 (24) | n.a. |  |
|                                                      | b                 | 37.663     | <4   |  |

Nierensteine

|                                                                                                 |                   |                   |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|--|
| Behandlungsfälle mit Nierensteinen als Hauptdiagnose                                            | Mengeninformation | 211,8 (54)        | 55       |  |
|                                                                                                 | b                 | 70.114            |          |  |
| Anteil der Behandlungsfälle mit Intervention zur Steinentfernung bei Hauptdiagnose Nierensteine | Information       | 51,7%             | 0,0%     |  |
|                                                                                                 | a                 | 36.275 von 70.114 | 0 von 55 |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

IQM Indikatoren

| IQM<br>Zielwert<br><a href="#">Quelle</a> | IQM<br>Durchschnittswert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Ist-Wert<br><a href="#">Fallzahl</a> | Klinik<br>Erwartungs-<br>wert<br><a href="#">SMR</a> |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Hautkrankheiten

Hautkrankheiten

|                                                |                   |          |      |  |
|------------------------------------------------|-------------------|----------|------|--|
| Behandlungsfälle mit Melanom als Hauptdiagnose | Mengeninformation | 53,2 (4) | n.a. |  |
|                                                | b                 | 13.076   | <4   |  |

G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026

Jahr:

2024

Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der [Präambel](#)

| IQM Indikatoren | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungswert |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                 | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>   |

Intensivmedizin

Intensivmedizin

|                                                                                                                             |                       |                            |                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|---------------|
| Todesfälle bei Beatmung > 24 Stunden ohne Neugeborene                                                                       | Information<br>a      | 34,6%<br>31.470 von 90.973 | 27,3%<br>9 von 33 |               |
| Todesfälle bei Beatmung > 24 Stunden ohne Neugeborene und ohne COVID-19 Fälle                                               | <34,5%<br>a           | 34,3%<br>29.828 von 86.940 | 30,0%<br>9 von 30 |               |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger als Hauptdiagnose                                          | < Erwartungswert<br>a | 30,6%<br>9.664 von 31.558  | 28,6%<br>2 von 7  | 32,9%<br>0,87 |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger als Hauptdiagnose mit Organkomplikation / Schock           | Beobachtungswert<br>a | 32,4%<br>9.262 von 28.574  | 20,0%<br>1 von 5  |               |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger als Hauptdiagnose ohne Organkomplikation / Schock          | Beobachtungswert<br>a | 13,5%<br>402 von 2.984     | n.a.<br><4        |               |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger oder SIRS als Nebendiagnose                                | Beobachtungswert<br>a | 35,7%<br>23.691 von 66.391 | 25,0%<br>6 von 24 |               |
| Todesfälle bei Blutvergiftung (Sepsis) durch bakterielle Erreger oder SIRS als Nebendiagnose mit Organkomplikation / Schock | Beobachtungswert<br>a | 36,5%<br>23.199 von 63.628 | 25,0%<br>6 von 24 |               |
| Todesfälle bei generalisierter Entzündungsreaktion des gesamten Körpers ohne Organkomplikation (SIRS)                       | Information<br>a      | 6,3%<br>3.731 von 59.565   | 5,3%<br>1 von 19  |               |

Angeborene Gerinnungsstörung und Bluttransfusion

|                                                                                                    |                        |                               |                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|--|
| Behandlungsfälle mit angeborenen Gerinnungsstörungen als Haupt- oder Nebendiagnose                 | Mengeninformation<br>b | 33,2 (14)<br>11.933           | 8                    |  |
| davon operierte Behandlungsfälle mit angeborenen Gerinnungsstörungen als Haupt- oder Nebendiagnose | Mengeninformation<br>b | 22,6 (9)<br>7.676             | 4                    |  |
| Anteil operierter Behandlungsfälle mit Bluttransfusion                                             | Information<br>a       | 7,7%<br>188.584 von 2.434.913 | 3,1%<br>58 von 1.873 |  |

Obduktionen

|                |                  |                            |                   |  |
|----------------|------------------|----------------------------|-------------------|--|
| Obduktionsrate | Information<br>a | 0,78%<br>1.234 von 157.909 | 0,0%<br>0 von 102 |  |
|----------------|------------------|----------------------------|-------------------|--|

# Leseanleitung zu den IQM-Indikatoren



## Lesebeispiel

Das Lesebeispiel bezieht sich auf die Werte eines deutschen IQM-Mitgliedskrankenhauses. Für Schweizer Spitäler werden ab dieser Veröffentlichung abweichende, landesspezifische Werte herangezogen, die hier nicht exemplarisch abgebildet sind.

Am Beispiel des nachfolgenden Indikators „Todesfälle bei Hauptdiagnose Transmuraler Herzinfarkt (Alle Patient:innen  $\geq 20$  Jahre)“ liegt die durchschnittliche Krankenhaussterblichkeit in der Bundesrepublik bei 11,8 % (Quelle: Statistisches Bundesamt). Daraus ergibt sich rechnerisch für das Beispielkrankenhaus aufgrund des Alters und Geschlechts der Patientinnen und Patienten des ausgewerteten Jahres eine zu erwartende Krankenhaussterblichkeit von 10,7 % <sup>4</sup> als Erwartungswert. Ziel der IQM-Mitgliedskrankenhäuser ist es, im Ergebnis unter diesem Erwartungswert zu liegen <sup>1</sup>. Der für das Beispielkrankenhaus tatsächlich gemessene Ist-Wert betrug in diesem Jahr 19,4 % <sup>3</sup> und lag damit über dem Krankenhaus-Erwartungswert für den Qualitätsindikator „Todesfälle bei Hauptdiagnose Transmuraler Herzinfarkt“. Der Durchschnittswert aller IQM-Mitgliedskrankenhäuser liegt bei diesem Indikator bei 11,3 % <sup>2</sup>.

|                                                                                                                          |                        |                          |                          |                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--|
| G-IQI / CH-IQI 5.5 Stand: 15.04.2026                                                                                     |                        | Jahr:                    |                          | 2025                  |  |
| Bitte beachten Sie bei jeder Art der Verwendung dieser Ergebnisse unbedingt die Hinweise in der <a href="#">Präambel</a> |                        |                          |                          |                       |  |
| IQM Indikatoren                                                                                                          | IQM Zielwert           | IQM Durchschnittswert    | Klinik Ist-Wert          | Klinik Erwartungswert |  |
|                                                                                                                          | <a href="#">Quelle</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">Fallzahl</a> | <a href="#">SMR</a>   |  |
| Herzerkrankungen                                                                                                         |                        |                          |                          |                       |  |
| Herzinfarkt                                                                                                              | 1                      | 2                        | 3                        | 4                     |  |
| Todesfälle bei Hauptdiagnose Transmuraler Herzinfarkt                                                                    | < Erwartungswert       | 11,3%                    | 19,4%                    | 10,7%                 |  |
| Alle Patient:innen >= 20 Jahre                                                                                           | a                      | 2.707 von 24.057         | 88 von 453               |                       |  |

## Die Indikatoren

Die von IQM verwendeten German/Swiss Inpatient Quality Indicators (G-IQI/CH-IQI) sind so ausgewählt, dass sie sowohl häufige und wichtige Krankheitsbilder als auch wichtige Verfahren abbilden. Alle Indikatoren werden aus den Routinedaten des Krankenhauses ohne zusätzliche Dokumentation abgeleitet, wodurch kein weiterer Dokumentationsaufwand entsteht.

### Was wird gemessen?

Hierbei unterscheiden wir **absolute Mengeninformationen** von **relativen Mengeninformationen**, bei denen z.B. ein Anteil bestimmter Operationsverfahren ausgewiesen wird.

Wesentlicher Messwert ist die **Sterblichkeit** bei verschiedenen Krankheitsbildern, auch wenn Sterblichkeit im Krankenhaus selbst bei bester medizinischer Versorgung nicht vollständig vermeidbar ist. Zur besseren Einordnung der Ergebnisse wird die Sterblichkeit - soweit verfügbar - mit durchschnittlichen Referenzwerten verglichen. Diese werden entweder aus Daten des **Statistischen Bundesamtes** oder aus Daten des **Forschungsdatenzentrums der statistischen Ämter des Bundes und der Länder** berechnet. Auf Basis der Daten des Statistischen Bundesamtes erfolgt zudem eine **Risikogewichtung** nach **Alter** und **Geschlecht** der Behandelten. Krankenhäuser mit einem hohen Anteil sehr alter Patientinnen und Patienten weisen in der Regel eine andere Sterblichkeit auf als Einrichtungen mit vergleichsweise jüngeren.

Als wesentliche Orientierungshilfe dient der **Erwartungswert**, der angibt, welche Sterblichkeit bei einer Patientengruppe gleicher Alters- und Geschlechtsverteilung im Bundesdurchschnitt zu erwarten ist. Für einige Indikatoren kommen darüber hinaus erweiterte, **differenzierte Risikomodelle** zum Einsatz, die zusätzlich Begleiterkrankungen, Erkrankungsschwere und den Zuverlegungsstatus berücksichtigen. Dadurch ergeben sich für unterschiedliche Krankenhäuser individuelle Erwartungswerte, da sich die Alters- und Geschlechtszusammensetzung der Behandelten unterscheiden kann.

Mit der aktuellen Veröffentlichung werden erstmals für die Schweizer Mitgliedsspitäler Erwartungs- und Referenzwerte auf Grundlage der **Schweizer Koeffizienten** ausgewiesen. Damit erfolgt die Bewertung der Qualitätsergebnisse jetzt landesspezifisch und auf Basis der jeweiligen nationalen Modelle. Für Krankenhäuser in Deutschland gelten weiterhin die deutschen Referenzwerte, während für Schweizer Spitäler die vom **Bundesamt für Gesundheit (BAG)** abgeleiteten Referenzwerte und Risikomodelle zur Anwendung kommen. Diese Anpassung gewährleistet eine präzise und kontextgerechte Interpretation der Qualitätsdaten beider Länder.

Ziel aller IQM-Krankenhäuser ist es, „bessere“ als die erwarteten Werte zu erreichen. Weitere Informationen hierzu können den G-IQI- / CH-IQI-Handbüchern entnommen werden.

Die Beziehung zwischen der erwarteten Sterblichkeit und der tatsächlich beobachteten Sterblichkeit eines Krankenhauses wird als „**standardized mortality rate**“ (SMR) bezeichnet. Liegt der SMR-Wert unter 1, ist die tatsächliche Sterblichkeit für den jeweiligen Indikator geringer als erwartet, liegt er über 1, ist sie höher als erwartet. Ein solcher Wert kann nur für Indikatoren berechnet werden, bei denen die erwartete Sterblichkeit aus den Daten des Statistischen Bundesamtes abgeleitet werden kann. Stehen keine alters- und geschlechtsgewichteten Werte für einen Indikator zur Verfügung, ist die Berechnung eines Erwartungswert nicht möglich.

Es ist zudem zu berücksichtigen, dass Sterblichkeit bei manchen Indikatoren ein sehr seltenes Ereignis darstellt und daher nicht als alleiniges Maß für medizinische Qualität interpretiert werden darf. Die Analyse der im sogenannten „Low-Risk“-Bereich gemessenen Sterblichkeit ermöglicht jedoch, auch bei seltenen Ereignissen mögliche Verbesserungspotentiale zu identifizieren.

# Glossar zur Ergebnisveröffentlichung



Hier finden Sie eine Erläuterung der wichtigsten Begriffe und Kennzahlen, die in dieser Veröffentlichung verwendet werden:

## **IQM Zielwert - Quellen (Herkunft und Berechnung):**

Die Referenz- bzw. Zielwerte für die Indikatoren basieren auf verschiedenen Quellen. Die jeweilige Quelle wird durch einen Buchstaben unter dem „IQM Zielwert“ angegeben. Es werden abweichende, landesspezifische Werte für die deutschen und Schweizer Spitäler herangezogen und in folgenden Quellenhinweisen wo erforderlich differenziert:

a: G-IQI: Forschungsdatenzentren der statistischen Ämter des Bundes und der Länder, DRG-Statistik 2023. Eigene Berechnungen. Diese Daten bilden auch die Grundlage für die Berechnung der klinikindividuellen Erwartungswerte, standardisiert nach Alter und Geschlecht.

a: CH-IQI: Berechnungen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) Schweiz basierend auf den Daten der Medizinischen Statistik der Krankenhäuser (MS bis 2023) und den Administrativdaten der Gesundheitsversorger (SpiGes ab 2024)

b: G-IQI: Gleiche Quelle wie a; jedoch speziell für Mengenindikatoren: Die mittlere Fallzahl (Median in Klammern) für IQM-Mitgliedskrankenhäuser mit entsprechender Leistung im Jahr 2023.

b: CH-IQI: Gleiche Quelle wie a; jedoch speziell für Mengenindikatoren: Die mittlere Fallzahl (Median in Klammern) für Spitäler auf Schweizer Bundesebene mit entsprechender Leistung im Jahr 2024.

d: Der Zielwert ist hier nicht identisch mit dem Bundeswert und wurde entnommen aus: Kaiser D (2007) Mindestmengen aus thoraxchirurgischer Sicht. Chirurg, 78(11): 1012-1017

e: Sentinel Event: Kennzahl wurde im G-IQI Kolloquium als Sentinel Event eingestuft (seltene Ereignisse, die man nicht erwartet). Weitere Infos dazu in den G-IQI/ CH-IQI FAQs.

g: G-IQI: Differenziertes Risikomodell zur Berechnung der Erwartungswerte; basierend auf Daten der Forschungsdatenzentren der statistischen Ämter des Bundes und der Länder, DRG-Statistik 2023. Eigene Berechnungen.

g: CH-IQI: Differenziertes Risikomodell zur Berechnung der Erwartungswerte; Berechnungen des Bundesamts für Gesundheit (BAG), basierend auf den Daten 2024

h: Empfehlung aus der Beschlussfassung der G-IQI Version 5.5 im Kolloquium II durch den *wissenschaftlichen Beirat des IQM e.V.*

### **IQM-Durchschnittswert - Fallzahl:**

Der IQM-Durchschnittswert gibt die mittleren Ergebnisse über alle Patientinnen und Patienten an, die im Beobachtungszeitraum in IQM-Mitgliedskrankenhäusern (D) bzw. IQM-Spitälern (CH) behandelt wurden. Mengenangaben werden als Durchschnittswert und zusätzlich in Klammern als Median dargestellt.

### **Krankenhaus Erwartungswert:**

Dieser Wert beschreibt die erwartete Sterblichkeit der Patientinnen und Patienten, basierend auf Alters- und Geschlechtsverteilung. Er wird nur für Indikatoren berechnet, bei denen Vergleichszahlen des Bundesdurchschnitts vorliegen.

Für einige Indikatoren kommen erweiterte differenzierte Risikomodelle zum Einsatz. Diese berücksichtigen zusätzlich Begleiterkrankungen, Erkrankungsschwere und den Zuverlegungsstatus. Weitere Informationen können dem G-IQI/CH-IQI Handbuch entnommen werden.

### **SMR:**

Die **SMR** bezeichnet das Verhältnis zwischen der **beobachteten Sterblichkeit** (tatsächlicher Durchschnittswert) und der **erwarteten Sterblichkeit** (Erwartungswert).

Ein Wert **unter 1** bedeutet, dass die Sterblichkeit geringer ist als erwartet; ein Wert **über 1** zeigt eine höhere Sterblichkeit als erwartet an.

### Hinweis zum Indikator „Obduktionsrate“:

Die ausgewiesene Anzahl der Obduktionen kann unvollständig sein, da nicht alle Krankenhaus-Dokumentationssysteme eine vollständige oder nachträgliche Kodierung nach der Entlassung bzw. nach dem Tod einer Patientin oder eines Patienten unterstützen.

### Fallzahlen und Mindestgrenzen:

Die Ergebnisse einer Kennzahl werden nur dann im Detail dargestellt, wenn mindestens vier oder mehr Fälle im Nenner vorliegen. Wird diese Mindestgrenze unterschritten, erscheint die Angabe „<4“.

Ergebnisse, die sich auf **sehr seltene Ereignisse** beziehen, werden mit **bis zu vier Nachkommastellen** angegeben. Dadurch können auch bei großen Fallzahlen Werte zwischen **0 und 1** dargestellt werden.